

:

PAPFAM 2002

2012

## شكر

أتقدم بأسمى عبارات التقدير و الشكر للأستاذ المشرف الدكتور/ سعدي رابح على ما تلقيته منه من توجيهات و توصيات.

و أتوجه بشكري و امتناني إلى الأساتذة:

الدكتور/ كشاد رابح، الدكتور/ بدروني محمد، الدكتور/ كويحل فاروق، الدكتور/ نقاز سيد أحمد، الأستاذ/ مصلي رضوان.

و أتوجه بجزيل الشكر إلى كافة الأساتذة و الموظفين بقسم علم الاجتماع و الديموغرافيا و بكلية الآداب و العلوم الاجتماعية بجامعة سعد دحلب بالبليدة.

## ملخص

تمثل المسروح أحد الأدوات المهمة في جمع المعطيات السكانية، حيث تتسم بسهولة التنفيذ، كما تتميز بقلّة التكاليف مقارنة بالحصر الشامل (التعداد).

إن البحوث المرتبطة بجمع المعطيات في الجزائر نادرة جداً، لهذا الغرض قمنا بهذا العمل الهادف إلى تقييم مصداقية المسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة لسنة 2002 (ملف الخصوبة) بناءً على معالجة نوعية معطياته.

مكننا هذا العمل من إبراز العوامل التالية:

- غياب تام للإجابات غير الموافقة للمجال أو ما يعرف بتجاوز حدود الترميز؛
- سجلنا معطيات ناقصة على معظم المتغيرات، غير أن أغلبيتها المطلقة كانت بنسب بسيطة؛
- كما كشفنا عدم توافق معطيات بعض المتغيرات المرتبطة بعلاقة منطقية فيما بينها، إلا أنها مثلت نسباً ضئيلة في الغالب؛
- لم نسجل أي حالة عدم توافق داخلي بين المتغيرات بالنظر للإحالات المعتمدة في استمارة المسح (المتعلقة بملف الخصوبة).

## قائمة الجداول

الرقم	الصفحة
01	توزيع النساء حسب الرقم التعريفي (مختصر) 42
02	توزيع النساء حسب الرقم الترتيبي للمرأة 43
03	توزيع النساء حسب أشهر الميلاد 43
04	توزيع النساء حسب سنوات الميلاد 44
05	توزيع النساء حسب أعمارهن بالسنوات الماضية 44
06	توزيع النساء حسب أعمارهن الحالية 45
07	توزيع النساء حسب حالة التمدرس 45
08	توزيع النساء حسب المستوى التعليمي المحصل 46
09	توزيع النساء حسب آخر سنة دراسية أكملت بنجاح 47
10	توزيع الحاصلات على الشهادة الابتدائية 47
11	توزيع النساء حسب القدرة على القراءة 48
12	توزيع النساء حسب القدرة على الكتابة 48
13	توزيع النساء حسب مداومة قراءة الجرائد والمجلات 49
14	توزيع النساء حسب مداومة مشاهدة التلفزيون 50
15	توزيع النساء حسب مداومة الاستماع للراديو 50
16	توزيع النساء حسب حالاتهن المهنية 51
17	توزيع النساء حسب ممارسة الأعمال و النشاطات التجارية و الفلاحية و المساعدة الأسرية 51
18	توزيع النساء حسب ممارسة أي عمل في الماضي 52
19	توزيع النساء حسب ممارسة أي عمل خلال 12 شهر الأخيرة 53



53	توزيع النساء حسب نوع العمل الرئيسي	20
54	توزيع النساء حسب مكان مزاولة النشاط	21
54	توزيع النساء حسب وتيرة ممارسة النشاط	22
55	توزيع النساء حسب نوع الأجر أو المقابل	23
55	توزيع النساء حسب الحالة الزوجية	24
56	توزيع النساء حسب عدد مرات الزواج	25
56	توزيع النساء حسب شهر أول زواج	26
57	توزيع النساء حسب سنة أول زواج	27
57	توزيع النساء حسب العمر عند الزفاف الأول	28
58	توزيع النساء حسب صلة القرابة بالزوج الحالي	29
59	توزيع النساء حسب حالة تدرس الزوج الحالي	30
59	توزيع النساء حسب أعلى مستوى تعليمي بلغه الزوج	31
60	توزيع النساء حسب آخر سنة دراسية أكملها الزوج بنجاح	32
60	توزيع النساء حسب حصول أزواجهن على الشهادة الابتدائية (ذوي المستوى الابتدائي و الذين أكملوا السنة السادسة بنجاح)	33
61	توزيع النساء حسب قدرة الأزواج على القراءة	34
62	توزيع النساء حسب قدرة الأزواج على الكتابة	35
62	توزيع النساء حسب المهنة الرئيسية للأزواج	36
63	توزيع النساء حسب الوضعية في المهنة للأزواج	37
63	توزيع النساء حسب الحالة الزوجية الحالية للنساء	38
64	توزيع النساء حسب العمر الحالي للزوج	39
65	توزيع النساء حسب عدد الزوجات الأخريات	40
65	توزيع النساء حسب انتمائهن للفئتين العمريتين 15-54 سنة و 55-59 سنة	41
66	توزيع النساء حسب الحصول على ولادات حية	42
67	توزيع النساء حسب وجود أبناء أحياء (ذكورا أو إناث) يعيشون مع المبحوثة الآن	43
67	توزيع النساء حسب عدد الأبناء (الذكور، الإناث) الذين يعيشون مع المبحوثة	44
68	توزيع النساء حسب وجود أبناء أحياء (ذكورا أو إناث) لا يعيشون في البيت حاليا	45
68	توزيع النساء حسب عدد الأبناء (الذكور، الإناث) الذين يعيشون في أماكن أخرى	46

47	توزيع النساء حسب عدد الولادات الحية المتبوعة بوفاة	69
48	توزيع النساء حسب عدد الأبناء (الذكور أو الإناث) الذين ولدوا أحياء ثم توفوا	69
49	توزيع النساء حسب مجموع الولادات الحية	70
50	توزيع النساء حسب وجود حالات الحمل التي لم تنتهي بمولود حي	70
51	توزيع النساء حسب عدد حالات السقط (الإسقاط)	71
52	توزيع النساء حسب عدد حالات الإجهاض	71
53	توزيع النساء حسب عدد حالات الحمل التي انتهت بمولود ميت	72
54	توزيع النساء حسب مآل آخر حمل لم ينته بولادة حيّة	72
55	توزيع النساء حسب شهر تسجيل آخر حالة حمل انتهت بمولود ميت أو إجهاض أو سقط	73
56	توزيع النساء حسب سنة تسجيل آخر مولود ميت أو إجهاض أو سقط	73
57	توزيع النساء حسب سنة آخر حالة حمل انتهت بمولود ميت أو إجهاض أو سقط قبل أو بعد يناير 1997	74
58	توزيع النساء حسب عدد شهور آخر حمل انتهى بمولود غير حي	75
59	توزيع النساء حسب الدخول إلى المستشفى عقب انتهاء الحمل المتوج بولادة غير حية	75
60	توزيع النساء حسب عدد ليالي الاستشفاء	76
61	توزيع النساء حسب التعرض خلال الحمل للكشف عن الحمل المنتهي بولادة غير حية	76
62	توزيع النساء حسب شهر أول كشف عن الحمل	77
63	توزيع النساء حسب دافع أو سبب الكشف عن الحمل	78
64	توزيع النساء حسب عدد مرات الكشف خلال الحمل	78
65	توزيع النساء حسب مكان إجراء آخر كشف عن الحمل	79
66	توزيع النساء حسب سبب عدم إجراء الكشف عن هذا الحمل	79
67	توزيع النساء حسب تناول أي من الأشياء (الأقراص/ شراب الحديد، فيتامينات/ كالسيوم/ مغنزيوم، أي دواء آخر) خلال الحمل المنتهي بولادة غير حية	80
68	توزيع النساء حسب أخذ الحقن لتحسين الجنين من التيتانوس	81
69	توزيع النساء حسب التعرض للمضاعفات خلال الحمل المنتهي بمولود غير حي	82
70	توزيع النساء حسب التعرض لأي من الأعراض	83

84	توزيع النساء حسب تلقي النصيحة أو العلاج لأعراض السؤال f238	71
85	توزيع النساء حسب أسباب عدم تلقي الاستشارة عن أعراض السؤال f238	72
85	توزيع النساء حسب حالة الحمل الحالية	73
86	توزيع النساء حسب عدد شهور الحمل	74
86	توزيع النساء حسب الرغبة في الحمل الحالي	75
87	توزيع النساء حسب استمرار الدورة الشهرية	76
87	توزيع النساء حسب مدة بداية آخر دورة شهرية	77
88	توزيع النساء حسب عمر المرأة عند أول دورة شهرية في حياتها	78
88	توزيع النساء حسب تاريخ ميلاد آخر ولادة تمت بالنسبة ليناير 1997	79
89	توزيع النساء حسب حالاتهن الصحية بصفة عامة	80
90	توزيع النساء حسب تغير حالاتهن الصحية مقارنة بالعام الماضي	81
91	توزيع النساء حسب الإصابة حالياً أو سابقاً ببعض الأمراض المزمنة	82
92	توزيع المصابات حسب الكشف عن الأمراض المزمنة من قبل طبيب وإخبارهن به	83
93	توزيع النساء حسب أعمارهن عند اكتشاف الإصابة بالأمراض المزمنة	84
94	توزيع المصابات بالأمراض المزمنة حسب تناولهن العلاج باستمرار	85
95	توزيع النساء حسب المعاناة (الآن أو سابقاً) من أحد أنواع السرطان	86
95	توزيع النساء حسب نوع السرطان الذي تعاني (أو عانت) منه	87
96	توزيع النساء حسب عمر المرأة عندما تم إخبارها أو اكتشفت أنها مصابة بالسرطان	88
96	توزيع النساء حسب تلقي أي علاج (الآن / في الماضي) للسرطان	89
97	توزيع النساء حسب حصول الحمل في السابق	90
98	توزيع النساء حسب الشعور بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل	91
98	توزيع النساء حسب مدة المعاناة من مشكلة الإحساس بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل	92
99	توزيع النساء حسب تغير حالة الإحساس بثقل أسفل البطن عند السعال أو العطاس أو رفع شيء ثقيل	93
100	توزيع النساء حسب تلقي النصيحة أو الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن	94
101	توزيع النساء حسب أسباب عدم تلقي الاستشارة للإحساس بثقل أسفل البطن	95
102	توزيع النساء حسب القدرة على التحكم في البول عند السعال أو العطاس أو رفع شيء ثقيل	96

- 97 توزيع النساء حسب الاستشارة لعلاج مشكلة عدم التحكم في البول 103
- 98 توزيع النساء حسب أسباب عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول 104
- 99 توزيع النساء حسب المعاناة من آلام و حروق عند التبول أو من إفرازات مهبلية حادة أو غير مألوفة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 105
- 100 توزيع النساء حسب التعرض لهرش أو حساسية حول الجهاز التناسلي أو لإفرازات ذات رائحة كريهة أو لألم حاد في أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية 106
- 101 توزيع النساء حسب التعرض لمشكل واحد على الأقل في السؤال f519 106
- 102 توزيع النساء حسب الاستشارة للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (المشاكل) 107
- 103 توزيع النساء حسب أسباب عدم الاستشارة للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشاكل 108
- 104 توزيع النساء بالنظر إلى وضعية الحمل أو عدمه عند تاريخ الملاحظة 109
- 105 توزيع النساء حسب حالة الحيض 110
- 106 توزيع النساء المستمرات في الحيض حسب الحالة الزوجية 110
- 107 توزيع النساء حسب محاولتهن الحمل لكن دون جدوى 111
- 108 توزيع النساء حسب عدد أشهر محاولة الحمل دون جدوى 111
- 109 توزيع النساء حسب السبب الرئيسي في فشل الحمل 112
- 110 توزيع النساء حسب الاستشارة قصد المساعدة على الحمل 113
- 111 توزيع النساء حسب أسباب عدم الاستشارة لأجل إنجاح الحمل 114
- 112 توزيع النساء حسب قيام الأزواج بالاستشارة لإنجاح الحمل 115
- 113 توزيع النساء حسب مصادر استشارة الأزواج لإنجاح الحمل 115
- 114 توزيع النساء حسب المعانات خلال الثلاثة أشهر الماضية من المشاكل المذكورة 116
- 115 توزيع النساء حسب وجود مشكل على الأقل 117
- 116 توزيع النساء حسب طلب الاستشارة لعلاج المشاكل المبينة في السؤال f534 التي عانين منها خلال الثلاث أشهر الماضية 118
- 117 توزيع النساء حسب أسباب عدم متابعة المشكلة (المشاكل) 119
- 118 توزيع النساء حسب مكان تلقي الرعاية الصحية عادة 120
- 119 توزيع النساء حسب عوامل إعاقتهن في تلقي الرعاية الطبية 121
- 120 توزيع النساء حسب المعرفة السابقة بالأمراض المتقلبة عن طريق الاتصال الجنسي 122
- 121 توزيع النساء حسب معرفتهن بالأمراض المنقولة جنسيا 123

- 122 توزيع النساء حسب الإصابة بالأمراض المتقلة جنسيا خلال 12 شهرا الأخيرة 124
- 123 توزيع النساء وفق الإصابة بمرض أو أكثر حسب الحالة الزوجية (متزوجة حاليا، ليست متزوجة حاليا) 125
- 124 توزيع النساء حسب الاستشارة لعلاج الأمراض أو لتلقي النصيحة عنها 126
- 125 توزيع النساء حسب أسباب عدم المتابعة الطبية للأمراض المنقولة جنسيا 127
- 126 توزيع النساء المصابات بمرض أو أكثر حسب الحالة الزوجية الحالية 128
- 127 توزيع النساء حسب ذهاب الأزواج للاستشارة عن نفس المرض 128
- 128 توزيع النساء حسب إصابة الزوج بأي من الأمراض المنقولة جنسيا خلال 12 شهرا الماضية 129
- 129 ذهاب الزوج من أجل الاستشارة أو العلاج 130
- 130 توزيع النساء حسب تلقي المرأة أي نصيحة أو علاج لنفس المرض عندما أصيب به زوجها 130
- 131 توزيع النساء حسب معرفتهن لمرض الإيدز بالنظر للمتغير f602d 131
- 132 توزيع النساء حسب المصادر الإعلامية التي تلقين منها أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز 132
- 133 توزيع النساء حسب معرفتهن للوسائل التي تمكن المرء من الإصابة بالإيدز 133
- 134 توزيع النساء حسب معرفتهن بإمكانية تجنب الإصابة بالإيدز 134
- 135 توزيع النساء حسب معرفة الطرق التي تجنب المرء من الإصابة بالإيدز 134
- 136 توزيع النساء بالنظر للسؤال المتعلق بسبب عدم نجاح الحمل (f529) 135
- 137 توزيع النساء حسب استعمالهن السابق لوسائل تأخير أو منع الحمل 136
- 138 توزيع النساء حسب استعمال وسائل منع أو تأخير الحمل 137
- 139 توزيع النساء حسب عدد الأبناء الأحياء حين استخدام وسيلة تنظيم الأسرة لأول مرة 138
- 140 توزيع النساء حسب سبب استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أول مرة 138
- 141 توزيع النساء حسب استعمال الحبوب، الحقن، الغرس 139
- 142 توزيع النساء حسب عدد سنوات استعمال وسائل منع حمل المشتملة على هرمونات 140
- 143 توزيع النساء حسب الحالة الزوجية الحالية بالنظر للسؤال f124 140
- 144 توزيع النساء بالنظر للسؤال f242 (بالنظر إلى الحمل) 141

141	145	توزيع النساء حسب استعمال المرأة أو الزوج لأي من وسائل تنظيم الأسرة لتجنب الحمل
142	146	توزيع النساء حسب وسيلة منع الحمل المستعملة
143	147	استعمال اللولب في الماضي بالنظر للسؤالين f702 و f708
143	148	توزيع النساء حسب سبب تجنب اللولب على الإطلاق
144	149	مشاكل استعمال اللولب
145	150	توزيع النساء حسب نوع الوسيلة المستعملة بالنظر للسؤال f708a
145	151	توزيع النساء حسب مصدر الحصول على الوسيلة آخر مرة
146	152	توزيع النساء حسب مكان إجراء عملية التعقيم
147	153	توزيع النساء حسب السبب الرئيسي لاختيار عملية التعقيم
148	154	توزيع النساء حسب مدد استعمال الوسيلة الحالية دون انقطاع
148	155	توزيع النساء حسب التعرض لمشاكل عند استعمال الوسيلة الحالية
149	156	توزيع النساء حسب مشاكل استعمال الوسيلة الحالية
150	157	توزيع النساء حسب السبب الرئيسي للتوقف عن استعمال وسائل تنظيم الولادات
151	158	توزيع النساء حسب الحالة الزوجية الحالية بالنظر للسؤال f124
151	159	توزيع النساء حسب النية في استعمال أحد وسائل تنظيم الولادات مستقبلاً
152	160	توزيع النساء حسب السبب الرئيسي لغياب الرغبة في استعمال وسيلة لتنظيم الولادات مستقبلاً
153	161	توزيع النساء حسب وقت بدء استعمال أحد وسائل تنظيم الولادات
153	162	توزيع النساء حسب الوسيلة المفضل استعمالها مستقبلاً
154	163	توزيع النساء حسب الموافقة على استعمال أزواجهن لوسائل تنظيم الولادات
155	164	توزيع النساء حسب الحالة الزوجية الحالية
155	165	توزيع النساء حسب موافقة الزوج على استعمال الأزواج لوسائل تنظيم الولادات
156	166	توزيع النساء حسب عدد مرات التحدث مع الزوج عن تنظيم الولادات خلال السنة الماضية
157	167	توزيع النساء حسب الوسيلة المستعملة حالياً بالنظر للسؤال f708a
157	168	توزيع النساء (الحوامل و غير الحوامل حالياً) حسب رغبتهن في إنجاب أطفال مستقبلاً

158	169	توزيع النساء حسب جنس الطفل القادم
159	170	توزيع النساء الحوامل حاليا حسب المدة المفضلة لانتظار الطفل القادم بعد الوضع
159	171	توزيع النساء حسب المدة المفضلة لانتظار الطفل المرغوب فيه
160	172	توزيع النساء حسب حديث النساء مع أزواجهن حول عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم طوال حياتهن
161	173	مقارنة عدد الأطفال الذين يرغبهم الزوج بالعدد الذي ترغبه الزوجة
161	174	توزيع النساء حسب العدد المفضل من الأطفال
162	175	توزيع النساء حسب عدد الذكور، عدد الإناث و عدد الولادات مهما كان الجنس المفضل لدى المرأة
163	176	توزيع النساء حسب مقياس الفترة و الفترة المفضلة ما بين ولادتين متتاليتين
164	177	توزيع النساء حسب أرائهن في السن الأنسب للزواج (البنات)
165	178	توزيع النساء حسب عدد الأطفال الذين يرغبن فيهم لبناتهن مستقبلا
165	179	توزيع النساء حسب الموافقة على دخول بناتهن عالم الشغل
166	180	توزيع النساء حسب تلقي كشف نسائي خلال 12 شهرا الماضية
167	181	توزيع النساء حسب عدد مرات تلقي الكشف النسائي خلال 12 شهرا الماضية
167	182	توزيع النساء حسب مكان تلقي آخر كشف نسائي
168	183	توزيع النساء حسب أسباب عدم تلقي الكشف خلال 12 شهرا الأخيرة
169	184	توزيع النساء حسب قيام النساء بعمل مسحة خلال 12 شهرا الماضية
169	185	توزيع النساء حسب مكان عمل المسحة آخر مرة
170	186	توزيع النساء حسب تكلفة المسحة المهبلية آخر مرة
171	187	توزيع النساء حسب أسباب عدم تلقي المسحة
172	188	توزيع النساء حسب معرفة النساء الفحص الذاتي للتدخين لاكتشاف أورام الثدي مبكرا
172	189	توزيع النساء حسب الفحص الذاتي للتدخين بانتظام
173	190	توزيع النساء حسب إجراء الفحص الطبي للتدخين لاكتشاف الأورام مبكرا خلال 12 شهرا الأخيرة
173	191	توزيع النساء حسب مكان تلقي آخر فحص طبي للتدخين

174	192	توزيع النساء حسب تكلفة الفحص الطبي للثدي آخر مرة
175	193	توزيع النساء حسب أسباب عدم تلقي الفحص الطبي للثدي خلال 12 شهرا الماضية
176	194	توزيع النساء حسب إجراء الأشعة على الثديين
176	195	توزيع النساء حسب المدة منذ إجراء آخر أشعة للثديين
177	196	توزيع النساء حسب مكان تلقي آخر أشعة
177	197	توزيع النساء حسب كلفة إجراء آخر أشعة على الثديين
178	198	توزيع النساء حسب أسباب عدم إجراء الأشعة على الثديين
180	199	النساء المؤهلات
180	200	التوافق الداخلي بين حالة التمدرس و المستوى التعليمي
181	201	التوافق الداخلي بين المستوى التعليمي و القدرة على القراءة و الكتابة
182	202	التوافق الداخلي بين القدرة على القراءة و وتيرة القراءة و وتيرة مشاهدة التلفزيون
183	203	التوافق الداخلي في الإحالات بين الحالة المهنية الحالية و ممارسة أي نشاط و الحالة المهنية في الماضي و القيام بأي عمل خلال 12 شهرا الماضية
184	204	التوافق الداخلي بين المستوى التعليمي للمبحوثة و مهنتها الرئيسية
185	205	التوافق الداخلي بين حالة تمدرس الزوج و مستواه التعليمي و آخر سنة أكملها بنجاح و الحصول على الشهادة الابتدائية و القدرة على القراءة
187	206	التوافق الداخلي بين المستوى التعليمي للزوج و مهنته الرئيسية
188	207	التوافق الداخلي بين وسط الإقامة (ريف/حضر) و عدم تلقي الكشف عن الحمل بسبب عدم توفر الخدمة
189	208	التوافق الداخلي بين عدد الولادات الحية للمبحوثة و عدم الكشف عن الحمل بسبب اكتساب الخبرة سابقاً
190	209	التوافق الداخلي بين عدد الولادات الحية للمرأة و عدم الاستشارة حول الأعراض بسبب تجربتها السابقة
191	210	التوافق الداخلي بين حالة الحمل و الحالة الزوجية
191	211	التوافق الداخلي بين حالة الدورة الشهرية و عمر المرأة
192	212	التوافق الداخلي بين حالة الدورة الشهرية و حالة الحمل
193	213	التوافق الداخلي بين الكشف عن المرض المزمن من طرف طبيب و تناول العلاج بصفة مستمرة



- 214 التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية إثر الإحساس بثقل أسفل البطن كنتيجة للحمل بسبب غياب الخدمة و وسط الإقامة 194
- 215 التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند عدم التحكم في البول اعتقاداً أن ذلك لن يساعد و مستوى تعليم المرأة 194
- 216 التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند عدم التحكم في البول نظراً لغياب الخدمة و وسط الإقامة 195
- 217 التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند مجابهة مشاكل (هرش أو حساسية، إفرازات ذات رائحة كريهة، آلام أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية ( لانشغالهن/ انشغال أزواجهن و الحالة المهنية للمبحوثة و الحالة المهنية لزوجها 196
- 218 التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية لغياب الخدمة و محل الإقامة 196
- 219 التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة (هرش أو حساسية، إفرازات ذات رائحة كريهة، آلام أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية) للاعتقاد أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي 197
- 220 التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة للاعتقاد أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي 198
- 221 التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية بغية الحمل بسبب شغل المرأة أو زوجها و الحالة المهنية لكليهما 199
- 222 التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) بسبب غياب الخدمة و وسط الإقامة 199
- 223 التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) بسبب الشغل (المرأة/ زوجها) و الحالة المهنية للمبحوثة و مهنة الزوج 200
- 224 التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) بسبب الاعتقاد أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي للمبحوثة 201
- 225 التوافق الداخلي بين عائق عدم معرفة المرأة مكان تلقي الرعاية الطبية و المستوى التعليمي 202
- 226 التوافق الداخلي بين عائق الحصول على المال لتلقي الرعاية الطبية و حالة الاستقرار المهني للمرأة 202
- 227 التوافق الداخلي بين بعد المسافة عن المركز الصحي لتلقي الرعاية الطبية و وسط الإقامة 203

- 228 التوافق الداخلي بين تعرف المبحوثة على الإيدز (السيدا) و مستواها التعليمي 204
- 229 التوافق الداخلي بين متغير المصادر الإعلامية التي تلقت منها المعلومات عن مرض الإيدز (التلفزيون، الراديو) و متغير مشاهدة التلفزيون و متغير الاستماع للراديو 205
- 230 التوافق الداخلي بين مصادر تلقي المعلومات عن مرض الإيدز (الصحف/المجلات، الكتيبات/ الملصقات) و القدرة على القراءة 206
- 231 التوافق الداخلي بين مصادر تلقي المعلومات عن مرض الإيدز (المدارس/ الأساتذة) و حالة التمدرس 207
- 232 التوافق الداخلي بين مصادر تلقي المعلومات عن مرض الإيدز (مكان العمل) و الحالة المهنية في الماضي 208
- 233 التوافق الداخلي بين معرفة وسائل انتقال الإيدز و المستوى التعليمي 209
- 234 التوافق الداخلي بين معرفة كيفية تجنب الإيدز (الممارسة الجنسية الآمنة) و المستوى التعليمي 210
- 235 التوافق الداخلي بين معرفة النساء لوسائل تنظيم الأسرة (الحبوب، اللولب، الرضاعة الطبيعية) و المستوى الدراسي 211
- 236 التوافق الداخلي بين عدد سنوات استعمال وسائل منع الحمل (بها هرمونات) و عمر المرأة عند أول زواج و عمرها الحالي بالسنوات 212
- 237 التوافق الداخلي بين عدم استعمال المرأة للولب بسبب عدم معرفتها له و استعمال اللولب في السابق 213
- 238 التوافق الداخلي بين السبب الرئيسي للتوقف عن استعمال وسائل منع الحمل (الوصول لسن اليأس) و العمر الحالي 214
- 239 التوافق الداخلي بين الوسيلة المفضل استعمالها في المستقبل و الوسائل التي سبق استعمالها 215
- 240 التوافق الداخلي بين عدم تلقي كشف نسائي خلال الإثني عشرة شهراً الأخيرة و المستوى التعليمي و وسط الإقامة 216
- 241 التوافق الداخلي بين عدم الذهاب لتلقي الفحص الطبي للتدبير خلال الإثني عشر شهراً الماضية بسبب غياب الخدمة و ولاية الإقامة 217
- 242 التوافق الداخلي بين أسباب عدم تلقي الأشعة على الثديين (لغياب الخدمة) و ولاية الإقامة 217

## الفهرس

شكر

ملخص

قائمة الجداول

الفهرس

27	..... مقدمة
28	..... 1. الإطار النظري و المنهجي للدراسة
28	..... 1.1. الإشكالية
29	..... 2.1. الفرضية
29	..... 3.1. أسباب اختيار الموضوع
30	..... 4.1. أهمية الموضوع
30	..... 5.1. الدراسات السابقة
30	..... 6.1. مصادر المعطيات
31	..... 7.1. منهجية الدراسة
31	..... 8.1. الجانب النظري للدراسة
31	..... 1.8.1. نوعية معطيات المسوح
32	..... 1.1.8.1. تقييم استمارات المسوح
34	..... 2.1.8.1. تناسق المعطيات
34	..... 3.1.8.1. أخطاء الشمول
34	..... 4.1.8.1. أخطاء عدم الاستجابة
35	..... 5.1.8.1. معايير المعطيات والنتائج
35	..... 2.8.1. المعاينة المعتمدة في المسح (PAPFAM 2002)

38	..... 1.2.8.1. سحب العينة
39	..... 2.2.8.1. الاستمارات المستخدمة في المسح
39	..... 3.8.1. أهم مؤشرات المسح الجزائري لصحة الأسرة (PAPFAM 2002)
41	..... 2. اختبارات القيم الدنيا و القصوى
42	..... 1.2. خلفية المبحوثة و مواردها و الزواج
42	..... 1.1.2. هوية المبحوثة
42	..... 2.1.2. الرقم الترتيبي للمرأة (fligne)
43	..... 3.1.2. شهر ميلاد المرأة (f102a)
43	..... 4.1.2. سنة ميلاد المرأة (f102b)
44	..... 5.1.2. أعمار النساء بالسنوات الماضية (f103)
44	..... 6.1.2. الأعمار الحالية للنساء (f103c)
45	..... 7.1.2. وضعية النساء بالنسبة للتمدرس (f104)
46	..... 8.1.2. مستوى التعليم المحصل (f105)
46	..... 9.1.2. آخر سنة دراسية أكملت بنجاح (f106)
47	..... 10.1.2. الحصول على الشهادة الابتدائية (f107)
48	..... 11.1.2. القدرة على القراءة (f108)
48	..... 12.1.2. القدرة على الكتابة (f108b)
49	..... 13.1.2. مداومة قراءة الجرائد والمجلات (f109)
49	..... 14.1.2. مداومة مشاهدة التلفزيون (f110)
50	..... 15.1.2. مداومة الاستماع للراديو (f111)
51	..... 16.1.2. الحالة المهنية للمبحوثة (f112)
51	..... 17.1.2. ممارسة الأعمال و النشاطات التجارية و الفلاحية و مساعدة الأسرة (f113)
52	..... 18.1.2. ممارسة أي عمل في الماضي (f114)
52	..... 19.1.2. ممارسة أي عمل في الاثنى عشر شهرا الأخيرة (f115)
53	..... 20.1.2. العمل الرئيسي (f116)

53	.....	21.1.2. مكان مزاولة النشاط (f117)
54	.....	22.1.2. وتيرة ممارسة النشاط (f118)
54	.....	23.1.2. نوع الأجر أو المقابل (f119)
55	.....	24.1.2. الحالة الزوجية للمرأة (f124)
56	.....	25.1.2. عدد الزيجات (f125)
56	.....	26.1.2. شهر أول زواج (f126a)
57	.....	27.1.2. سنة أول زواج (f126b)
57	.....	28.1.2. العمر عند الزفاف الأول (f127)
58	.....	29.1.2. صلة قرابة المرأة بالزوج الأخير (f128)
58	.....	30.1.2. حالة تدرس الزوج الحالي (الأخير) (f129)
59	.....	31.1.2. أعلى مستوى تعليمي وصله الزوج (f130)
59	.....	32.1.2. آخر سنة دراسية أكملها الزوج بنجاح (f131)
		33.1.2. حصول الأزواج على الشهادة الابتدائية (ذوي المستوى الابتدائي و الذين أكملوا السنة السادسة بنجاح) (f132)
60	.....	34.1.2. قدرة الأزواج على القراءة (f133)
61	.....	35.1.2. قدرة الأزواج على الكتابة (f134)
62	.....	36.1.2. المهنة الرئيسية للأزواج (f135)
62	.....	37.1.2. الوضعية في المهنة (الأزواج) (f136)
63	.....	38.1.2. الحالة الزوجية الحالية للنساء (f140)
64	.....	39.1.2. العمر الحالي للزوج (f141)
64	.....	40.1.2. عدد الزوجات (f142)
65	.....	41.1.2. انتماء النساء للفئتين العمريتين 15-54 سنة و 55-59 سنة (f143)
66	.....	2.2. محور الإنجاب و وفيات الأطفال
66	.....	1.2.2. الولادات الحية (f201)
66	.....	2.2.2. وجود أبناء أحياء (ذكورا أو إناث) يعيشون مع المبحوثة (f202)

- 67 ..... 3.2.2. عدد الأبناء الذكور و الإناث الذين يعيشون مع المبحوثة (f203)
- 67 ..... 4.2.2. وجود أبناء أحياء (ذكورا أو إناث) لا يعيشون في البيت حاليا (f204)
- 68 ..... 5.2.2. عدد الأبناء (الذكور أو الإناث) الذين يعيشون في أماكن أخرى (f205)
- 68 ..... 6.2.2. عدد الأبناء المولودين أحياء ثم توفوا (f206)
- 69 ..... 7.2.2. عدد الأبناء (الذكور أو الإناث) الذين ولدوا أحياء ثم توفوا (f207)
- 69 ..... 8.2.2. مجموع الولادات الحية (f208)
- 70 ..... 9.2.2. حالات الحمل التي لم تنتهي بمولود حي (السقط، الإجهاض، الولادات الميتة) (f222)...
- 70 ..... 10.2.2. عدد حالات الحمل التي انتهت بسقط (f223)
- 71 ..... 11.2.2. عدد حالات الحمل التي أعقبت بإجهاض (f223b)
- 71 ..... 12.2.2. عدد حالات الحمل التي انتهت بمولود ميت (f224)
- 72 ..... 13.2.2. مآل آخر حمل لم ينق بولادة حية (سقط، إجهاض أو مولود ميت) (f224b).....
- 72 ..... 14.2.2. شهر حدوث آخر حالة حمل انتهى بمولود ميت أو إجهاض أو سقط (f225a) .....
- 73 ..... 15.2.2. سنة تسجيل آخر حالة حمل انتهى بمولود ميت أو إجهاض أو سقط (f225b).....
- ..... 16.2.2. آخر حالة حمل انتهت بمولود ميت أو إجهاض أو سقط (قبل أو بعد يناير 1997)
- 74 ..... (للتحقق من f225a و f225b ) (f226)
- 74 ..... 17.2.2. عدد شهور آخر حمل انتهى بمولود غير حي (f227)
- 75 ..... 18.2.2. الدخول إلى المستشفى عقب انتهاء الحمل غير المتوج بولادة حية (f228) .....
- 75 ..... 19.2.2. عدد ليالي الاستشفاء (f229) .....
- 76 ..... 20.2.2. الكشف عن الحمل المنتهي بولادة غير حية (f230) .....
- 77 ..... 21.2.2. شهر أول كشف عن الحمل الذي لم ينته بولادة حية (f231) .....
- 77 ..... 22.2.2. دافع أو سبب الكشف عن الحمل (f232) .....
- 78 ..... 23.2.2. عدد مرات الكشف خلال هذا الحمل (f233) .....
- 78 ..... 24.2.2. مكان إجراء آخر كشف عن الحمل (f234) .....
- 79 ..... 25.2.2. سبب عدم إجراء الكشف عن هذا الحمل (f235) .....

- 26.2.2. تناول أقراص أو شراب الحديد، فيتامينات/ كالسيوم/ مغنزيوم أو أي دواء آخر خلال  
80 ..... الحمل (f236)
- 27.2.2. أخذ الحقن لتحسين الجنين من التيتانوس (f237) .....  
80
- 28.2.2. التعرض للمضاعفات خلال الحمل المنتهي بمولود خير حي (f238).....  
81
- 29.2.2. التحقق من السؤال f238 (f239) .....  
82
- 30.2.2. تلقي النصيحة أو علاج الأعراض (f240) .....  
83
- 31.2.2. أسباب عدم تلقي علاج الأعراض (f241) .....  
84
- 32.2.2. تصنيف النسوة بالنظر إلى الحمل عند تاريخ الملاحظة (f242) .....  
85
- 33.2.2. عدد شهور الحمل (f243) .....  
85
- 34.2.2. الرغبة في الحمل الحالي (f244) .....  
86
- 35.2.2. استمرار الدورة الشهرية (f245) .....  
86
- 36.2.2. المدة منذ بداية آخر دورة شهرية (f246) .....  
87
- 37.2.2. عمر المرأة عند أول دورة شهرية (f247) .....  
88
- 38.2.2. تاريخ ميلاد آخر ولادة تمت بالنسبة ليناير 1997 (f248) .....  
88
- 3.2. قسم انتشار الأمراض المزمنة واعتلال الصحة بسبب الإنجاب .....  
89
- 1.3.2. حالة المرأة الصحية بصفة عامة (f501) .....  
89
- 2.3.2. تغير صحة المرأة مقارنة بالعام الماضي (f502) .....  
89
- 3.3.2. الإصابة بالأمراض المزمنة حالياً أو سابقاً (f503) .....  
90
- 4.3.2. كشف الطبيب عن الأمراض المزمنة وإخبار المصابات به (f504) .....  
91
- 5.3.2. أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بالأمراض المزمنة (f505) .....  
92
- 6.3.2. تناول علاج الأمراض المزمنة بصفة مستمرة (f506) .....  
93
- 7.3.2. المعاناة الآن أو سابقاً من احد أنواع السرطان (f507) .....  
94
- 8.3.2. نوع السرطان الذي تعاني (أو عانت) منه المبحوثات (f508) .....  
95
- 9.3.2. عمر المرأة عند إخبارها أو اكتشافها الإصابة بالسرطان (f509) .....  
96
- 10.3.2. تلقي أي علاج (الآن / في الماضي) للسرطان (f510) .....  
96

- 97 ..... 11.3.2. التحقق من السؤالين f208 و f222 (f510a)
- 97 ..... 12.3.2. الشعور بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل (f511)
- 98 ..... 13.3.2. مدة المعاناة من مشكلة الإحساس بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل (f512)
- 14.3.2. تغير حالة الإحساس بثقل أسفل البطن عند السعال أو العطاس أو رفع شيء ثقيل
- 98 ..... (f513)
- 99 ..... 15.3.2. تلقي النصيحة أو الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن (f514)
- 100 ..... 16.3.2. أسباب عدم تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن (f515)
- 17.3.2. مشكلة عدم التحكم في البول لدى المرأة عند السعال أو العطاس أو رفع شيء ثقيل
- 101 ..... (f516)
- 102 ..... 18.3.2. الاستشارة للعلاج أو تلقي النصيحة عن مشكلة عدم التحكم في البول (f517)
- 103 ..... 19.3.2. أسباب عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول نتيجة الحمل (f518)
- 20.3.2. المعاناة من آلام و حروق عند التبول أو من إفرازات مهبلية حادة أو غير مألوفة خلال
- 104 ..... الثلاثة أشهر الماضية (f519)
- 21.3.2. تعرض النسوة اللاتي عانين من إفرازات مهبلية حادة خلال 3 أشهر الأخيرة لهرش أو حساسية حول الجهاز التناسلي أو لإفرازات ذات رائحة كريهة أو لألم حاد في أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية (f520)
- 105 ..... 22.3.2. ظهور مشكل واحد على الأقل أو لا وجود لأي مشكل بالنظر للسؤال f519 (f521)...
- 106 ..... 23.3.2. الاستشارة للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (المشاكل) (f522)
- 107 ..... 24.3.2. أسباب عدم الاستشارة (f523)
- 108 ..... 25.3.2. حالة الحمل حالياً بالنظر للسؤال f242 (f524)
- 109 ..... 26.3.2. حالة الحيض بالنظر للسؤال f245 (f525)
- 109 ..... 27.3.2. وضعية النساء اللاتي مازلن يحضن الزوجية بالنظر للسؤال f124 (f526)
- 110 ..... 28.3.2. رغبة الحمل دون جدوى (f527)
- 110 ..... 29.3.2. عدد أشهر محاولة الحمل دون جدوى (f528)
- 111



- 112 ..... 30.3.2. السبب الرئيسي من وراء فشل الحمل حسب رأي المبحوثة (f529)
- 112 ..... 31.3.2. الاستشارة لإنجاح الحمل (f530)
- 113 ..... 32.3.2. أسباب عدم الاستشارة لإنجاح الحمل (f531)
- 114 ..... 33.3.2. قيام الأزواج بالاستشارة لإنجاح الحمل (f532)
- 115 ..... 34.3.2. مصدر استشارة الأزواج لإنجاح الحمل (f533)
- 35.3.2. المعانات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من: استمرار نزيف الدورة الشهرية أكثر من  
سبعة أيام، كثافة النزيف بصفة غير مألوفة، صاحبتهآ آام حادة، عدم انتظامها (f534)
- 116 ..... 36.3.2. وجود مشكل واحد على الأقل بالنظر للسؤال f534 (f535)
- 117 ..... 37.3.2. الاستشارة بغية علاج المشكلة/ المشاكل أو تلقي النصيحة (f536)
- 117 ..... 38.3.2. أسباب عدم الاستشارة (f537)
- 119 ..... 39.3.2. المكان المعتاد لتلقي الرعاية الصحية (f538)
- 120 ..... 40.3.2. العوامل المعيقة لتلقي الرعاية الطبية و درجتها (f539)
- 120 ..... 4.2. محور مرض الإيدز (السيدا) والأمراض الأخرى المنقولة جنسيا
- 122 ..... 1.4.2. المعرفة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (f601)
- 122 ..... 2.4.2. المعرفة بالأمراض المنقولة جنسيا (f602)
- 122 ..... 3.4.2. إصابة النساء بالأمراض المنقولة جنسيا خلال الإثنى عشر شهرا الماضية (f603)
- 123 ..... 4.4.2. الإصابة بمرض أو أكثر حسب الحالة الزوجية (متزوجة حاليا، غير متزوجة حاليا)  
بالنظر للسؤالين f124 و f603 (f604)
- 124 ..... 5.4.2. الاستشارة لعلاج الأمراض المنقولة جنسيا أو لتلقي النصيحة عنها (f605)
- 125 ..... 6.4.2. أسباب عدم المتابعة الطبية للأمراض المنقولة جنسيا (f606)
- 126 ..... 7.4.2. الحالة الزوجية الحالية للنساء المصابات (بمرض أو أكثر) بالنظر للسؤال f124  
(f607)
- 127 ..... 8.4.2. ذهاب الأزواج للاستشارة أو لعلاج نفس المرض (f608)
- 128 ..... 9.4.2. إصابة الزوج بأي من الأمراض المنقولة جنسيا خلال الإثنى عشر شهرا  
الأخيرة (f609)
- 129 .....

- 129 ..... 10.4.2. ذهاب الزوج للاستشارة أو العلاج (f610)
- 130 ..... 11.4.2. تلقي المرأة أي نصيحة أو علاج لنفس المرض عند إصابة الزوج (f611)
- 131 ..... 12.4.2. معرفة النساء لمرض الإيدز بالنظر للسؤال f602d (f612)
- 131 ..... 13.4.2. المصادر الإعلامية التي تلقت منها المبحوثات أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز (f613)
- 132 ..... 14.4.2. معرفة النسوة للوسائل التي تمكن المرء من الإصابة بالإيدز (f614)
- 133 ..... 15.4.2. معرفة النساء لإمكانية قيام المرء بشيء يجنبه الإصابة بالإيدز (f615)
- 134 ..... 16.4.2. معرفة النسوة لوسائل تجنب الإصابة بالإيدز (f616)
- 135 ..... 5.2. قسم تنظيم الأسرة و اتجاهات الإنجاب
- 135 ..... 1.5.2. تصنيف النساء بالنظر إلى أسباب عدم تتويج الحمل (f700)
- 135 ..... 2.5.2. استعمال وسائل تأخير أو منع الحمل في السابق (f701)
- 136 ..... 3.5.2. استعمال موانع الحمل (f702)
- 137 ..... 4.5.2. عدد الأبناء الأحياء إن وجدوا حين استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أول مرة (f703)
- 138 ..... 5.5.2. غاية استخدام وسيلة تنظيم الأسرة لأول مرة (f704a)
- 139 ..... 6.5.2. استعمال الحبوب، الحقن، الغرس بالنظر للسؤال f702 (f704b)
- 139 ..... 7.5.2. عدد سنوات استعمال وسائل منع حمل المشتملة على هرمونات (الحبوب، الحقن، الغرس) (f704c)
- 140 ..... 8.5.2. الحالة الزوجية الحالية بالنظر للسؤال f124 (f705)
- 140 ..... 9.5.2. الحالة الحالية للحمل بالنظر للسؤال f242 (f706)
- 141 ..... 10.5.2. استعمال المرأة أو الزوج لأي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة لتجنب الحمل (f707)
- 142 ..... 11.5.2. وسيلة منع الحمل المستعملة (f708a)
- 142 ..... 12.5.2. استعمال اللولب في الماضي بالنظر للسؤالين f702 و f708a (f708b)
- 143 ..... 13.5.2. سبب عدم استعمال اللولب على الإطلاق (f708c)
- 143 ..... 14.5.2. المشاكل التي صادفت النساء عند استعمال اللولب (f708d)
- 144 ..... 15.5.2. تصنيف النساء حسب نوع الوسيلة المستعملة بالنظر للسؤال f708a (f709a)

- 145 ..... مصدر الحصول على (اسم الوسيلة الحالية) آخر مرة (f709b).....
- 146 ..... مكان إجراء عملية التعقيم (للمرأة أو للزوج) (f709c).....
- 146 ..... السبب الرئيسي لاختيار عملية التعقيم (للمرأة أو للزوج) (f709d).....
- 147 ..... مدد استعمال الوسيلة دون انقطاع (الأشهر، السنوات) (f710).....
- 148 ..... مصادفة مشاكل عند استعمال الوسيلة الحالية (f711).....
- 149 ..... مصادفة المشاكل عند استعمال الوسيلة الحالية (f712).....
- 150 ..... السبب الرئيسي لتوقف النساء عن استعمال وسائل تنظيم الأسرة (f713).....
- 150 ..... توزيع النساء حسب الحالة الزوجية الحالية بالنظر للسؤال f124 (f714).....
- 151 ..... النية في استعمال أي وسيلة لتنظيم الولادات مستقبلاً (f715).....
- 25.5.2. السبب الرئيسي لعدم الرغبة في استعمال وسيلة لتنظيم الولادات  
في المستقبل (f716).....
- 152 ..... وقت بدء استعمال وسيلة تنظيم الولادات (f717).....
- 153 ..... الوسيلة المفضل استعمالها مستقبلاً (f718).....
- 154 ..... الموافقة على استعمال الأزواج لوسائل تنظيم الأسرة (f719).....
- 154 ..... الحالة الزوجية للنساء بالنظر للسؤال f124 (f720).....
- 155 ..... موافقة الزوج على استعمال الأزواج لوسائل تنظيم الولادات (f721).....
- 156 ..... عدد مرات التحدث مع الزوج عن تنظيم الولادات خلال السنة الماضية (f722).....
- 156 ..... الوسيلة المستعملة حالياً بالنظر للمتغير f708a (f724).....
- 157 ..... رغبة النساء الحوامل و غير الحوامل حالياً في إنجاب الأطفال مستقبلاً (f725).....
- 158 ..... جنس المولود القادم (f726).....
- 35.5.2. مدة الانتظار المفضلة لدى النساء اللاتي يرغبن في إنجاب الطفل القادم (بالنظر للسؤال  
f242 (f727a).....
- 36.5.2. الزمن الفاصل بين ولادتين (الحوامل) أو بعد تاريخ الملاحظة و الولادة المستقبلية  
(بالنظر للسؤال f242 (f727b).....
- 159 .....

	37.5.2. حديث النساء مع أزواجهن حول عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم طوال حياتهن
160	..... الإنجابية (f728) .....
	38.5.2. مقارنة عدد الأطفال الذين يرغب فيهم الزوج بالنسبة للعدد المرغوب من طرف المرأة
160	..... (f729) .....
161	..... 39.5.2. عدد الأطفال المفضل من قبل المرأة (f730) .....
162	..... 40.5.2. المفاضلة بين الجنسين من وجهة نظر الأمهات (f731) .....
162	..... 41.5.2. الفترة المفضلة بين ولادتين متتاليتين حسب المستجوبات (f732) .....
164	..... 42.5.2. آراء النساء في مجال الأعمار الأنسب لزواج البنات (f733) .....
164	..... 43.5.2. عدد الأطفال المفضلين من طرف النساء لبناتهن (f734) .....
165	..... 44.5.2. الموافقة على دخول البنات لعالم الشغل (f735) .....
166	..... 6.2. محور الصحة الإنجابية .....
166	..... 1.6.2. تلقي كشف نسائي خلال الإثني عشر شهراً الماضية (f904) .....
166	..... 2.6.2. عدد مرات تلقي الكشف النسائي خلال الإثني عشر شهراً الماضية (f905) .....
167	..... 3.6.2. مكان تلقي آخر كشف نسائي (f906) .....
167	..... 4.6.2. أسباب عدم تلقي الكشف (f907) .....
168	..... 5.6.2. قيام النساء بعمليات المسحة (التطهر) خلال الإثني عشر شهراً الماضية (f908) .....
169	..... 6.6.2. مكان عمل آخر مسحة (f909) .....
170	..... 7.6.2. تكلفة المسحة آخر مرة (f910) .....
170	..... 8.6.2. أسباب عدم تلقي المسحة خلال الإثني عشر أشهر الأخيرة (f911) .....
171	..... 9.6.2. معرفة النساء بالفحص الذاتي للثدي لاكتشاف أورام الثدي مبكراً (f912) .....
172	..... 10.6.2. الفحص الذاتي المنتظم للصدر (f913) .....
	11.6.2. إجراء فحص الثدي لاكتشاف الأورام مبكراً خلال
172	..... الإثني عشرة شهراً الماضية (f914) .....
173	..... 12.6.2. مكان تلقي آخر فحص طبي للثدي (f915) .....
174	..... 13.6.2. تكلفة الفحص الطبي للثدي آخر مرة (f916) .....

- 174 .....14.6.2. أسباب عدم تلقي الفحص الطبي للثدي خلال الإثني عشرة شهرا الماضية (f917).....
- 175 .....15.6.2. تعريف الثديين للأشعة (f918).....
- 176 .....16.6.2. تاريخ آخر تعرض للأشعة على مستوى الثديين (المدة) (f919).....
- 176 .....17.6.2. مكان تلقي أشعة الثديين (آخر مرة) (f920).....
- 177 .....18.6.2. تكلفة الأشعة (آخر خدمة) (f921).....
- 178 .....19.6.2. أسباب عدم إجراء الأشعة (f922).....
- 179 .....3. اختبارات التوافق الداخلي أو الارتباط بين المتغيرات.....
- 179 .....1.3. النساء المؤهلات.....
- 180 .....2.3. التوافق الداخلي بين التمدرس و المستوى التعليمي.....
- 181 .....3.3. التوافق الداخلي بين المستوى التعليمي و القدرة على القراءة و الكتابة.....
- 181 .....4.3. التوافق الداخلي بين القدرة على القراءة و وتيرة القراءة و وتيرة مشاهدة التلفزيون.....
- .....5.3. التوافق الداخلي في الإحالات بين الحالة المهنية الحالية و ممارسة أي نشاط
- 182 .....و الحالة المهنية في الماضي و القيام بأي عمل خلال 12 شهرا الماضية.....
- 183 .....6.3. التوافق بين المستوى التعليمي و المهنة الرئيسية للمبحوثة (f105 و f116).....
- .....7.3. التوافق الداخلي بين حالة تمدرس الزوج و مستواه التعليمي و آخر سنة أكملها بنجاح و
- 185 .....الحصول على الشهادة الابتدائية و القدرة على القراءة.....
- 186 .....8.3. التوافق الداخلي بين المستوى التعليمي و المهنة الرئيسية للأزواج.....
- .....9.3. التوافق الداخلي بين وسط الإقامة (ريف/ حضر) و عدم تلقي الكشف عن الحمل
- 187 .....بسبب عدم توفر الخدمة.....
- .....10.3. التوافق الداخلي بين عدد الولادات الحية للمبحوثة و عدم تلقيها الكشف عن الحمل
- 188 .....بسبب خبرتها السابقة.....
- .....11.3. التوافق الداخلي بين عدد الولادات الحية للمبحوثة و عدم طلب استشارة طبية
- 189 .....بالنظر إلى الأعراض (المدرجة في السؤال f238) بسبب خبرتها السابقة.....
- 190 .....12.3. التوافق الداخلي بين حالة الحمل و الحالة الزوجية للمرأة.....
- 191 .....13.3. التوافق الداخلي بين حالة الدورة الشهرية و عمر المرأة بالسنوات.....

- 192 ..... 14.3. التوافق الداخلي بين الحالة بالنظر إلى الدورة الشهرية و الوضعية بالنظر للحمل.....
- 15.3. التوافق الداخلي بين الكشف عن المرض المزمن من طرف طبيب و تناول  
192 ..... العلاج بصفة مستمرة .....
- 16.3. التوافق الداخلي بين سبب عدم الاستشارة الطبية إثر الإحساس بثقل أسفل البطن كنتيجة  
193 ..... للحمل (بسبب غياب الخدمة) و وسط الإقامة (حضري، ريفي).....
- 17.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية حول مشكلة عدم التحكم في البول لاعتقاد  
194 ..... النسوة أن ذلك لا يساعد (1 =f518a) و مستوى التعليم (1>f105).....
- 18.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند عدم التحكم في البول لغياب الخدمة  
195 ..... (1 =f518c) و وسط الإقامة (mstrate =1) .....
- 19.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند مجابهة مشاكل (هرش أو حساسية،  
إفرازات ذات رائحة كريهة، آلام أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية) بسبب انشغالها/  
195 ..... انشغال الزوج و الحالة المهنية للمبحوثة و لزوجها .....
- 20.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند ظهور بعض المشاكل  
(هرش أو حساسية، إفرازات ذات رائحة كريهة، آلام أسفل البطن غير متعلق  
196 ..... بالدورة الشهرية) بسبب انعدام الخدمة و وسط الإقامة .....
- 21.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة للاعتقاد أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي.....  
197 ..... 22.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة بغية الحمل للاعتقاد أن ذلك لا يساعد و المستوى  
198 ..... التعليمي .....
- 23.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (بغية الحمل) لانشغال الزوج أو الزوجة  
198 ..... و الحالة المهنية للمبحوثة و لزوجها .....
- 24.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند التعرض لمشاكل الدورة الشهرية بسبب  
199 ..... غياب الخدمة و وسط الإقامة .....
- 25.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) بسبب شغل المرأة  
200 ..... أو زوجها و الحالة المهنية للمبحوثة و مهنة الزوج .....

	26.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) بسبب الاعتقاد	
200	..... أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي	
	27.3. التوافق الداخلي بين عائق عدم معرفة المرأة مكان تلقي الرعاية الطبية و المستوى	
201	..... التعليمي	
	28.3. التوافق الداخلي بين عائق الحصول على المال لتلقي الرعاية الطبية و حالة الاستقرار	
202	..... المهني للمرأة	
203	..... 29.3. التوافق الداخلي بين عائق المسافة و تلقي الرعاية الطبية و وسط الإقامة	
203	..... 30.3. التوافق الداخلي بين تعرف المبحوثة على الإيدز (السيدا) و مستواها التعليمي	
	31.3. التوافق الداخلي بين متغير المصادر الإعلامية التي تلقت منها أكبر قدر من المعلومات	
204	..... عن مرض الإيدز (التلفزيون، الراديو) و متغير مشاهدة التلفزيون و متغير الاستماع للراديو	
	32.3. التوافق الداخلي بين مصادر تلقي المعلومات عن مرض الإيدز (من الصحف/المجلات،	
206	..... الكتيبات/ الملصقات) و القدرة على القراءة	
	33.3. التوافق الداخلي بين مصادر تلقي المعلومات عن مرض الإيدز (المدارس/ الأساتذة)	
207	..... و حالة التمدرس	
	34.3. التوافق الداخلي بين مصادر تلقي أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز	
207	..... (من مكان العمل) و الحالة المهنية في الماضي	
208	..... 35.3. التوافق الداخلي بين معرفة وسائل انتقال الإيدز و المستوى التعليمي	
	36.3. التوافق الداخلي بين معرفة كيفية تجنب الإيدز (الممارسة الجنسية الآمنة)	
210	..... و المستوى التعليمي	
	37.3. التوافق الداخلي بين معرفة النساء لوسائل تنظيم الأسرة (الحبوب، اللولب، الرضاعة	
210	..... الطبيعية) و المستوى الدراسي	
	38.3. التوافق الداخلي بين عدد سنوات استعمال وسيلة منع الحمل (بها هرمونات) (f704c)	
211	..... و عمر المرأة عند أول زواج (f127) و عمرها الحالي بالسنوات (f103)	
	39.3. التوافق الداخلي بين عدم استعمال المرأة للولب بسبب عدم معرفتها له	
213	..... و استعمال اللولب في السابق	

	40.3. التوافق الداخلي بين السبب الرئيسي للتوقف عن استعمال وسائل منع الحمل
213	..... (حالة الوصول لسن اليأس) و العمر الحالي للمبحوثة .....
	41.3. التوافق الداخلي بين الوسيلة المفضل استعمالها في المستقبل و الوسائل التي سبق
214	..... استعمالها.....
	42.3. التوافق الداخلي بين عدم تلقي كشف نسائي خلال الإثني عشرة شهرا الأخيرة
215	..... و المستوى التعليمي و وسط الإقامة .....
	43.3. التوافق الداخلي بين أسباب عدم تلقي الفحص الطبي للتدبير خلال الإثني عشرة شهرا
216	..... الأخيرة (بسبب غياب الخدمة) و ولاية الإقامة .....
	44.3. التوافق الداخلي بين أسباب عدم تلقي الأشعة (على الثديين بسبب غياب الخدمة)
217	..... و ولاية الإقامة .....
219	..... الاستنتاج العام .....
223	..... الملحق .....
277	..... قائمة المراجع .....



## مقدمة

تعتبر الدراسات السكانية، من حيث المعرفة التي توفرها عن السكان وتوزيعهم وخصائصهم أساس كل مشروع اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، فالعنصر البشري يعد أحد الأبعاد الأساسية في التخطيط سواء على المستوى الوطني أو على مستوى وحدات مكانية أصغر . ترتبط المعطيات الديموغرافية ارتباطاً وثيقاً بالتعدادات السكانية و الحالة المدنية (التسجيلات الحيوية) والمسوح السكانية.

يمثل المسح بالعينة أحد الأدوات المهمة التي تجمع من خلاله المعطيات السكانية، و تتسم البيانات التي تجمع عن طريق المسح بالعينة بسهولة التنفيذ، و يتميز المسح بالعينة بقلّة تكاليفه مقارنة بالحصص الشامل (التعداد)، إذ يمكن إجراء المسح بالعينة في حدود الإمكانيات المتاحة ، و يمكن من خلال المسح بالعينة الحصول على النتائج بسرعة وفي وقت قصير مقارنة بالحال عندما يكون الحصر شاملاً كما يمكن دراسة أية ظاهرة سكانية أو اجتماعية أو اقتصادية محلياً في أي وقت.

و نظراً للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها المسوح من خلال أهمية معطياتها، تطرقنا في هذا الموضوع إلى تقييم نوعية معطيات ملف الخصوبة و هو أحد الملفات التي تضمنها المسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة لسنة 2002 و فحصها قصد الوقوف على مصداقيتها.

## الفصل 1

### الإطار النظري و المنهجي للدراسة

#### 1.1. الإشكالية:

تعتبر معايير قياس و ضبط جودة بيانات المسوح الميدانية مطلباً ملحاً سواء على المستوى المحلي أو العالمي، كون أن مستخدمي المعطيات هم في غالب الأحيان محليين، و كذلك الأمر فإن المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية تعد من المستخدمين الدائمين لإحصاءات الدول ومن أهم هذه الهيئات الإقليمية جامعة الدول العربية.

هذه الهيئات تكون حريصة على الحصول على معطيات و إحصائيات عالية الجودة ، لذا نجد أن بعض المنظمات والهيئات العالمية تقوم بإجراء إحصائيات خاصة بها، نتيجة لعدم ثققتها بالإحصاءات والمعطيات المنتجة على مستوى الدول و خصوصاً في البلدان النامية، ومنها الدول العربية، و من هنا نجد أن الأجهزة الإحصائية في الدول العربية بدأت باعتماد معايير لضبط جودة المعطيات لأن هذه البيانات هي الأساس لأي عمل تخطيطي لتلك البرامج الإنمائية ولعملية اتخاذ القرار.

يؤثر تردي المعطيات على فعالية استخدامها والاعتماد عليها في استخراج مؤشرات تجند، بغية التعرف على الأوضاع الديم و جرافية و الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع أو فئاته المختلفة،

لذلك يقتضى إجراء معالجة نوعية المعطيات باستخدام الأساليب العلمية الحديثة المتبعة في مثل هذا النوع من الدراسات بغرض رفع مستوى دقتها وزيادة درجة الثقة بها و تسهلي استخدامها.

أما بالنسبة لموضوعنا المتعلق بنوعية معطيات المسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة لسنة 2002 (PAPFAM 2002) و بالتحديد ملف الخصوبة نقوم بطرح الأسئلة التالية:

- ما مدى جودة معطيات ملف الخصوبة في المسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة لسنة 2002؟
- هل المعطيات الخاصة بالخصوبة جيدة و ذات ثقة عالية نظرا لتجارب الجهات التي أشرفت على تنفيذ و إدارة و رعاية عملية هذا المسح؟

### 2.1. الفرضية:

قام الديوان الوطني للإحصائيات بإنجاز المسح الجزائري لصحة الأسرة لسنة 2002 بالتعاون مع وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات و المشروع العربي لصحة الأسرة ، و تتلخص الأهداف الرئيسية للمسح الجزائري لصحة الأسرة في تزويد رسمي السياسات ومخططي البرامج والباحثين بقاعدة معلومات متكاملة في المجالات الديموغرافية والاجتماعية وصحة الأسرة للمساعدة في رسم السياسات الصحية ووضع الخطط والبرامج التنموية.

و نظرا لطول تجربة هذه الجهات التي أنجزت المسح، و نظرا لأهمية المعطيات في استخراج مختلف المؤشرات، نفترض أن تكون هذه المعطيات ذات نوعية جيدة.

### 3.1. أسباب اختيار الموضوع:

تم اختيار الموضوع على الأسس التالية:

- مساهمته التخصص؛
- نظراً لتوفر المعطيات اللازمة، الشرط الأساسي لأي عمل أو بحث علمي؛
- عدم التطرق سابقا لمعالجة نوعية معطيات ملف الخصوبة في المسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة لسنة 2002.

#### 4.1. أهمية الموضوع:

تشكل أهمية البحث البنية الأساسية لتحديد الإطار العام للدراسة. إن لكل دراسة أهداف أو هدف علمي أو عملي، ولأن موضوع نوعية معطيات المسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة لسنة 2002 و تحديدا ملف الخصوبة لم يعالج بعد، رغبتنا في معالجته قصد تسليط بعض الضوء على مستوى جودة المعطيات التي يتضمنها هذا المسح.

#### 5.1. الدراسات السابقة:

لا توجد دراسات كثيرة في مجال نوعية المعطيات و تقييمها إلا أننا نجد: "سعدى رابح" قد عالج موضوع نوعية المعطيات الديمغرافية في الجزائر لتعداد سنة 1998 في رسالة دكتوراه دولة في الديموغرافيا سنة 2007 بجامعة سعد دحلب البليدة، حيث تطرق إلي تقييم مصداقية تعداد 1998 بناء على فحص نوعية معطياته، لأن البحوث المرتبطة بجمع المعطيات في الجزائر نادرة. و مكنه البحث عن الأخطاء المتعلقة بالإحصاء العام للسكان و السكن لسنة 1998 من إبراز عاملين أساسيين:

- غياب شبه تام لأخطاء ما يعرف بتجاوز حدود الترميز؛
- سجل عدم توافق معطيات بعض المتغيرات المستخدمة فيما بينها. [7]

#### 6.1. مصادر المعطيات:

تعتمد البلدان المتقدمة في الدراسات السكانية و الديموغرافية على معطيات محصلة من مصادر التعدادات العامة للسكان بالدرجة الأولى و مصادر بيانات الحالة المدنية بالدرجة الثانية و المسوح الوطنية بالدرجة الثالثة، لأن دقة و مصداقية بياناتها كبيرة جدا، و ذلك للتحكم الكبير في عمليات جمع المعطيات (نسبة خطأ تقل عن 5 %)، في حين يعتمد في الدراسات الخاصة بالدول النامية و الجزائر واحدة منها أساسا على المسوح الوطنية.

كان المسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة لسنة 2002 (ملف الخصوبة) PAPFAM (2002) مصدر معطيات هذه الدراسة.

## 7.1. منهجية الدراسة:

نعتمد في هذا العمل على المنهج الإحصائي الوصفي، لذا سنلجأ لاستعمال نوعين من اختبارات الارتباط:

- اختبارات القيم الدنيا و القصوى: و هي اختبارات بسيطة تهدف للكشف عن أخطاء الملاحظة مثل جمع البيانات و إدخالها، الترميز، و ذلك اعتمادا على جداول بسيطة تكشف الأخطاء المتعلقة بالمعطيات الناقصة و المعطيات غير الموافقة لمجال الترميز.
- اختبارات التوافق الداخلي أو الارتباط بين المتغيرات: تستخدم لفحص التوافق بين القيم المستخرجة من عدة متغيرات، من خلال إعداد جداول مركبة من متغيرات ترتبط فيما بينها بعلاقة حقيقية أو منطقية، تمكننا من كشف أخطاء التوافق فيما بينها، و هي اختبارات معقدة. [7] ص 72

## 8.1. الجانب النظري للدراسة:

يشمل هذا المحور بعض المفاهيم و المصطلحات (نوعية معطيات المسوح و المعاينة المعتمدة في المسح (PAPFAM 2002)) إلى جانب أهم المؤشرات المستخرجة منه.

### 1.8.1. نوعية معطيات المسوح:

تشكل البيانات الإحصائية حجر الأساس لعلم الإحصاء، و هي تشير إلى فئات الأشخاص و مجموعاتهم التي يجري عليها البحث و الدراسة. [1] ص 103.

كانت تستعمل كلمة إحصاء في الماضي لتدل على البيانات التي تجمعها الدولة عن مجتمعها. أما في الوقت الحاضر فإننا نستعمل المعطيات الديموغرافية للتدليل على البيانات التي نجتمعها عن المجتمع و على وجه الخصوص حجمه و تركيبته و معطيات إحصاءاته الحيوية (الولادات، الوفيات، عقود الزواج، حالات الطلاق، الهجرة) و غيرها. [2]

تختلف دقة الإحصاءات الديموغرافية باختلاف البلدان. في الدول التي أنشأت دائرة الأحوال المدنية منذ أمد طويل، تتصف الإحصاءات الصادرة عنها بدقة تكاد تكون كاملة. و على الضد من ذلك، يعطي التعداد (و هو عملية شاقة يجب انجازها في وقت قصير مع إسناد زمني) إحصاءات أقل جودة. و هكذا، تسمح عموماً عمليات المراقبة باكتشاف حالات إغفال و عد مزدوج. [3]

تشكل التعدادات السكانية، الحالة المدنية و المسوح، أهم مصادر المعطيات الإحصائية في الديموغرافيا حيث يعتمد في البلدان المتقدمة على مصدرين أساسيين و هما التعدادات السكانية بالدرجة الأولى، لأن دقة الملاحظة و الشمولية فيها تصل أحيانا إلى 95%، ثم مصادر الحالة المدنية بالدرجة الثانية، في حين لا يعتمد الخبراء الديمغرافيون عند دراسة الحالة السكانية للبلدان النامية على هذين المصدرين، نظرا للصعوبات الإدارية و المالية التي تواجهها هذه البلدان، لذا يعتمد على المسوح. [4] ص 45، ص 49

يوجد لدينا نوعان من المسوح الميدانية:

- أسلوب الحصر الشامل (التعدادات).
- أسلوب المسح بالعينة.

و في الحالتين نتبع نفس المراحل في العمليات الإجرائية ماعدا مرحلة تحديد العينة و سحبها في النوع الثاني (المسح بالعينة).

### 1.1.8.1. توثيق استمارات المسوح:

تعتبر الاستمارة من أهم أدوات القياس والأكثر تداولاً في المسوح الميدانية السكانية و الاجتماعية و الاقتصادية، و من هنا لابد أن تكون الاستمارة ملبية لأهداف المسح و للأسس العملية المتعارف عليها. و لتقييم جودة استمارة المسح يجب التركيز على مايلي:

#### • المحتوى:

حيث يجب التأكد من أن أسئلة الاستمارة تعكس المعلومات المتوقع الحصول عليها من المبحوثين لكل بند من بنود الاستمارة و التأكد من أن الأسئلة تساهم كل على حدا في تحقيق أحد أهداف المسح ( الجزئية و الكلية). و التأكد من عدم الإطالة غير الهجدية و التي قد تبعد البحث عن

هدفه و تؤدي إلى تملل المبحوثين. و أن نستخدم لغة سهلة في إعداد الاستمارة و أن نبدأ بمقدمة توضح أهداف المسح و التدرج بالأسئلة من السهلة إلى الأكثر صعوبة. [5]

#### • النوع:

و يقصد بنوع الأسئلة (مفتوحة، مغلقة) و هنا نجد أن جودة الاستمارة تعتمد على أن تكون الأسئلة المغلقة هي الأساس في الاستبيان و عدم الاعتماد على الأسئلة المفتوحة التي تجعل المقارنة بين الإجابات صعبة نتيجة لعدم استخراج كل مبحوث لنفس هيكل الإسناد و هذه الأسئلة تشجع على الإطالة مما يؤدي إلى صعوبة تحليلها. و هذه الأسئلة عادة تتطلب وقتاً و جهداً كبيرين من المبحوث و قد تؤدي إلى الحصول على إجابات لا علاقة لها بموضوع المسح و هنا يجب التعرف على نسبة الأسئلة التي ليس لها علاقة بموضوع المسح حيث يتم تصنيف هذه الإجابات.

أما في حالة الأسئلة المغلقة يجب أن تكون الاختيارات شاملة، بحيث تضم كافة الإجابات المتوقعة، و أن تكون غير منقطعة بحيث تسمح للمبحوث بإعطاء إجابة وحيدة محددة، و يجب أن تعبر هذه الاختيارات عن الاختلافات في النزعة لإجابات المبحوثين، إلا أن استخدام أسلوب الأسئلة المغلقة يحد أحياناً من إمكانية اكتشاف أشياء قد لا يتوقع وجودها. و هنا يجب اختيار الأسئلة المغلقة و المفتوحة بدقة كبيرة. [5]

#### • الصياغة:

إن صياغة الأسئلة في الاستمارة تعد عاملاً أساسياً من عوامل نجاح المسح الإحصائي، إذ أن صياغة الاستبيان بطرق معينة قد يؤدي إلى تحيز كبير لا يعكس الواقع، فلا نضع أسئلة قد توحى بالإجابة التي نريدها و لا نسأل عن مواضيع لا إطلاع للمبحوثين عليها. [5]

#### • الشكل:

إن لعرض الاستمارة بشكل جيد أثر كبير على نجاح البحث، بحيث لا تكون الأسئلة مكتظة و مطولة مما قد تؤدي إلى التذمر و الملل، و يجب تصنيفها و ترميزها بشكل جيد. كما يجب ترتيب الأسئلة وفق تسلسل منطقي مع الأخذ بعين الاعتبار ترتيبها بحيث تخفي الأسئلة الكاشفة و المصادقية. [5]

### 2.1.8.1. تناسق المعطيات:

يعطي اتساق البيانات الصورة الداخلية من معايرة و ضبط جودة المعطيات، و هنا نقصد الانسجام والتوافق بين بيانات بحوث المسوح الميدانية و هو المرحلة الأولى من مراحل ضبط البيانات، و هنا توضع قواعد تحقق للعاملين في التدقيق المكتبي، بحيث نضمن أن تصل الاستبيانات إلى مرحلة الترميز و من ثم الإدخال على الحاسب بأقل التناقضات و الأخطاء الممكنة و هذا يكون على مستوى كل بند من بنود الاستبيان و على مستوى الأفراد الذين تم أخذ البيانات عنهم و على مستوى البنود المختلفة للفرد المبحوث. [5]

### 3.1.8.1. أخطاء الشمول:

في حال التعدادات قد تسقط بعض المناطق من التعداد أو بعض المساكن أو الطرق إما نتيجة لضعف في التحضير أو إسقاط متعمد من قبل القائمين على العمل الميداني، و يتم اكتشاف ذلك عن طريق القيام بالعد البعدي.

أما في حال المسوح فإن النقص بالشمول هو ناتج عن عدم تمثيل الإطار المستخدم في اختيار العينة لجميع مفردات المجتمع المدروس، حيث ينتج تقديرات متحيزة بسبب العينة. [5]

### 4.1.8.1. أخطاء عدم الاستجابة:

توجد حالتان من عدم الاستجابة:

■ عدم الاستجابة الكلية: و هو حالة الرفض من قبل وحدة المعاينة للاستجابة بشكل كامل على الاستمارة محل الدراسة، لهذا عادة ما تؤخذ بعين الاعتبار نسبة معينة لعدم الاستجابة عند إعداد وتصميم العينة.

■ عدم الاستجابة الجزئية: و هنا نقصد أن وحدة المعاينة تستجيب بشكل عام، إلا أنها ترفض الإجابة على بعض الأسئلة داخل الاستمارة، كأن تكون أسئلة ذات خصوصية معينة فلا يتم الإجابة عنها إما بدافع الخوف أو الخجل أو تبعاً للعادات و التقاليد، و هنا يجب التعرف على حجم المعطيات المفقودة في كل بند من بنود الدراسة و تحديد تأثيرها على النتائج، و عليه يتم قياس مؤشر عدم الاستجابة الكلية والجزئية. [5]



### 5.1.8.1. معايير المعطيات و النتائج:

و هذه المرحلة تعتبر المرحلة الأهم و هي تسبق مرحلة النشر و هنا نعني انسجام بيانات المسح و اتساقها و اتفاقها مع بيانات و نتائج المسوح الكبرى المعترف بها أو مع المعايير الدولية. و هنا لابد من التطرق إلى النقاط التالية:

○ هل تتسم معطيات المسح بالقبول؟

حيث أن المعيارية لا تتوقف فقط على النتائج و إنما تشمل و بشكل رئيسي المعطيات، و هنا لابد من وضع حدود معينة أو معيارية، بحيث توضع حدود للسماحية الإحصائية للمعطيات.

و يوجد نوع آخر من المعيارية و هو معايرة منطقية المعطيات و هو أن تكون ضمن الحدود الطبيعية للمتغيرات محل الدراسة.

○ هل تتسم نتائج المسح بالقبول؟

و هنا يتم مقارنة نتائج المسح مع مسوح سابقة مشابهة أو مع معايير دولية تم وضعها لنتائج مثل هذه المسوح، بحيث تكون بمثابة مقاييس معيارية يتم من خلالها التأكد من مدى معقولية و صحة النتائج التي تم التوصل إليها في المسح المراد اختبار جودته. يجب مراعاة الفرق الزمني بين المسح الحالي و المسح المقارن به و بشكل خاص إذا كانت المعطيات مرنة بالنسبة للزمن. [5]

### 2.8.1. المعاينة المعتمدة في المسح (PAPFAM 2002):

تم تبني عينة متعددة الدرجات:

المستوى الأول: سحب الوحدات الأولية و هي المقاطعات و التي يبلغ عددها 510 مقاطعة.

المستوى الثاني: سحب الوحدات الثانوية أو الأسر بمعدل 20 أسرة عن كل مقاطعة بالنسبة

للعينة الرئيسية، بهدف تحديد المؤشرات الديموغرافية و الصحية، و 40 أسرة تتعلق بالعينة

الموسعة بهدف قياس مستوى وفيات الرضع. للإشارة أن الأربعين ( 40 ) أسرة المسحوبة في كل

مقاطعة و المتعلقة بالعينة الموسعة، تتكون من العشرين ( 20 ) أسرة المحسوبة في إطار العينة

الرئيسية، التي أضيف إليها 20 أسرة أخرى، و يبلغ عدد الوحدات الثانوية أو الأسر 10200 أسرة بالنسبة للعينة الرئيسية و 20400 بالنسبة للعينة الموسعة.

و قبل الشروع في سحب العينة و توزيعها على المستوى الوطني، تم تصنيف ولايات البلاد إلى أربعة مناطق جغرافية. و التي تمثل المناطق الصحية للجزائر. و يخضع هذا التقسيم إلى مبدأ توفير عدد معين من المؤشرات الديموغرافية و الصحية على مستوى كل ناحية و حسب المستويات الحضرية و الريفية، و هذا من أجل تقييم السياسات الجهوية في مجال الصحة.

للإشارة إن توزيع الأسر حسب وسط الإقامة يبلغ على التوالي 60 و 40% بين الحضر و الريف من مجموع الأسر العادية و الجماعية الموجودة على المستوى الوطني. غير أن هذا التقسيم ليس متجانسا عبر كافة مناطق البلاد.

تتكون المناطق الصحية من:

المنطقة الصحية بوسط البلاد و تضم 11 ولاية و هي: بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، الجلفة، المدية، برج بو عريريج، بومرداس، تيبازة و عين الدفلى.

المنطقة الصحية بغرب البلاد و تتكون من 11 ولاية و هي: الشلف، تلمسان، تيارت، سعيدة، سدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران، تيسمسيلت، عين تموشنت، غيلزان.

المنطقة الصحية بشرق البلاد و تتكون من 14 ولاية و هي: أم البواقي، باتنة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، المسيلة، الطارف، خنشلة، سوق هراس، ميله.

المنطقة الصحية بجنوب البلاد و تتكون من 12 ولاية و هي: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنراست، ورقلة، البيض، إليزي، تندوف، الوادي، النعامة، غرداية.

للحصول على معلومات لها مستوى تفصيلي في منتهى الدقة من أجل استنباط المؤشرات، و التي تسمح بإجراء التقديرات اللازمة انطلاقا من العينة المختارة، تم تقسيم المناطق الأربع (شرق، غرب، وسط و جنوب) إلى 17 منطقة فرعية، و هذا حسب المقاييس المبينة أدناه

و المستخرجة من الإحصائيات المشتقة من الإحصاء العام للسكان و السكن و التحقيقات الأخرى حول الحالة المدنية:

- مؤشر للخصوبة الكلي؛
- نسبة الأمية؛
- نسبة ربط المساكن بشبكات الصرف الصحي؛
- نسبة السكان المقيمين بالمناطق المبعثرة.

تم اختيار هذه المقاييس نظرا لعلاقتها بالظواهر المدروسة و توفرها على مستوى كل ولاية.

و يأخذ التقسيم مبرراته كون الولايات التي تشكل كل منطقة صحية، غير متجانسة فيما يخص عددا من المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية و التي ترتبط أيما ارتباط بالأهداف المتوخاة من هذا المسح، الذي يقتضي القيام بمثل هذا التقسيم.

إن مثل هذا التقسيم سيسمح من جهة أخرى بالتقليل بشكل كبير من خطأ المعاينة على مستوى مختلف المؤشرات، و بالتالي سيسمح بالحصول على أفضل مستوى من الدقة لمختلف البيانات التقديرية.

لقد تم تحديد الوحدات الثانوية أو الأسر التي يجري التحقيق عليها في كل منطقة فرعية انطلاقا من العينة الإجمالية، التي قسمت بالتساوي على 17 منطقة فرعية أي ما مقداره  $600 = 17/10200$  أسرة معيشية.

لتجنب تشتت كبير تم سحب مقاطعتين في كل بلدية في حالة ازدواجية عدد المقاطعات و أكثر لما يكون هذا العدد مختلفا، خص هذا السحب 15 منطقة. بالنسبة للمنطقتين الباقتين (الجلفة و المسيلة) تم سحب 3 مقاطعات في كل بلدية لأن المميزات متشابهة إلى حد ما في بلديات هاتين المنطقتين. [6]

### 1.2.8.1. سحب العينة:

أولاً : سحب الوحدات الأولية:

تمت عملية سحب الوحدات الأولية (المقاطعة) عبر كل منطقة فرعية بطريقة عشوائية وفق احتمالات متساوية، مع احترام نسبة المقاطعات حسب المستوى الحضري أو الريفي في كل بلدية. كما حدد عدد المقاطعات لمجموع الولايات التي تضمها المنطقة الفرعية من 1 إلى ن ثم القيام بالسحب مع احترام التوزيع النسبي للمقاطعات الحضرية و الريفية.

ثانياً: سحب الوحدات الثانوية:

إثر ضبط قوائم الأسر حسب المقاطعة تمت عملية السحب اعتماداً على هذه القوائم. سحبت عينتين (2) الأولى على أساس 10200 أسرة و عينة ثانية إضافية تتكون من 10200 أسرة أخرى من أجل دراسة ظاهرة وفيات الأطفال. و قد جرت عملية السحب وفقاً لاحتمالات متساوية.

بالنسبة للاستمارات الاختيارية تم استجواب النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 55 و 59 سنة و خص هذا الاستبيان الخصوبة و التاريخ الإنجابي. تم إدخال هذا الجزء ضمن استبيان الصحة الإنجابية و ما بعد سن الإنجاب.

كما تم استجواب كل الأشخاص البالغين 60 سنة و أكثر المنتمين لأسر العينة الرئيسية، حيث تم استيفاء الاستمارات الخاصة بالرعاية الصحية لكبار السن. بلغ حجم العينة 4343 شخصاً موزعين على كل التراب الوطني.

ثالثاً العينة الخاصة بمسح الشباب:

و شملت العينة ربع العينة الرئيسية، حيث تم سحب (بطريقة عشوائية) ولاية عن كل منطقة فرعية و إجمالاً تم استخراج 17 ولاية من أصل 48. [6]

### 2.2.8.1. الاستثمارات المستخدمة في المسح:

تم استكمال استبيانات الأسرة المعيشية لعدد 19233 أسرة تضمنت العينة 7399 امرأة عمرها بين 15 - 49 سنة و 1642 امرأة عمرها بين 50 - 59 سنة و 3958 من المسنين (60 سنة و أكثر). كما تضمنت 3268 من الشباب العزاب المنتمين لفئة الأعمار 15 - 29 سنة (1767 ذكور و 1501 إناث).

جمعت معطيات المسح خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر و نوفمبر 2002، باستخدام

الاستمارات الآتية:

- استبيان الأسرة المعيشية و الظروف السكنية؛
- استبيان الصحة الإنجابية ومرحلة ما بعد الإنجاب (15- 59 سنة)؛
- استبيان الرعاية الصحية و الاجتماعية لكبار السن 60 سنة و أكثر؛
- استبيان الشباب 15-29 سنة غير المتزوجين. [6]

### 3.8.1. أهم مؤشرات المسح الجزائري لصحة الأسرة (PAPFAM 2002):

شملت أهم المؤشرات المستخرجة من المسح الجزائري لصحة الأسرة لسنة 2002

الخصائص التالية:

خصائص أسر العينة ، خصائص الأفراد ، خصائص المسكن ، خصائص سيدات العينة (النساء اللواتي سبق لهن الزواج و سنهن يتراوح بين 15-49 سنة) ، الزواج، الخصوبة، رعاية الأمومة عند آخر ولادة (حدثت خلال الخمس سنوات السابقة للمسح) ، تغذية و صحة آخر ولادة حية (حدثت في الثلاث سنوات السابقة للمسح) ، الأمراض المزمنة ، المعرفة بالسيدا (الإيدز)، تنظيم الأسرة، السيدات في سن ما بعد الإنجاب (السابق لهن الزواج و البالغات 49-50 سنة)، رعاية المسنين، الشباب. (الجدول رقم 1، الملحق). [6]

## الفصل 2

### اختبارات القيم الدنيا والقصوى

ضمن ملف الخصوبة في المسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة لسنة 2002 (2002 PAPFAM) عينة حجمها 7399 امرأة غير عازبة تنتمي للفئة العمرية 15-49 سنة. بالإضافة إلى متغيرات تعريفية (06 متغيرات)، شملت الاستثمار الخاصة بهذه الفئة 197 سؤالاً، غالبية هذه الأسئلة ذات الإجابة الواحدة مما سهل عملية الترميز.

غطت الاستثمار جوانب عديدة: ديموغرافية و سوسيو - اقتصادية، وجوانب الصحة العامة. كما صنفت أسئلتها بطريقة تسهل جمع المعطيات في الميدان و تشويه الوحدة العامة للاستثمار. قسمت الاستثمار (الجزء المتعلق بملف الخصوبة) إلى ستة أقسام و فروع، تمحورت حول ما يلي:

1. خلفية المبحوثة و مواردها و الزواج (39 سؤالاً، 43 متغيراً)؛
2. الإنجاب و وفيات الأطفال (38 سؤالاً، 64 متغيراً)؛
3. انتشار الأمراض المزمنة و اعتلال الصحة بسبب الإنجاب (40 سؤالاً، 183 متغيراً)؛
4. مرض الايدز (السيدا) و الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً (16 سؤالاً، 58 متغيراً)؛
5. تنظيم الأسرة و اتجاهات الإنجاب (45 سؤالاً، 75 متغيراً)؛
6. الصحة الإنجابية (19 سؤالاً، 50 متغيراً).

يشمل الملف الذي رغبنا في معالجته قصد تقييم نوعية معطياته 489 متغيرا (ملف الخصوبة المكون من النساء غير العازبات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة).

في عملنا هذا سوف نعتمد على اختبارات معروفة. يلخص دوبوا و بليسو ( 1989 ) قائمة لبعض الاختبارات. نذكر نوعين من بينها لحاجتنا إليهما في هذا العمل:

- اختبارات القيم الدنيا و القصوى:

و هي اختبارات بسيطة تكشف بعض أخطاء الملاحظة المرتبطة بجمع البيانات و إدخالها، الترميز و ذلك اعتمادا على جداول بسيطة تمكننا من الوقوف عند المعطيات الناقصة و المعطيات غير الموافقة لمجال الترميز.

- اختبارات التوافق الداخلي أو الارتباط بين المتغيرات:

تستخدم هذه الاختبارات لفحص التوافق بين عدة متغيرات، اعتمادا على جداول مركبة ترتبط فيما بينها بعلاقة حقيقية أو منطقية. تمكننا هذه الاختبارات من كشف أخطاء التوافق فيما بين عدة متغيرات، و هي اختبارات معقدة في بعض الحالات. [7] ص 72

## 2. اختبارات القيم الدنيا و القصوى:

يستوجب أولا توضيح المصطلحات التي سوف نعتمدها في عملنا، و هذا على النحو التالي:

- أ - الإجابات الموافقة للمجال: و تعني أن إجابة المبحوثة توافق الخيارات المقترحة في السؤال؛
- ب - الإجابات غير المحددة: المستجوبة لا تمتلك إجابة عن السؤال؛
- ت - الإجابات الناقصة: تمثل عدم الإجابة ( اللواتي لم يجبن عن السؤال)؛
- ث - المعطيات الناقصة: يشمل هذا المصطلح الإجابات الناقصة و الإجابات غير المحددة (الإجابات الناقصة+ الإجابات غير المحددة)؛
- ج - الإجابات غير الموافقة للمجال: هي الإجابات التي تخرج عن إطار الإجابات المقترحة و تختلف بذلك عن الرموز الموظفة في الاستمارة.

## 1.2. خلفية المبحوثة و مواردها و الزواج:

تضمن هذا القسم 40 سؤالاً تعلقت بخلفيات المبحوثات و حالاتهن الاجتماعية و الاقتصادية و الزوجية.

### 1.1.2. هوية المبحوثة:

تتكون هوية المبحوثة من ستة متغيرات هي على التوالي: الولاية، البلدية، التشتت، رقم المقاطعة، رقم الأسرة، الرقم الترتيبي للنساء غير العازبات داخل الأسرة. عملياً لا يمكننا العثور على رقم مكرر، بحيث كل امرأة تعرف برقم يختلف عن بقية الأرقام. لم تتضمن هوية النسوة أرقام مكررة و بهذا نقول تم تحديد النسوة بشكل جيد.

جدول رقم 01: توزيع النساء حسب الرقم التعريفي (مختصر)

الرقم التعريفي	التكرار
40120010102	1
40120010702	1
...	//
483724543502	1
483724543902	1

## 2.1.2. الرقم الترتيبي للمرأة (fligne):

يسمح الرقم الترتيبي للمرأة داخل الأسرة بتمييز مختلف النسوة الأعضاء في الأسرة الواحدة، جاءت الرتبة 19 لأعلى رقم ترتيبي للنساء غير العازبات من ذوات الأعمار 15-49 سنة.

تبين معطيات المسح أن قائمة أفراد الأسر تصل إلى 24 فرد، وحسب المسح فإن متوسط حجم الأسر يأخذ 6 أفراد، علماً أن التقرير النهائي للمسح أعطى نفس التقدير. لم يشمل هذا المتغير تكراراً و لم تخرج قيمه عن القيم القصوى (أكبر و أصغر قيمتين 1 و 24).



جدول رقم 02: توزيع النساء حسب الرقم الترتيبي للمرأة

النسب المئوية	التكرار	fligne
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

3.1.2. شهر ميلاد المرأة (f102a):

خصصت للإجابة عن شهر الميلاد خانتين و وظف الرمز 98 للاثي لا يعرفن شهر ميلادهن و استخدم الدليل 99 لتمييز الإجابات الناقصة . من خلال الجدول رقم 3 نلاحظ أن نسبة المعطيات الناقصة بلغت 19.87% من المجموع العام و تمثل نسبة مهمة قد تسيء لجودة المعطيات الخاصة بهذا المتغير. نذكر بغياب الحالات غير الموافقة لمجال الإجابة.

جدول رقم 03: توزيع النساء حسب أشهر الميلاد

النسب المئوية	التكرار	f102a
80.13	5929	أ- الإجابات الموافقة للمجال
6.88	509	ب- الإجابات غير المحددة
12.99	961	ت- الإجابات الناقصة
19.87	1470	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

4.1.2. سنة ميلاد المرأة (f102b):

تم وضع أربعة خانات لتحديد سنة الميلاد و الدليل 9998 للاثي لا يعرفن سنة ميلادهن و الرمز 9999 عند لإجابات الناقصة. يتبين من الجدول أدناه انه غياب المعطيات الناقصة فيما يتعلق بهذا المتغير.

جدول رقم 04: توزيع النساء حسب سنوات الميلاد

النسب المئوية	التكرار	f102b
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

5.1.2. أعمار النساء بالسنوات الماضية (f103):

طرح هذا السؤال للتأكد من القيمة المستمدة من السؤالين السابقين، في حالة الضرورة. و لم يشمل هذا المتغير على أي معطيات ناقصة.

جدول رقم 05: توزيع النساء حسب أعمارهن بالسنوات الماضية

النسب المئوية	التكرار	f103
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

6.1.2. الأعمار الحالية للنساء (f103c):

لم نلاحظ على قيم هذا المتغير أية معطيات ناقصة (الجدول رقم 06).

جدول رقم 06: توزيع النساء حسب أعمارهن الحالية

النسب المئوية	التكرار	f103c
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

7.1.2. وضعية النساء بالنسبة للتمدرس (f104):

يتعلق السؤال بما إذا التحقت أو تلتحق المرأة المستجوبة حالياً بالمدرسة أو بأي مؤسسة

تعليمية. لهذا الغرض تم اعتماد الترميز التالي:

الدليل 1 بالنسبة للنسوة المتمدرسات حالياً، الدليل 2 بالنسبة للاتي تدرسن في الماضي و القيمة 3 تحدد غير المتمدرسات لا ماضياً و لا حاضراً، أما الإجابات الناقصة فتعرف بالدليل 9.

حسب الجدول رقم 07، لم نسجل أي إجابة ناقصة، و حسب معطيات المسح، مثلت نسبة اللاتي لم يتلقين أي تعليم المقدار 44 % من المجموع العام للنسوة، هذه الفئة من النسوة معنية مباشرة بالسؤال f108، دون المرور بالأسئلة f105، f106، f107.

جدول رقم 07: توزيع النساء حسب حالة التمدرس

النسب المئوية	التكرار	f104
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 8.1.2. مستوى التعليم المحصل (f105):

استجوبت في هذا السؤال النساء اللاتي التحقن أو يلتحقن حالياً بمؤسسة تعليمية ( 4143 امرأة). صنفت النسوة حسب هذا المتغير على النحو التالي: المستوى الابتدائي: الدليل 1، المستوى المتوسط: الدليل 2، المستوى الثانوي: الدليل 3، المستوى الجامعي: الدليل 4، و الإجابات الناقصة: الدليل 9.

نلاحظ وجود ثلاثة إجابات ناقصة فقط وهو عدد صغير جداً ، وافقته نسبة مئوية بسيطة (0.07%) بين مجموع المعنيات بالسؤال.

### جدول رقم 08: توزيع النساء حسب المستوى التعليمي المحصل

النسب المئوية	التكرار	f105
99.93	4140	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.07	3	ت- الإجابات الناقصة
0.07	3	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 9.1.2. آخر سنة دراسية أكملت بنجاح (f106):

لخصت الإجابة عن هذا السؤال في خانتين. يأخذ المتغير الدليل 0 في حالة عدم إكمال السنة الأولى و الدليل 1 في حالة اجتياز السنة الأولى بنجاح و الدليل 2 في حالة إتمام السنة الثانية بنجاح و الدليل 3 في حالة إكمال السنة الثالثة بنجاح و الدليل 4 في حالة اجتياز السنة الرابعة بنجاح و الدليل 5 في حالة إتمام السنة الخامسة بنجاح و الدليل 6 في حالة اجتياز السنة السادسة بنجاح و الدليل 7 في حالة إكمال السنة السابعة بنجاح و الدليل 9 في حالة إكمال السنة التاسعة بنجاح و حددت المعطيات الناقصة بالدليل 99.

نستنتج من خلال الجدول رقم 09 أن المعطيات الناقصة مثلت 0.34% من مجموع المعنيات بالسؤال.

جدول رقم 09: توزيع النساء حسب آخر سنة دراسية أكملت بنجاح

النسب المئوية	التكرار	f106
99.66	4129	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.34	14	ت- الإجابات الناقصة
0.34	14	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 10.1.2. الحصول على الشهادة الابتدائية (f107):

صيع السؤال f107 على النحو الآتي: هل تحصلت على الشهادة الابتدائية؟ و خصص الرمز 1 للاتي لم يكملن الابتدائي، والرمز 2 للاتي أكملن الابتدائي على الأقل، (مع التأكد من أن المعنوية ابتدائي في السؤال f105 و أكملت السنة السادسة بنجاح في السؤال f106). لم نسجل أية معطيات ناقصة على معطيات هذا السؤال.

في حين بلغت نسبة اللاتي تحصلن على الشهادة الابتدائية 64.33% من مجموع المعنويات بالسؤال f107 (4143 امرأة)، لأننا بجمع غير المعنويات بالسؤال اللاتي لم يلتحقن بأي مؤسسة تعليمية (3256 امرأة) و المعنويات بهذا السؤال (4143 امرأة) نحصل على حجم العينة (7399 امرأة) الخاص بللخصوصية. كما سجلنا 1478 امرأة لم تكمل الابتدائي و 2665 امرأة أكملت الابتدائي.

جدول رقم 10: توزيع الحاصلات على الشهادة الابتدائية

النسب المئوية	التكرار	f107
100.00	4143	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 11.1.2. القدرة على القراءة (f108):

تم طرح هذا السؤال (القدرة على قراءة رسالة أو جريدة) على النسوة اللاتي لم يكملن الابتدائي إضافة للاتي لم يتمدرسن، وكانت الإجابة إما بالرفض إما بالإيجاب. يأخذ المتغير القيمة 9 في حالة المعطيات الناقصة.

جدول رقم 11: توزيع النساء حسب القدرة على القراءة

النسب المئوية	التكرار	f108
99.73	4721	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.27	13	ت- الإجابات الناقصة
0.27	13	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

نلاحظ بناء على معطيات الجدول أن عدد الإجابات الناقصة بلغ 13 حالة مما يوافق ما نسبته 0.27% من مجموع المعنيات بالسؤال.

### 12.1.2. القدرة على الكتابة (f108b):

خصص هذا السؤال من أجل معرفة قدرة المبحوثات المعنيات بالسؤال على الكتابة. تم توظيف الترميز السابق للتمييز بين النسوة.

جدول رقم 12: توزيع النساء حسب القدرة على الكتابة

النسب المئوية	التكرار	f108b
93.19	1068	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
6.81	78	ت- الإجابات الناقصة
6.81	78	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بلغ عدد غير المعنيات بالسؤال 6253 امرأة، وعدد المعطيات الناقصة 78 حالة، مما يحدد نسبة المعطيات الناقصة عند المستوى 6.81% و هي نسبة كبيرة إحصائياً قد تنقص من جودة المعطيات في حال توظيف هذا المتغير في بعض التحليل و التنبؤات.

### 13.1.2. مداومة قراءة الجرائد والمجلات (f109):

طرح هذا السؤال على النساء اللاتي أكملن الابتدائي على الأقل. وظفت 5 مداليل لحصر مختلف الفئات:

1 (القراءة اليومية)، 2 (مرة واحدة على الأقل في الأسبوع)، 3 (أقل من مرة في الأسبوع)، 4 (لا تقرأ على الإطلاق)، 9 (المعطيات الناقصة).

جدول رقم 13: توزيع النساء حسب مداومة قراءة الجرائد والمجلات

النسب المئوية	التكرار	f109
98.95	3771	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.05	40	ت- الإجابات الناقصة
1.05	40	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

قدر عدد النساء غير المعنيات بالعدد 3588 امرأة و عدد المعطيات الناقصة بأربعين. ترتبت عن هذا التوزيع نسبة قدرها 1.05% من المعطيات الناقصة، لا تؤثر في نوعية المعطيات الخاصة بهذا المتغير.

### 14.1.2. مداومة مشاهدة التلفزيون (f110):

وجه هذا السؤال لكل النساء دون استثناء (لا توجد غير معنيات)، و تم تبني الترميز الآتي:

1: تقريباً يومياً، 2: مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، 3: أقل من مرة في الأسبوع، 4: لا تشاهد على الإطلاق، 9: المعطيات الناقصة.

جدول رقم 14: توزيع النساء حسب مداومة مشاهدة التلفزيون

النسب المئوية	التكرار	f110
99.84	7387	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.16	12	ت- الإجابات الناقصة
0.16	12	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

حدد من خلال معطيات الجدول عدد المعطيات الناقصة عند المقدار 12 حالة فقط من مجموع 7399 امرأة، و بالتالي فان نسبة المعطيات الناقصة بلغت المستوى 0.16%.

15.1.2. مداومة الاستماع للراديو (f111):

تم توجيه هذا السؤال لكل أفراد العينة دون استثناء و اعتمد لتلخيص معطيات السؤال الترميز السابق.

حدد عدد الإجابات الناقصة عند المستوى 9 حالات فقط، و هو ما يوافق نسبة مئوية قدرها 0.12%.

جدول رقم 15: توزيع النساء حسب مداومة الاستماع للراديو

النسب المئوية	التكرار	f111
99.88	7390	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.12	9	ت- الإجابات الناقصة
0.12	9	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال



## 16.1.2. الحالة المهنية للمبحوثة (f112):

بناء على الحالات الممكنة، صنفت النساء إلى فئتين: الممارسات لعمل ما (الدليل 1) و غير الممارسات (الدليل 2) و يأخذ المتغير الدليل 9 في حالة المعطيات الناقصة.

جدول رقم 16: توزيع النساء حسب حالاتهن المهنية

النسب المئوية	التكرار	f112
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

لم تسجل معطيات ناقصة فيما يخص هذا المتغير، و بهذا حددت العاملات عند المستوى 8.92% و غير العاملات عند المستوى 91.08%.

## 17.1.2. ممارسة الأعمال و النشاطات التجارية و الفلاحية و مساعدة الأسرة (f113):

طرح هذا السؤال على النساء اللاتي صنفن في الفئة الثانية في السؤال السابق ( f112). تم حصر حالتين 1: في حالة الممارسة، 2: عدم الممارسة. تعرف كل امرأة بالدليل 9 في حالة المعطيات الناقصة.

جدول رقم 17: توزيع النساء حسب ممارسة الأعمال و النشاطات التجارية و الفلاحية و المساعدة

الأسرية

النسب المئوية	التكرار	f113
99.73	6721	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.27	18	ت- الإجابات الناقصة
0.27	18	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

لم تجب 18 امرأة عن السؤال (الجدول رقم 17)، ممثلة نسبة قدرها 0.27% من مجموع المعنيات بالسؤال.

### 18.1.2. ممارسة أي عمل في الماضي (f114):

سئلت المعنيات (غير الممارسات لأي نشاط) عما إذا عرفن تجربة عمل سابقا. و لتلخيص المعطيات اعتمد الترميز 1 (نعم) 2 (لا) و اخذ المتغير القيمة 9 في حالة المعطيات الناقصة.

جدول رقم 18: توزيع النساء حسب ممارسة أي عمل في الماضي

النسب المئوية	التكرار	f114
99.86	6567	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.14	9	ت- الإجابات الناقصة
0.14	9	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

نستخلص من الجدول رقم 18 أن نسبة المعطيات الناقصة بلغت المقدار 0.14% من مجموع المعنيات بالسؤال، و هي نسبة ضئيلة لا تؤثر في جودة المعطيات، علما أن عدد الممارسات لأعمال في الماضي تمثل في 441 حالة.

### 19.1.2. ممارسة أي عمل في الاثنى عشر شهرا الأخيرة (f115):

طرح هذا السؤال على النساء اللاتي أجبن بنعم في السؤال السابق (f114)، و أخذت الإجابات 1 (نعم)، 2 (لا) و 9 (المعطيات الناقصة).

بلغت نسبة المعطيات الناقصة المستوى 6.35% من مجموع المعنيات بالسؤال (f115) و هي نسبة مهمة قد تؤثر على نوعية معطيات المسح (الجدول رقم 19).

جدول رقم 19: توزيع النساء حسب ممارسة أي عمل خلال 12 شهر الأخيرة

النسب المئوية	التكرار	f115
93.65	413	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
6.35	28	ت- الإجابات الناقصة
6.35	28	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 20.1.2. العمل الرئيسي (f116):

طلب من النسوة تحديد عملهن الرئيسي بدقة، اعتماداً على التصنيف العالمي للمهن (ثلاث خانات). تحدد الخانة الأولى الأصناف المهنية الأساسية. وحددت المعطيات الناقصة بالدليل 999.

استهدف السؤال 1264 امرأة، بلغ عدد الإجابات الناقصة المستوى 1.42%.

### جدول رقم 20: توزيع النساء حسب نوع العمل الرئيسي

النسب المئوية	التكرار	f116
98.58	1246	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.42	18	ت- الإجابات الناقصة
1.42	18	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 21.1.2. مكان مزاولة النشاط (f117):

تم طرح هذا السؤال لمعرفة ما إذا كان العمل الذي تقوم به المرأة خارج المنزل أو داخله، و تم ترميز الإجابة 'داخل المنزل' بالدليل 1، الإجابة 'خارج المنزل' بالدليل 2، الإجابات الناقصة بالدليل 9. يشير الجدول رقم 21 إلى وجود 0.95% من المعطيات الناقصة فقط.

جدول رقم 21: توزيع النساء حسب مكان مزاولة النشاط

النسب المئوية	التكرار	f117
99.05	1252	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.95	12	ت- الإجابات الناقصة
0.95	12	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

22.1.2. وتيرة ممارسة النشاط (f118):

أدرجت ثلاثة إجابات لتحديد وتيرة ممارسة النشاط:

1: طوال السنة، 2: موسمياً، 3: أحياناً، أما المعطيات الناقصة فتعرف بالدليل 9.

جدول رقم 22: توزيع النساء حسب وتيرة ممارسة النشاط

النسب المئوية	التكرار	f118
98.58	1246	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.42	18	ت- الإجابات الناقصة
1.42	18	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

نستخلص من الجدول أن نسبة المعطيات الناقصة بلغت 1.42% من مجموع المعنيات بالسؤال، و حددت نسبة اللاتي يمارسن نشاطهن بصفة دائمة عند المستوى 70.89% ( المعطيات الإجمالية).

23.1.2. نوع الأجر أو المقابل (f119):

سئلت المبحوثات عن نوع الأجر الذي تتلقاه مقابل النشاط الذي تقوم به، و بهذا تم حصر

الحالات:

1: اجر نقدي فقط، 2: اجر نقدي و عيني معا، 3: اجر عيني فقط، 4: بدون مقابل، 9: المعطيات الناقصة. بلغ عدد المعطيات الناقصة 24 حالة من مجموع المعنيات ( 1264 امرأة)، مما يوافق ما نسبته 1.90%، علما أن الإجابة 'الأجر نقدا' هي الغالبة بنسبة 89.79% (المعطيات الإجمالية).

جدول رقم 23: توزيع النساء حسب نوع الأجر أو المقابل

النسب المئوية	التكرار	f119
98.10	1240	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.90	24	ت- الإجابات الناقصة
1.90	24	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

24.1.2. الحالة الزوجية للمرأة (f124):

تم ترميز الإجابات على النحو التالي:

متزوجة: الدليل 1، أرملة: الدليل 2، مطلقة: الدليل 3، منفصلة: الدليل 4. لم يشمل هذا المتغير معطيات ناقصة. بحيث تم تحديد الحالة المدنية لكل امرأة بشكل تام (الجدول رقم 24).

جدول رقم 24: توزيع النساء حسب الحالة الزوجية

النسب المئوية	التكرار	f124
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

نتوزع المستجوبات حسب الحالة المدنية على الشكل الموالي:

المتزوجات: 92.54%، النساء الأامل: 3.18%، المطلقات: 4.01% و المنفصلات: 0.27%.

25.1.2. عدد الزوجات (f125):

وظف هذا السؤال لمعرفة عدد مرات الزواج التي شهدتها المرأة خلال حياتها، وكانت الأجوبة المقترحة:

مرة واحدة: الدليل 1، أكثر من مرة: الدليل 2، و حددت المعطيات الناقصة بالدليل 9.

أحصيت 435 حالة من المعطيات الناقصة ( 5.88% من مجموع المعنيات بالسؤال)، و هي نسبة مهمة قد تؤثر على قيمة المعطيات المتعلقة بهذا المتغير. بعد معالجة المعطيات عرفت 6485 امرأة الزواج مرة واحدة (87.65%).

جدول رقم 25: توزيع النساء حسب عدد مرات الزواج

النسب المئوية	التكرار	f125
94.12	6964	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
5.88	435	ت- الإجابات الناقصة
5.88	435	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

26.1.2. شهر أول زواج (f126a):

خصص هذا السؤال لمعرفة شهر أول زواج النسوة، تم توظيف قيم المجال [1-12] لتحديد أشهر الزواج و الدليلين 98 و 99 لتحديد حالتي عدم معرفة شهر الزواج و المعطيات الناقصة على التوالي.

جدول رقم 26: توزيع النساء حسب شهر أول زواج

النسب المئوية	التكرار	f126a
77.33	5722	أ- الإجابات الموافقة للمجال
21.34	1579	ب- الإجابات غير المحددة
1.32	98	ت- الإجابات الناقصة
22.66	1677	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بلغت نسبة المعطيات الناقصة 22.66% من مجموع المبحوثات، و تمثل نسبة كبيرة جدا قد تعيب معطيات هذا المتغير.

### 27.1.2. سنة أول زواج (f126b):

وظفت أربع خانات لتحديد سنة الزواج. تم تحديد الإجابة 'لا تعرف' بالدليل 9998 و المعطيات الناقصة بالدليل 9999.

لم تصل نسبة المعطيات الناقصة سوى 1.50% من مجموع المبحوثات.

### جدول رقم 27: توزيع النساء حسب سنة أول زواج

النسب المئوية	التكرار	f126b
98.50	7288	أ- الإجابات الموافقة للمجال
1.47	109	ب- الإجابات غير المحددة
0.03	2	ت- الإجابات الناقصة
1.50	111	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 28.1.2. العمر عند الزفاف الأول (f127):

خصصت خانتين لتسجيل العمر (عدد السنوات) عند زواج المرأة (أول زفاف)، و حددت المعطيات الناقصة بالدليل 99.

### جدول رقم 28: توزيع النساء حسب العمر عند الزفاف الأول

النسب المئوية	التكرار	f127
99.84	7387	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.16	12	ت- الإجابات الناقصة
0.16	12	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بلغت نسبة المعطيات الناقصة المستوى 0.16% من مجموع المبحوثات. كما لاحظنا (بعد معالجة معطيات هذا المتغير) أن أصغر سن عند أول زواج كان عشرة سنوات و تمت الزيجات المتأخرة عند العمر 48 سنة.

### 29.1.2. صلة قرابة المرأة بالزوج الأخير (f128):

تم تحديد أربعة إجابات لهذا السؤال و هي كالآتي:

ابن عم/ابن عمّة: الدليل 1، ابن خال/ابن خالة: الدليل 2، صلة قرابة أخرى: الدليل 3، لا توجد صلة قرابة: الدليل 4 و عينت المعطيات الناقصة بالدليل 9.

قدر عدد المعطيات الناقصة بسبعة حالات فقط ( 0.09% ) من مجموع النساء المبحوثات. و بلغ عدد النساء اللاتي لا توجد لديهن صلة قرابة بأزواجهن 4697 امرأة (63.48%).

جدول رقم 29: توزيع النساء حسب صلة القرابة بالزوج الحالي

النسب المئوية	التكرار	f128
99.91	7392	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.09	7	ت- الإجابات الناقصة
0.09	7	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 30.1.2. حالة تمدرس الزوج الحالي (الأخير) (f129):

تم تحديد ثلاث حالات للإجابة عن السؤال الخاص بالتحاق أو عدم التحاق الزوج الحالي (الأخير) بالمدرسة: نعم التحق سابقا بالدليل 1، لا لم يلتحق بالدليل 2 و لا يعرف بالدليل 8. أما المعطيات الناقصة فقد تم تحديدها بالدليل 9.

بلغ عدد الإجابات التي لم تحدد العدد 67 حالة، و لم تحدد حالتين، و بالتالي بلغ عدد المعطيات الناقصة 69 حالة و هو ما يوافق النسبة 0.94%.



جدول رقم 30: توزيع النساء حسب حالة تدرّس الزوج الحالي

النسب المئوية	التكرار	f129
99.07	7330	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.91	67	ب- الإجابات غير المحددة
0.03	2	ت- الإجابات الناقصة
0.94	69	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

31.1.2. أعلى مستوى تعليمي وصله الزوج (f130):

يقصد بأعلى مستوى دراسي بلغه الزوج، آخر مستوى توصل إليه في مساره الدراسي، وقد تم ترميز الإجابات على النحو التالي:

المستوى الابتدائي: الدليل 1، المستوى المتوسط: الدليل 2، المستوى الثانوي: الدليل 3، المستوى الجامعي: الدليل 4، الإجابة لا تعرف: الدليل 8، الإجابات الناقصة: الدليل 9.

و بلغ عدد غير المعنيات بالسؤال 2437 حالة (الإجابة 1 في المتغير السابق).

جدول رقم 31: توزيع النساء حسب أعلى مستوى تعليمي بلغه الزوج

النسب المئوية	التكرار	f130
99.48	4936	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.48	24	ب- الإجابات غير المحددة
0.04	2	ت- الإجابات الناقصة
0.52	26	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

شملت المعطيات الناقصة 26 حالة ( 24 حالة غير محددة و إجابتين ناقصتين) مما مثل نسبة قدرها 0.52% من مجموع المعنيات بالسؤال، و هي نسبة ضعيفة

32.1.2. آخر سنة دراسية أكملها الزوج بنجاح (f131):

خصصت خانتان من المجال [1-12] للإجابة على هذا السؤال، و وظف الرمز 98 للحالات غير المحددة و 99 للإجابات الناقصة. و بلغ عدد غير المعنيات بالسؤال 2463 زوج.

جدول رقم 32: توزيع النساء حسب آخر سنة دراسية أكملها الزوج بنجاح

النسب المئوية	التكرار	f131
99.19	4896	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.57	28	ب- الإجابات غير المحددة
0.24	12	ت- الإجابات الناقصة
0.81	30	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بلغت نسبة المعطيات الناقصة 0.81% فقط من مجموع المعنويات.

33.1.2. حصول الأزواج على الشهادة الابتدائية (ذوي المستوى الابتدائي و الذين أكملوا

السنة السادسة بنجاح) (f132):

خصص لهذا السؤال مقترحان، الأول: الدليل 1 و يعني الذين لم يكملوا الابتدائي أو لا تعرف آخر سنة أكملوها في الابتدائي، و الثاني: الدليل 2 و يعني الأزواج الذين أكملوا الابتدائي على الأقل. لم نسجل أي معلومة ناقصة في هذا المتغير.

جدول رقم 33: توزيع النساء حسب حصول أزواجهن على الشهادة الابتدائية (ذوي المستوى الابتدائي

و الذين أكملوا السنة السادسة بنجاح)

النسب المئوية	التكرار	f132
100.00	4936	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 34.1.2. قدرة الأزواج على القراءة (f133):

سئلت النساء عن قدرة أزواجهن على قراءة خطاب أو جريدة مثلا، و تم ترميز الإجابات كالتالي: نعم: الدليل 1، لا: الدليل 2، لا تعرف: الدليل 8. أما الإجابات الناقصة فحددت بالدليل 9. خص هذا السؤال النساء اللاتي لم يحصل أزواجهن على الشهادة الابتدائية و الذين لم يتلقوا أي تعليم.

قدر عدد المعطيات الناقصة ( الإجابات الناقصة و الإجابات غير المحددة) بما يصل إلى 110 حالات و هو ما يمثل النسبة 2.64% من معطيات هذا المتغير.

جدول رقم 34: توزيع النساء حسب قدرة الأزواج على القراءة

النسب المئوية	التكرار	f133
97.36	4059	أ- الإجابات الموافقة للمجال
1.68	70	ب- الإجابات غير المحددة
0.96	40	ت- الإجابات الناقصة
2.64	110	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 35.1.2. قدرة الأزواج على الكتابة (f134):

استجوبت النساء في هذا السؤال عن قدرة أزواجهن على الكتابة ( كتابة رسالة مثلا)، و تم ترميز الإجابات كالتالي:

نعم بالدليل 1، لا بالدليل 2، لا تعرف بالدليل 8. أما المعطيات الناقصة فحددت بالدليل 9. و قد خص هذا السؤال نساء الأزواج الذين لم يحصلوا على الشهادة الابتدائية و الذين لم يتلقوا أي تعليم، أي الذين أجابوا 'نعم' (1) في السؤال السابق (القدرة على القراءة).

تبين لنا من خلال الجدول رقم 35 أن نسبة الإجابات الناقصة بلغت المستوى 5.78% و مثلت الإجابات غير المحددة (لا تعرف) ال نسبة 2.39%. بجمع النسبتين نحصل على المقدار 8.17% من مجموع المعنيات بالسؤال، و هي نسبة هامة قد تنقص من قيمة المعطيات المتعلقة بهذا المتغير.

جدول رقم 35: توزيع النساء حسب قدرة الأزواج على الكتابة

النسب المئوية	التكرار	f134
91.83	1765	أ- الإجابات الموافقة للمجال
2.39	46	ب- الإجابات غير المحددة
5.78	111	ت- الإجابات الناقصة
8.17	157	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

36.1.2. المهنة الرئيسية للأزواج (f135):

تم توجيه هذا السؤال لكل وحدات العينة (7399 امرأة غير عازبة من الفئة العمرية 15-49 سنة)، و تمت الإجابة على السؤال f135 بكتابة المهنة الرئيسية أو العمل الأساسي الذي شغله الزوج. تم تحديد المهن وفق الدليل المعمول به (ثلاثة أرقام: دليل المكتب العالمي للمهن). أما فئة العاطلين عن العمل فتم ترميزها بالدليل 996، و عينت الحالات غير المحددة بالدليل 998، أما المعطيات الناقصة فتم ترميزها بالدليل 999.

تم إحصاء ما نسبته 1.50% من المعطيات الناقصة ( 0.62%: لا تعرف و 0.88%: إجابات ناقصة).

جدول رقم 36: توزيع النساء حسب المهنة الرئيسية للأزواج

النسب المئوية	التكرار	f135
98.50	7288	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.62	46	ب- الإجابات غير المحددة
0.88	65	ت- الإجابات الناقصة
1.50	111	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

37.1.2. الوضعية في المهنة (الأزواج) (f136):

خصصت سبعة إمكانيات للإجابة على السؤال المتعلق بوضعية الزوج في المهنة التي يشغلها أو التي كان يشغلها، على النحو التالي:

مستخدم: الدليل 1، مهنة حرة: الدليل 2، أجير دائم: الدليل 3، أجير غير دائم: الدليل 4، متمرن: الدليل 5، مساعد عائلي: الدليل 6، لا تعرف: بالدليل 8. و لم نسجل إجابات ناقصة في هذا المتغير. أما عدد غير المعنيات بالسؤال فبلغ 945 حالة وتمثل (البطالون، الحالات غير المحددة و الإجابات الناقصة) حسب السؤال السابق (f135).

جدول رقم 37: توزيع النساء حسب الوضعية في المهنة للأزواج

النسب المئوية	التكرار	f136
99.92	6449	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.08	5	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.08	5	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بناء على معطيات الجدول السابق نلاحظ أن النسبة 0.08% تمثل الحالات غير المحددة و تمثل وحدها المعطيات الناقصة في هذا المتغير، و هي نسبة جد بسيطة لا تؤثر على جودة معطياته.

38.1.2. الحالة الزوجية الحالية للنساء (f140):

أضيف هذا السؤال للتحقق من مصداقية معطيات السؤال f124، و لمعرفة ما إذا المرأة متزوجة حالياً (متزوجة، منفصلة) أو غير متزوجة حالياً (مطلقة، أرملة). تم تحديد المتزوجات حالياً بالدليل 1، و تم تحديد غير المتزوجات حالياً بالدليل 2. في هذا السؤال لم نسجل معطيات ناقصة.

جدول رقم 38: توزيع النساء حسب الحالة الزوجية الحالية للنساء

النسب المئوية	التكرار	f140
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد المعالجة تم إحصاء 6867 حالة زواج، و 532 امرأة غير متزوجة حالياً. و نلاحظ أن هذا الجدول مطابق للجدول رقم 24 (الحالة المدنية للنساء).

### 39.1.2. العمر الحالي للزوج (f141):

خصصت خانة لتحديد العمر الحالي للزوج، و خصص الدليل 95 للذين تفوق أعمارهم 94 سنة، أما الأعمار غير المحددة فتم تعيينها بالدليل 98 و وظيف الدليل 99 عندما نكون أمام الإجابات الناقصة.

قدرت نسبة المعطيات الناقصة عند المستوى 0.13% بين مجموع المعنيين بهذا السؤال. و قد بلغ أكبر زوج السن 94 سنة (حالة واحدة) و بلغ أصغرهم 19 سنة (حالتين).

جدول رقم 39: توزيع النساء حسب العمر الحالي للزوج

النسب المئوية	التكرار	f141
99.87	6858	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.10	7	ب- الإجابات غير المحددة
0.03	2	ت- الإجابات الناقصة
0.13	9	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 40.1.2. عدد الزوجات (f142):

وظفت خانة واحدة لتحديد عدد الزوجات الأخريات (من 1 إلى 3). يتكون السؤال من شقين: وجود زوجة أخرى في عصمة الزوج. في حالة الإيجاب تسأل المرأة عن عدد الزوجات الأخريات. إذن يرتبط العدد المطلوب بضرائر المستجوبة. في حالة النفي يوظف الدليل 4 و وظفت الاستمارة الدليل 8 في حالة الأجوبة غير المحددة و وظيف الدليل 9 في حالة المعطيات الناقصة.

بعد المعالجة، سجلنا 6573 زواج أحادي من بين 6867 مبحوثة (معنية بالمتغير f142). و بلغ عدد غير المعنيات بالسؤال 532 امرأة (غير المتزوجات حالياً، انظر الجدول رقم 38). يشير الجدول رقم 40 إلى نسبة ضعيفة من المعطيات الناقصة قدرها 0.58%.

جدول رقم 40: توزيع النساء حسب عدد الزوجات الأخريات

النسب المئوية	التكرار	f142
99.42	6827	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.30	21	ب- الإجابات غير المحددة
0.28	19	ت- الإجابات الناقصة
0.58	40	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

41.1.2. انتماء النساء للفئتين العمريتين 15-54 سنة و 55-59 سنة (f143):

وظف هذا المتغير للتحقق من معطيات المتغير f103. خصص الدليل 1 كرمز للفئة 15-54 سنة و الدليل 2 كرمز للفئة 55-59 سنة.

بعد المعالجة، لاحظنا أن كل وحدات العينة (7399 امرأة) تنتمي للفئة العمرية 15-54 سنة، و هذا يعني تطابق المعطيات مع معطيات المتغير f103. و نشير في هذا الصدد إلى غياب المعطيات الناقصة.

جدول رقم 41: توزيع النساء حسب انتمائهن للفئتين العمريتين 15-54 سنة و 55-59 سنة

النسب المئوية	التكرار	f143
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 2.2. محور الإنجاب و وفيات الأطفال:

يشمل القسم الثاني من الاستمارة الخاصة بملف الخصوبة الإنجاب و وفيات الأطفال. حددت المتغيرات بمجموع الأسئلة: من f201 إلى f248.

### 1.2.2. الولادات الحية (f201):

سئلت النسوة (المتغير f201) عن الحصول على ولادات حية (طفل أو طفلة). و حددت الحالات وفق الدليلين 1: نعم، 2: لا. لم نسجل أي معلومة ناقصة على معطيات هذا السؤال.

بعد المعالجة، نشير إلى أن عدد الحاصلات على ولادة حية على الأقل (الدليل 1) بلغ الرقم 6747. و بلغ غير الحاصلات على ولادات حية العدد 652 حالة.

جدول رقم 42: توزيع النساء حسب الحصول على ولادات حية

النسب المئوية	التكرار	f201
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 2.2.2. وجود أبناء أحياء (ذكورا أو إناث) يعيشون مع المبحوثة (f202):

استجوبت المبحوثات عن وجود أبناء يعيشون معهن الآن. صنفت النسوة في فئتين الأولى (نعم) وفق الدليل 1 و الثانية (لا) وفق الدليل 2. لم نسجل أي معلومة ناقصة على معطيات هذا المتغير. بلغ عدد غير المعنيات بالسؤال 652 امرأة (النساء اللواتي اجبن بالنفي في السؤال f201، اللاتي لم ينجبن أي طفل حي).



جدول رقم 43: توزيع النساء حسب وجود أبناء أحياء (ذكورا أو إناث) يعيشون مع المبحوثة الآن

f202	التكرار	النسب المئوية
أ- الإجابات الموافقة للمجال	6747	100.00
ب- الإجابات غير المحددة	0	0.00
ت- الإجابات الناقصة	0	0.00
ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)	0	0.00
ج- الإجابات غير الموافقة للمجال	0	0.00

### 3.2.2. عدد الأبناء الذكور و الإناث الذين يعيشون مع المبحوثة (f203):

خصرت للإجابة على هذا السؤال خانت ان لتحديد عدد الأبناء (الذكور: f203a، الإناث: f203b) الذين يعيشون مع المبحوثة. نسجل 00 عندما يتعلق الأمر باللاتي لا يعيش معهن ذكورا أو إناثا وهكذا... بعد المعالجة، لم نسجل معطيات ناقصة على معطيات هذا السؤال . و تبين أن عدد الذكور أو الإناث الذين يعيشون مع أمهاتهم ينتمي إلى المجال [0 - 9].

جدول رقم 44: توزيع النساء حسب عدد الأبناء (الذكور، الإناث) الذين يعيشون مع المبحوثة

f203b		f203a		f203
النسب المئوية	التكرار	النسب المئوية	التكرار	
100.00	7399	100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 4.2.2. وجود أبناء أحياء (ذكورا أو إناث) لا يعيشون في البيت حاليا (f204):

وضع الدليل 1 كرمز للإجابة نعم و الدليل 2 كرمز للإجابة لا. لم تسجل أي معطيات ناقصة، علما أن عدد غير المعنيات بالسؤال بلغ 652 امرأة و هن تحديدا النساء اللواتي لم يرزقن بولادات حية.

جدول رقم 45: توزيع النساء حسب وجود أبناء أحياء (ذكورا أو إناث) لا يعيشون في البيت حاليا

f204	التكرار	النسب المئوية
أ- الإجابات الموافقة للمجال	6747	100.00
ب- الإجابات غير المحددة	0	0.00
ت- الإجابات الناقصة	0	0.00
ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)	0	0.00
ج- الإجابات غير الموافقة للمجال	0	0.00

### 5.2.2. عدد الأبناء (الذكور أو الإناث) الذين يعيشون في أماكن أخرى (f205):

خصرت للإجابة على هذا السؤال خانة ان. لم نسجل معطيات ناقصة على معطيات هذا السؤال. علما أن مجال القيم القصوى تمثل في القيمتين 0 و 4 بالنسبة لعدد الذكور ( f205a)، و أخذت الإجابات المحتملة قيم المجال [0 - 5] بالنسبة لعدد الإناث (f205b).

جدول رقم 46: توزيع النساء حسب عدد الأبناء (الذكور، الإناث) الذين يعيشون في أماكن أخرى

f205b		f205a		f205
النسب المئوية	التكرار	النسب المئوية	التكرار	
100.00	7399	100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 6.2.2. عدد الأبناء المولودين أحياء ثم توفوا (f206):

تعرف الولادة الحية على أنها حدث ظهرت عليه علامة من علامات الحياة كالبكاء حتى و لم يعيش سوى أياما أو ساعات قليلة. وضع الدليل 1 في حالة الإجابة بنعم و الدليل 2 في حالة الإجابة بلا. لم نسجل معطيات ناقصة.

بلغت نسبة اللاتي عشن الظاهرة القيمة 17.92% أي 1326 امرأة رزقن بولادات حية توفيت فيما بعد. لم نسجل أي أخطاء ملاحظة على هذا المتغير.

جدول رقم 47: توزيع النساء حسب عدد الولادات الحية المتبوعة بوفاة

النسب المئوية	التكرار	f206
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

7.2.2. عدد الأبناء (الذكور أو الإناث) الذين ولدوا أحياء ثم توفوا (f207):

خصصت خانة للإجابة على هذا السؤال . تدخل الإجابات الممكنة في المجال [ 0 - 5 ] بالنسبة لعدد الذكور ( f207a )، و أخذ عدد الولادات الحية المتوفية بعد الولادة المجال [ 0 - 4 ] بالنسبة للإناث (f207b). لم نسجل معطيات ناقصة بين معطيات هذا السؤال.

حسب معطيات المسح، بلغ عدد النسوة اللاتي لم يعرفن الظاهرة 6573 امرأة حسب المتغير f207a (الذكور)، و 6670 حالة حسب المتغير f207b (الإناث).

جدول رقم 48: توزيع النساء حسب عدد الأبناء (الذكور أو الإناث) الذين ولدوا أحياء ثم توفوا

f207b		f207a		f207
النسب المئوية	التكرار	النسب المئوية	التكرار	
100.00	7399	100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

8.2.2. مجموع الولادات الحية (f208):

خصصت خانة للإجابة على هذا السؤال . يمثل هذا السؤال مجموع قيم المتغيرات f203، f205 و f207. لم نسجل أي معطيات ناقصة على معطيات هذا المتغير . بلغ عدد النسوة اللواتي لم يرزقن بولادة حية 642 حالة. أخذت الإجابات الممكنة المجال [ 0 - 16 ].

جدول رقم 49: توزيع النساء حسب مجموع الولادات الحية

النسب المئوية	التكرار	f208
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

9.2.2. حالات الحمل التي لم تنتهي بمولود حي (السقط، الإجهاض، الولادات الميتة) (f222):

وجه هذا السؤال لكل أفراد العينة دون استثناء، و استعمل الدليل 1 عند الإجابة بنعم و الدليل 2 عند الإجابة بلا و الدليل 9 للدلالة على المعطيات الناقصة. تبين من الجدول 50 وجود حالة واحدة من المعطيات الناقصة.

و هكذا تم عد 1678 حالة لم تنته بولادة حية، و أن نسبة المعطيات الناقصة لم تتجاوز المقدار 0.01%.

جدول رقم 50: توزيع النساء حسب وجود حالات الحمل التي لم تنتهي بمولود حي

النسب المئوية	التكرار	f222
99.99	7398	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.01	1	ت- الإجابات الناقصة
0.01	1	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

10.2.2. عدد حالات الحمل التي انتهت بسقط (f223):

وضعت خاننتان للإجابة على هذا السؤال و خصص الدليل 99 كرمز للمعطيات الناقصة. دخلت الإجابات الممكنة في المجال [0 - 11]. بلغت المعطيات الناقصة النسبة 0.48%.

جدول رقم 51: توزيع النساء حسب عدد حالات السقط (الإسقاط)

النسب المئوية	التكرار	f223
99.52	1670	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.48	8	ت- الإجابات الناقصة
0.48	8	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

11.2.2. عدد حالات الحمل التي أعقبت بإجهاض (f223b):

أعدت خانتين للإجابة على هذا السؤال و خصص الرقم 99 كدليل على المعطيات الناقصة. حسب الجدول رقم 52 سجل هذا التغير 18 إجابة ناقصة (1.07% من مجموع المعنيات بالسؤال).

جدول رقم 52: توزيع النساء حسب عدد حالات الإجهاض

النسب المئوية	التكرار	f223b
98.93	1660	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.07	18	ت- الإجابات الناقصة
1.07	18	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

12.2.2. عدد حالات الحمل التي انتهت بمولود ميت (f224):

تم تخصيص خانتين للإجابة على هذا السؤال ، من أجل كتابة عدد الحالات و خصص الدليل 99 لتحديد المعطيات الناقصة.

يشير الجدول إلى وجود 13 إجابة ناقصة فقط (نسبة 0.77%) من مجموع المعنيات بالسؤال.

جدول رقم 53: توزيع النساء حسب عدد حالات الحمل التي انتهت بمولود ميت

النسب المئوية	التكرار	f224
99.23	1665	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.77	13	ت- الإجابات الناقصة
0.77	13	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

13.2.2. مآل آخر حمل لم ينتج بولادة حية (سقط، إجهاض أو مولود ميت) (f224b):

يشير الدليل 1 لحالات السقط و الدليل 2 لحالات الإجهاض و الدليل 3 للولادات الميتة. أما المعطيات الناقصة فتم تحديدها بالدليل 9.

بعد المعالجة، تبين أن أكثر الحالات التي لم تنته بولادة حية تمثلت في حالات الإسقاط (72.53%)، ثم تأتي ظاهرة الولادات الميتة ( 14.96%) و تأتي أخيرا حالات الإجهاض (11.50%). و بلغت المعطيات الناقصة المقدار 1.01%.

جدول رقم 54: توزيع النساء حسب مآل آخر حمل لم ينتج بولادة حية

النسب المئوية	التكرار	f224b
98.99	1661	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.01	17	ت- الإجابات الناقصة
1.01	17	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

14.2.2. شهر حدوث آخر حالة حمل انتهت بمولود ميت أو إجهاض أو سقط

(f225a):

خصصت خانة لتسجيل شهر وقوع آخر حالة حمل انتهت بمولود ميت أو إجهاض أو سقط. عندما لا تعرف المرأة شهر وقوع الحدث نسجل الدليل 98 و نسجل 99 في حالة المعطيات الناقصة.

جدول رقم 55: توزيع النساء حسب شهر تسجيل آخر حالة حمل انتهى بمولود ميت أو إجهاض أو سقط.

النسب المئوية	التكرار	f225a
60.49	1015	أ- الإجابات الموافقة للمجال
18.77	315	ب- الإجابات غير المحددة
20.74	348	ت- الإجابات الناقصة
39.51	663	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

اعتماداً على معطيات الجدول، نلاحظ أن عدد المعطيات الناقصة (الإجابات الناقصة (99) و الإجابات غير المحددة (98)) بلغ 663 حالة و هو ما يوافق النسبة 39.51%. هذه النسبة كبيرة جداً قد تؤثر كثيراً على نوعية معطيات هذا المتغير.

## 15.2.2. سنة تسجيل آخر حالة حمل انتهى بمولود ميت أو إجهاض أو سقط (f225b):

تم تخصيص أربعة خانات لتسجيل سنة آخر حالة حمل انتهى بمولود ميت أو إجهاض أو سقط. وظف الدليل 9998 عند نسيان السنة، و تم تحديد المعطيات الناقصة بالدليل 9999. بلغ عدد المعطيات الناقصة النسبة 1.67% ( إجابات ناقصة 9999). علماً أننا لم نسجل أي إجابة غير محددة.

جدول رقم 56: توزيع النساء حسب سنة تسجيل آخر مولود ميت أو إجهاض أو سقط.

النسب المئوية	التكرار	f225b
98.33	1650	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.67	28	ت- الإجابات الناقصة
1.67	28	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

16.2.2. آخر حالة حمل انتهت بمولود ميت أو إجهاض أو سقط (قبل أو بعد يناير 1997) (للتحقق من f225a و f225b) (f226):

وظف هذا المتغير للتحقق من مصداقية المعطيات المرتبطة بالأسئلة f225a، f225b و f226. إذا كانت الإجابة قبل يناير 1997: يأخذ المتغير الدليل 1. و يأخذ 2 إذا وقع الحدث بعد يناير 1997. لم نسجل معطيات ناقصة على قيم هذا المتغير.

جدول رقم 57: توزيع النساء حسب سنة آخر حالة حمل انتهت بمولود ميت أو إجهاض أو سقط قبل أو بعد يناير 1997

النسب المئوية	التكرار	f226
100.00	1678	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

الغرض من هذا السؤال هو تقدير ظاهرة الحمل الذي لم ينته بولادة حية خلال الخمس سنوات السابقة للمسح (1997 - 2002). للإشارة أحصينا في هذا المتغير 614 امرأة شهدت الظاهرة خلال يناير 1997 أو بعده و 1064 امرأة عرفت الحدث قبل يناير 1997.

17.2.2. عدد شهور آخر حمل انتهى بمولود غير حي (f227):

يهدف هذا السؤال إلى تقدير متوسط مدد الحمل الذي لم ينته بولادة حية، لهذا يأخذ المتغير قيم المجال [1 - 9]. لكنه أخذ خانتين لأن المعطيات الناقصة عبر عنها بالدليل 99. و خصص الدليل 98 للحالات التي لم تتمكن النسوة فيها من تحديد مدد الحمل.

لم تؤخذ بعين الاعتبار الأحداث التي لم تتجاوز الشهر الماضي 0. بعد المعالجة قدرت نسبة المعطيات الناقصة عند المستوى 2.61% بين مجموع المعنويات بالسؤال.



جدول رقم 58: توزيع النساء حسب عدد شهور آخر حمل انتهى بمولود غير حي

النسب المئوية	التكرار	f227
97.39	598	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.49	3	ب- الإجابات غير المحددة
2.12	13	ت- الإجابات الناقصة
2.61	16	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

18.2.2. الدخول إلى المستشفى عقب انتهاء الحمل غير المتوج بولادة حية (f228):

استجوبت النساء المعنيات بهذا السؤال إذا اضطرت للدخول إلى المستشفى بعد انتهاء الحمل غير الحي. ميز السؤال بين فئتين: اللاتي أدخلن المستشفى بعد الحمل المتوج بولادة غير حية (1) و غيرهن (2). أما المعطيات الناقصة فتم تحديدها بالدليل 9.

جدول رقم 59: توزيع النساء حسب الدخول إلى المستشفى عقب انتهاء الحمل المتوج بولادة غير حية

النسب المئوية	التكرار	f228
98.53	605	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.47	9	ت- الإجابات الناقصة
1.47	9	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بلغت المعطيات الناقصة النسبة 1.47% بين مجموع النساء المعنيات بالسؤال.

19.2.2. عدد ليالي الاستشفاء (f229):

وجه هذا السؤال للنساء اللاتي اجبن بنعم (1) في السؤال السابق (382 امرأة)، لهذا خصصت الاستمارة للإجابة على هذا السؤال خانتان كي تسجل عدد الليالي التي قضتها المبحوثة في المستشفى، عقب انتهاء الحمل غير الحي و خصص الدليل 95 للاعبي خرجن نفس اليوم و الدليل 30 للاتي قضين ثلاثين ليلة أو أكثر و الدليل 99 للإجابات الناقصة.

جدول رقم 60: توزيع النساء حسب عدد ليالي الاستشفاء

النسب المئوية	التكرار	f229
99.48	380	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.52	2	ت- الإجابات الناقصة
0.52	2	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بلغت نسبة المعطيات الناقصة المقدار 0.52% بين مجموع المعنيات بالسؤال.

20.2.2. الكشف عن الحمل المنتهي بولادة غير حية (f230):

وجه هذا السؤال لمجموع النساء اللاتي عرفن حملا انتهى بمولود غير حي (مولود ميت أو إجهاض أو سقط). و سئلت النسوة عن عرض أنفسهن للكشف خلال مدة الحمل المنتهي بولادة غير حية (على طبيب: f230a، قابلة أو ممرضة مؤهلة: f230b، قابلة تقليدية: f230c، لا أحد: f230d).

وظفت لهذا الغرض ثلاث قيم تحديدا لمجال الإجابات الممكنة: 1، عند الإجابة بنعم، 2، الإجابة بلا و 9 في حالة المعطيات الناقصة.

جدول رقم 61: توزيع النساء حسب التعرض خلال الحمل للكشف عن الحمل المنتهي بولادة غير حية

النسب المئوية	التكرار	f230
98.37	604	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.63	10	ت- الإجابات الناقصة
1.63	10	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

تبين أن نسبة المعطيات الناقصة بلغت المقدار 1.63% من مجموع النساء المعنيات بالسؤال.

## 21.2.2. شهر أول كشف عن الحمل الذي لم ينته بولادة حية (f231):

سئلت النساء اللاتي عرضن أنفسهن للكشف، عن أي مدة من الحمل ذهبت لأول مرة للكشف عن حملها، و قد تم تخصيص خانتين لتسجيل رقم الشهر الذي ذهبت خلاله للكشف و لأول مرة عن حملها. تم ترميز الإجابة ' لا اعرف ' بالدليل 98، و الإجابات الناقصة بالدليل 99.

جدول رقم 62: توزيع النساء حسب شهر أول كشف عن الحمل

النسب المئوية	التكرار	f231
95.01	343	أ- الإجابات الموافقة للمجال
3.60	13	ب- الإجابات غير المحددة
1.39	5	ت- الإجابات الناقصة
4.99	18	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

نحصل بجمع نسبة الإجابة لا أعرف (98) و الإجابات الناقصة ( 99) على نسبة المعطيات الناقصة و التي بلغت المقدار 4.99% من مجموع المعنيات بالسؤال، و هي نسبة مهمة نوعا ما قد تنقص من قيمة المعطيات المتعلقة بهذا المتغير.

## 22.2.2. دافع أو سبب الكشف عن الحمل (f232):

استجوبت النساء (اللاتي عرضن أنفسهن للكشف عن الحمل) في هذا المتغير عن الدافع أو السبب الذي دفعهن للكشف عن الحمل لأول مرة. تم ترميز الإجابات (من 1 إلى 6) على النحو التالي: الدليل 1 يقابل الإجابة للتأكد من أنها حامل، الدليل 2 يقابل الإجابة للتأكد من سلامة الجنين، الدليل 3 يقابل الإجابة لضمان حمل صحي، الدليل 4 يقابل الإجابة 'كان لديها مشكلة'، الدليل 5 يقابل الإجابة 'كشف روتيني'، الدليل 6 يقابل الإجابة 'للحجز للولادة'. بالإضافة إلى الإجابة 'أخرى' التي حملت الدليل 96 و طلب تحديد هذا السبب الآخر. أما الإجابات الناقصة فتم ترميزها بالدليل 99.

نسجل من خلال الجدول أدناه نسبة 0.28% كمعطيات ناقصة بين مجموع المعنيات بالسؤال و هي نسبة ضئيلة.

جدول رقم 63: توزيع النساء حسب دافع أو سبب الكشف عن الحمل

النسب المئوية	التكرار	f232
99.72	360	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.28	1	ت- الإجابات الناقصة
0.28	1	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

23.2.2. عدد مرات الكشف خلال هذا الحمل (f233):

سئلت النساء عن عدد مرات الكشف خلال الحمل المنتهي بمولود غير حي . خصصت خانة لتسجيل عدد المرات و وظيف الدليل 30 للاتي كسفن ثلاثين مرة أو أكثر (30 أو +) و الدليل 98 للاتي لا يتذكرن عدد المرات و خصص الدليل 99 للإجابات الناقصة.

وصلت نسبة المعطيات الناقصة إلى 2.50% من مجموع المعنيات بالسؤال f233.

جدول رقم 64: توزيع النساء حسب عدد مرات الكشف خلال الحمل

النسب المئوية	التكرار	f233
97.50	352	أ- الإجابات الموافقة للمجال
2.22	8	ب- الإجابات غير المحددة
0.28	1	ت- الإجابات الناقصة
2.50	9	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

24.2.2. مكان إجراء آخر كشف عن الحمل (f234):

استفسرت النسوة عن المكان الذي أجرت فيه آخر كشف عن الحمل ( المرتهي بمولود غير حي)، لهذا الغرض تم اعتماد الترميز التالي:

الدليل 1 بالنسبة للاتي أجرين آخر كشف بمستشفى / مركز أمومة ، الدليل 2 حدد اللاتي كسفن عن الحمل آخر مرة بمصحة متعددة الخدمات/مركز صحي و القيمة 3 حددت المصحة الخاصة لإجراء

آخر كشف عن الحمل، الدليل 4 قابل الكشف لدى طبيب خاص، الدليل 5 في المنزل، القيمة 6 عرفت إجراء الكشف بمكان آخر، أما الإجابات الناقصة فتميز بالدليل 9.

جدول رقم 65: توزيع النساء حسب مكان إجراء آخر كشف عن الحمل

النسب المئوية	التكرار	f234
99.45	359	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.55	2	ت- الإجابات الناقصة
2.55	2	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

نسجل من الجدول رقم 65 معطيات ناقصة بلغت نسبة 0.55% فقط بين مجموع المعنيات.

## 25.2.2. سبب عدم إجراء الكشف عن هذا الحمل (f235):

سئلت النسوة (اللاتي لم يعرضن أنفسهن للكشف عن الحمل) عن دافع أو سبب عدم تعرضهن للكشف على الحمل. و حددت الإجابات من 1 إلى 6 على النحو التالي:

الدليل 1: عدم وجود متاعب، الدليل 2: لديها خبرة سابقة، القيمة 3: الخدمة غير موجودة، الرمز 4: التكلفة مرتفعة، الدليل 5: مشغولة/الزوج مشغول، الدليل 6: لأسباب أخرى (بالتحديد)، أما الإجابات الناقصة فعرفت بالدليل 9.

جدول رقم 66: توزيع النساء حسب سبب عدم إجراء الكشف عن هذا الحمل

النسب المئوية	التكرار	f235
95.65	242	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
4.35	11	ت- الإجابات الناقصة
4.35	11	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

نستنتج من الجدول رقم 66، أن نسبة المعطيات الناقصة بلغت 4.35% من مجموع المعنيات

بالسؤال f235.

## 26.2.2. تناول أقراص أو شراب الحديد، فيتامينات/كالسيوم/ مغنزيوم أو أي دواء آخر خلال الحمل (f236):

يتعلق السؤال بالنساء اللاتي انتهى الحمل لديهن بمولود غير حي (614 امرأة)، و يشمل المتغيرات الجزئية التالية:

تناول أقراص أو شراب الحديد (f236a)، تناول فيتامينات أو كالسيوم أو مغنزيوم (f236b)، تناول أي دواء آخر (f236c).

حدد الدليل 1 اللاتي تناولن، و عرف الدليل 2 اللواتي لم يتناولن، استخدم الدليل 9 للتعبير عن الإجابات الناقصة (في مختلف المتغيرات الجزئية).

جدول رقم 67: توزيع النساء حسب تناول أي من الأشياء (الأقراص/ شراب الحديد، فيتامينات/ كالسيوم/ مغنزيوم، أي دواء آخر) خلال الحمل المنتهي بولادة غير حية

f236c		f236b		f236a		f236
%	التكرار	%	التكرار	%	التكرار	
97.23	597	97.23	597	97.39	598	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	0.00	0	0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
2.77	17	2.77	17	2.61	16	ت- الإجابات الناقصة
2.77	17	2.77	17	2.61	16	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	0.00	0	0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يشير الجدول رقم 67 إلى نسبة معطيات ناقصة وصلت المستوى 2.61% في المتغير f236a و 2.77% في كل من المتغيرين f236b و f236c.

## 27.2.2. أخذ الحقن لتحصين الجنين من التيتانوس (f237):

استجوبت النساء ( اللاتي انتهى الحمل لديهن بمولود غير حي) عن أخذ الحقن لتحصين الجنين من التيتانوس خلال الحمل و عرف الدليل 1 اللاتي أخذن جرعة واحدة و حددت القيمة 2 اللاتي أخذن جرعتين و وضع الدليل 3 اللواتي أخذن ثلاث جرعات و خص الدليل 4 النسوة اللاتي لم يأخذن حقنًا

لتحصين الجنين من التيتانوس. أما الحالات غير المحددة فعرفت بالدليل 8 و أخذت الإجابات الناقصة القيمة 9.

جدول رقم 68: توزيع النساء حسب أخذ الحقن لتحصين الجنين من التيتانوس

النسب المئوية	التكرار	f237
95.44	586	أ- الإجابات الموافقة للمجال
2.93	18	ب- الإجابات غير المحددة
1.63	10	ت- الإجابات الناقصة
4.56	28	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

نسجل من الجدول رقم 68، نسبة معطيات ناقصة وصلت إلى حدود 4.56% بين مجموع المعنيات.

## 2.2.2. التعرض للمضاعفات خلال الحمل المنتهي بمولود خير حي (f238):

سئلت النسوة (اللاتي انتهى لديهن الحمل بمولود غير حي) عن تعرضهن لمضاعفات خلال هذا الحمل. حددت هذه المضاعفات بالمتغيرات الجزئية التالية:

التعرض لنزيف مهبلي حاد: f238a، ارتفاع في ضغط الدم: f238b، تورم في الوجه أو الجسم: f238c، صداع حاد: f238d، ألم أسفل البطن: f238e، ارتفاع شديد في درجة الحرارة: f238f، تشنجات غير ناجمة عن حمى: f238g، ألم عند التبول: f238h، الصفرة: f238i، صعوبة شديدة في التنفس: f238j، التعرض لأعراض أخرى مع التحديد: f238k.

تم تعريف اللواتي تعرضن للمضاعفات بالدليل 1 و اللاتي لم يتعرضن لها بالدليل 2 و أخذت الإجابات غير المحددة القيمة 8. أما الإجابات الناقصة فحددت بالدليل 9. وهذا في كل المتغيرات الجزئية المتعلقة بهذا السؤال.

يتبين من الجدول رقم 69 أن نسبة المعطيات الناقصة في المتغيرين الجزئيين f238b، f238k بلغت المستويين 6.03% و 7.17% على التوالي، قد تؤثر سلباً على معطيات السؤال f238.

جدول رقم 69: توزيع النساء حسب التعرض للمضاعفات خلال الحمل المنتهي بمولود غير حي

f238	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f238a	98.04	0.33	1.63	1.96	0.00
f238b	93.97	3.91	2.12	6.03	0.00
f238c	96.58	1.30	2.12	3.42	0.00
f238d	96.58	0.98	2.44	3.42	0.00
f238e	97.39	0.81	1.79	2.60	0.00
f238f	97.07	1.14	1.79	2.93	0.00
f238g	96.58	1.47	1.95	3.42	0.00
f238h	97.07	1.14	1.79	2.93	0.00
f238i	96.25	1.95	1.79	3.74	0.00
f238j	96.74	1.47	1.79	3.26	0.00
f238k	92.83	4.89	2.28	7.17	0.00

### 29.2.2. التحقق من السؤال f238 (f239):

صاغ السؤال f239 على النحو الآتي: هل تعرضت لأي من الأعراض (أعراض السؤال f238)؟ وخصص الرمز 1 للاتي تعرضن لأي من الأعراض السابقة، و الرمز 2 للاتي لم يتعرضن لأي منها أو لا يعرفن، مع الإشارة إلى عدم وجود للإجابات الناقصة.

بعد معالجة معطيات هذا المتغير، وجدنا أن نسبة اللاتي تعرضن لأحد الأعراض وصلت المستوى 74.92% و بهذا بلغت نسبة المبحوثات اللاتي لم يصبن بأي منها أو لا يعرفن المقدار 25.08% من مجموع المعنيات (الجدول رقم 70).



جدول رقم 70: توزيع النساء حسب التعرض لأي من الأعراض

النسب المئوية	التكرار	f239
100.00	614	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

30.2.2. تلقي النصيحة أو علاج الأعراض (f240):

وجه سؤال تلقي النصيحة أو علاج الأعراض (المقترحة في السؤال f238) للنساء اللاتي تعرضن لأحد الأعراض (460 امرأة).

تعددت المتغيرات الجزئية حسب جهة علاج الأعراض أو النصيحة:

f240a: طبيب، f240b: ممرضة/ قابلة مؤهلة، f240c: صيدلي، f240d: قابلة تقليدية، f240e: عطار (عشاب)، f240f: أقارب، f240g: أخرى (مع التحديد)، f240h: لا أحد.

خصص لهذه المتغيرات الجزئية الترميز التالي: الدليل 1 في حالة الإجابة نعم و الدليل 2 عند الإجابة بلا و عرف الرمز 9 الإجابات الناقصة.

نلاحظ وجود إجابة واحدة ناقصة في مختلف المتغيرات الجزئية، وافقته نسبة مئوية بسيطة

قدرها 0.22% من مجموع المتعرضات لأعراض السؤال f238 (الجدول رقم 71).

جدول رقم 71: توزيع النساء حسب تلقي النصيحة أو العلاج لأعراض السؤال f238

f240	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f240a	99.78	0.00	0.22	0.22	0.00
f240b	99.78	0.00	0.22	0.22	0.00
f240c	99.78	0.00	0.22	0.22	0.00
f240d	99.78	0.00	0.22	0.22	0.00
f240e	99.78	0.00	0.22	0.22	0.00
f240f	99.78	0.00	0.22	0.22	0.00
f240g	99.78	0.00	0.22	0.22	0.00
f240h	99.78	0.00	0.22	0.22	0.00

### 31.2.2. أسباب عدم تلقي علاج الأعراض (f241):

وجه هذا السؤال للواتي لم يتلقين أي علاج أو نصيحة من أي كان ( 69 مبحوثة) و صيغ

السؤال على النحو التالي:

لماذا لم تسعي إلى تلقي استشارة طبية لعلاج هذه الأعراض؟ مع التقصي عن أهم سبب.

وظفت 8 مداليل لحصر مختلف الفئات:

- 1 (لا يشكل مشكلة)، 2 (لديها تجربة سابقة)، 3 (الخدمة غير متوفرة)، 4 (التكلفة مرتفعة)، 5 (مشغولة/الزوج مشغول)، 6 (استعمال علاج غير طبي (تقليدي)، 96 (حالات أخرى مع التحديد)، 99 (الإجابات الناقصة).

أظهر الجدول رقم 72 معطيات ناقصة قدرها 2.90% بين مجموع المعنيات.

جدول رقم 72: توزيع النساء حسب أسباب عدم تلقي الاستشارة عن أعراض السؤال f238

النسب المئوية	التكرار	f241
99.78	67	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
2.90	2	ت- الإجابات الناقصة
2.90	2	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

32.2.2. تصنيف النسوة بالنظر إلى الحمل عند تاريخ الملاحظة (f242):

7399 خصص هذا السؤال لمعرفة الحالة الحالية بالنظر إلى الحمل (كل وحدات العينة: امرأة). صنفت النساء حسب هذا المتغير على النحو التالي: حامل حالياً: الدليل 1، ليست حامل حالياً: الدليل 2، غير متأكدة: الدليل 8، و الإجابات الناقصة: الدليل 9.

جدول رقم 73: توزيع النساء حسب حالة الحمل الحالية

النسب المئوية	التكرار	f242
99.30	7347	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.69	51	ب- الإجابات غير المحددة
0.01	1	ت- الإجابات الناقصة
0.70	52	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد معالجة المعطيات أحصينا نسبة بسيطة من المعطيات الناقصة ساوت المقدار 0.70% بين المجموع. تم تسجيل 629 امرأة حامل عند تاريخ الملاحظة.

33.2.2. عدد شهور الحمل (f243):

استهدف هذا السؤال النسوة الحوامل حالياً (629 امرأة) و تم وضع خانتين للإجابة عن عدد شهور هذا الحمل و الدليل 98 للاتي لا يعرفن عدد أشهر الحمل، و الرمز 99 للإجابات الناقصة.

نسجل من خلال الجدول رقم 74 نسبة من المعطيات الناقصة بلغت 4.61% بين مجموع المعنيات.

جدول رقم 74: توزيع النساء حسب عدد شهور الحمل

النسب المئوية	التكرار	f243
95.39	600	أ- الإجابات الموافقة للمجال
1.43	9	ب- الإجابات غير المحددة
3.18	20	ت- الإجابات الناقصة
4.61	29	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

34.2.2. الرغبة في الحمل الحالي (f244):

استفسرت النساء عن رغبتهن في الحمل الحالي. و تم استخدام الدليل 1 للاثي كن يردن الحمل وقتها و الدليل 2 للاثي كن يرغبن في الانتظار و الدليل 3 للاثي لم يرغبن في الحمل الحالي على الإطلاق. أما الإجابات الناقصة فحددت بالدليل 9.

جدول رقم 75: توزيع النساء حسب الرغبة في الحمل الحالي

النسب المئوية	التكرار	f244
98.89	622	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.11	7	ت- الإجابات الناقصة
1.11	7	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يبين الجدول رقم 75، نسبة معطيات ناقصة قدرها 1.11% من مجموع النساء المستجوبات (الحوامل حالياً).

35.2.2. استمرار الدورة الشهرية (f245):

سئلت النسوة (كل النساء اللاتي لسن حوامل حالياً: 6770 امرأة) عن حالة الدورة الشهرية لديهن، و وظف الدليل 1 في حالة استمرارها، و الدليل 2 في حالة انقطاعها (سن اليأس)، و الدليل 3 في حالة الانقطاع بسبب النفاس، و الدليل 4 للاثي لم يحضن أبداً و الدليل 9 للإجابات الناقصة.

جدول رقم 76: توزيع النساء حسب استمرار الدورة الشهرية

النسب المئوية	التكرار	f245
99.97	6768	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.03	2	ت- الإجابات الناقصة
0.03	2	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد معالجة معطيات هذا المتغير، سجلنا نسبة قدرها 89.72% ممثلة للنساء اللاتي لا زالت دوراتهن الشهرية مستمرة، و نسبة قدرها 5.78% من النساء اللاتي انقطعت لديهن الدورة الشهرية (وصلن سن اليأس)، و خصت النسبة 4.48% نسوة النفاس، و لم نسجل أية حالة من اللاتي لم يحضن أبدا. مثلت المعطيات الناقصة نسبة بسيطة بلغت المقدار 0.03% فقط من مجموع المعنيات بالسؤال f245 .

36.2.2. المدة منذ بداية آخر دورة شهرية (f246):

استجوبت النساء المعنيات (النساء اللاتي اجبن بنعم في السؤال f245) عن المدة المنقضية منذ أن بدأت آخر دورة شهرية. و تم ترميز الإجابة: منذ اقل من شهر بالدليل 1، بين شهر و ثلاثة أشهر بالدليل 2، بين ثلاثة أشهر و ستة أشهر بالدليل 3، بين ستة أشهر و اثني عشر شهرا بالدليل 4، منذ أكثر من اثني عشر شهرا بالدليل 5، الإجابات غير المحددة بالدليل 8، المعطيات الناقصة بالدليل 9.

جدول رقم 77: توزيع النساء حسب مدة بداية آخر دورة شهرية

النسب المئوية	التكرار	f246
99.03	6015	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.08	5	ب- الإجابات غير المحددة
0.89	54	ت- الإجابات الناقصة
0.97	59	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بلغت المعطيات الناقصة نسبة بسيطة قدرها 0.97% فقط من مجموع المعنيات بالسؤال.

### 37.2.2. عمر المرأة عند أول دورة شهرية (f247):

خصصت في الاستمارة خانتان للإجابة على السؤال و ذلك بتسجيل عمر المرأة عند أول دورة شهرية. تم استعمال الدليل 98 في الحالات لا تعرف/لا تتذكر/غير متأكدة، و الدليل 99 للإجابات الناقصة.

جدول رقم 78: توزيع النساء حسب عمر المرأة عند أول دورة شهرية في حياتها

النسب المئوية	التكرار	f247
94.30	6976	أ- الإجابات الموافقة للمجال
5.03	372	ب- الإجابات غير المحددة
0.68	50	ت- الإجابات الناقصة
5.71	422	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

لاحظنا بعد المعالجة، أن الأعمار أخذت المجال [9-22 سنة]. وبلغ عدد النساء المعنيات 7398 امرأة. سجلنا نسبة معتبرة من المعطيات الناقصة بلغت القيمة 5.71% قد تسيء لجودة معطيات هذا المتغير (الجدول رقم 78) .

### 38.2.2. تاريخ ميلاد آخر ولادة تمت بالنسبة ليناير 1997 (f248):

اقترحت إجابتان في هذا المتغير، الأولى: آخر ولادة تمت خلال يناير 1997 أو بعده و حددت بالدليل 1، الثانية: آخر ولادة تمت قبل يناير 1997 أو ليس لديها مواليد و عرفت بالدليل 2. لم نسجل أي معطيات ناقصة، بحيث تم تصنيف النسوة بشكل تام (الجدول رقم 79).

جدول رقم 79: توزيع النساء حسب تاريخ ميلاد آخر ولادة تمت بالنسبة ليناير 1997

النسب المئوية	التكرار	f248
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 3.2. قسم انتشار الأمراض المزمنة واعتلال الصحة بسبب الإنجاب:

خصص هذا القسم من الاستمارة 40 سؤالاً لاستجواب النساء عن الأمراض المزمنة و اعتلال الصحة بسبب الإنجاب.

#### 1.3.2. حالة المرأة الصحية بصفة عامة (f501):

استجوبت النساء عن حالاتهن الصحية و عن المشاكل الصحية التي تعاني منها بصفة عامة . صيغ السؤال على النحو التالي: هل تعتبري أن صحتك جيدة أو متوسطة أو سيئة؟

يعني الدليل 1: الحالة جيدة، الدليل 2: الحالة متوسطة، الدليل 3: الحالة سيئة. أما الإجابات الناقصة فعرفت بالدليل 9.

جدول رقم 80: توزيع النساء حسب حالاتهن الصحية بصفة عامة

النسب المئوية	التكرار	f501
99.84	7387	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.16	12	ت- الإجابات الناقصة
0.16	12	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يبين الجدول رقم 80 وجود نسبة بسيطة من المعطيات الناقصة. بلغت المقدار 0.16% فقط من المجموع.

#### 2.3.2. تغيير صحة المرأة مقارنة بالعام الماضي (f502):

تم استجواب المبحوثات عن حالاتهن الصحية مقارنة بالعام الماضي، بحيث تم تحديد اللاتي تحسنت صحياً بالدليل 1 و الحالات المستقرة بالدليل 2 و اللاتي ساءت صحياً بالدليل 3 والمعطيات الناقصة بالدليل 9.

يتبين من الجدول رقم 81 أن نسبة المعطيات الناقصة لم تتجاوز 0.50% فقط من المجموع.

جدول رقم 81: توزيع النساء حسب تغير حالاتهن الصحية مقارنة بالعام الماضي

النسب المئوية	التكرار	f502
99.51	7363	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.49	36	ت- الإجابات الناقصة
0.49	36	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

3.3.2. الإصابة بالأمراض المزمنة حالياً أو سابقاً (f503):

تم استجواب كل وحدات العينة ( 7399 امرأة) عن الإصابة (حالياً أو سابقاً) ببعض الأمراض المزمنة. شمل هذا السؤال عدة متغيرات جزئية على النحو التالي:

f503a: داء السل، f503b: داء السكري، f503c: داء ضغط الدم، f503d: داء الربو، f503e: أمراض القلب، f503f: أمراض المفاصل، f503g: أمراض الكبد، f503h: أمراض الكلى، f503i: التهاب أو قرحة المعدة، f503j: الأنيميا، f503k: تضخم في الغدة الدرقية، f503l: أمراض مزمنة أخرى مع التحديد.

في كل الحالات، تم تبني الترميز التالي: 1: المصابات حالياً أو سابقاً بالداء، 2: غير المصابات. أما الإجابات الناقصة فعرفت بالقيمة 9.

نلاحظ من الجدول رقم 82 ضالة نسب المعطيات الناقصة بحيث لم تتجاوز 1.00% من المجموع العام في مختلف المتغيرات الجزئية، المرتبطة بالسؤال f503.



جدول رقم 82: توزيع النساء حسب الإصابة حالياً أو سابقاً ببعض الأمراض المزمنة

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	عدد المعنيات بالسؤال (كل وحدات العينة)	f503
0.00	0.05	0.05	0.00	99.95	7399	f503a
0.00	0.08	0.08	0.00	99.92	7399	f503b
0.00	0.09	0.09	0.00	99.91	7399	f503c
0.00	0.08	0.08	0.00	99.92	7399	f503d
0.00	0.08	0.08	0.00	99.92	7399	f503e
0.00	0.08	0.08	0.00	99.92	7399	f503f
0.00	0.07	0.07	0.00	99.93	7399	f503g
0.00	0.09	0.09	0.00	99.91	7399	f503h
0.00	0.08	0.08	0.00	99.92	7399	f503i
0.00	0.11	0.11	0.00	99.89	7399	f503j
0.00	0.07	0.07	0.00	99.93	7399	f503k
0.00	0.23	0.23	0.00	99.77	7399	f503l

4.3.2. كشف الطبيب عن الأمراض المزمنة وإخبار المصابات به (f504):

استجوبت النسوة المصابات بالأمراض المزمنة عن كشف هذا الداء من طرف طبيب و إخبارهن به. حدد الدليل 1 الإجابة بنعم و الدليل 2 الإجابة بلا و مثل الرمز 9 الإجابات الناقصة.

بعد معالجة معطيات هذا السؤال تبين لنا وجود معطيات ناقصة قليلة في مختلف المتغيرات، لا تؤثر في جودة المعطيات (الجدول رقم 83).

جدول رقم 83: توزيع المصابات حسب الكشف عن الأمراض المزمنة من قبل طبيب وإخبارهن به

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	عدد المعنيات (المصابات بالأمراض المزمنة)	f504
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25	f504a
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	121	f504b
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	369	f504c
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	140	f504d
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	114	f504e
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	265	f504f
0.00	3.03	3.03	0.00	96.97	33	f504g
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	113	f504h
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	258	f504i
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	148	f504j
0.00	1.03	1.03	0.00	98.97	97	f504k
0.00	0.57	0.57	0.00	99.43	524	f504l

### 5.3.2. أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بالأمراض المزمنة (f505):

خصصت للإجابة عن عمر المرأة عند اكتشافها الإصابة بمرض مزمن خانتين و وظف الدليل 98 للاتي لا يعرفن أعمارهن عند اكتشاف المرض أو الأمراض المزمنة و الدليل 99 للإجابات الناقصة.

من خلال معطيات الجدول رقم 84، لاحظنا وجود ستة متغيرات فاقت معطياتها الناقصة النسبة 5.00% (f505g: 9.09%، f505i: 8.14%)، قد تؤثر هذه النسب سلبا على نوعية معطيات السؤال العام f505.

جدول رقم 84: توزيع النساء حسب أعمارهن عند اكتشاف الإصابة بالأمراض المزمنة

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	عدد المعنيات (المصابات بالأمراض المزمنة)	f505
0.00	4.00	0.00	4.00	96.00	25	f505a
0.00	2.48	0.83	1.65	97.52	121	f505b
0.00	3.25	0.54	2.71	96.75	369	f505c
0.00	5.00	0.00	5.00	95.00	140	f505d
0.00	2.63	0.00	2.63	97.37	114	f505e
0.00	7.55	1.13	6.42	92.45	265	f505f
0.00	9.09	6.06	3.03	90.91	33	f505g
0.00	5.31	0.89	4.42	94.69	113	f505h
0.00	8.14	1.16	6.98	91.86	258	f505i
0.00	3.38	0.68	2.70	96.62	148	f505j
0.00	4.12	1.03	3.09	95.88	97	f505k
0.00	6.68	1.34	5.34	93.32	524	f505l

### 6.3.2. تناول علاج الأمراض المزمنة بصفة مستمرة (f506):

سئلت المصابات بالأمراض المزمنة عن تناول العلاج بانتظام، حدد الدليل 1 اللاتي يتناولن العلاج باستمرار، و الدليل 2 للاتي لا يتناولن العلاج بصفة دائمة، و عرفت الإجابات الناقصة بالدليل 9.

f506g سجلنا على معظم متغيرات هذا السؤال معطيات ناقصة بسيطة، إلا في حالة المتغير أين بلغت نسبة معطياته الناقصة المقدار 6.06% بين مجموع المعنيات (الجدول رقم 85).

جدول رقم 85: توزيع المصابات بالأمراض المزمنة حسب تناولهن العلاج باستمرار

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	عدد المعنيات (المصابات بالأمراض المزمنة)	f506
0.00	4.00	4.00	0.00	96.00	25	f506a
0.00	0.83	0.83	0.00	99.17	121	f506b
0.00	2.17	2.17	0.00	97.83	369	f506c
0.00	1.43	1.43	0.00	98.57	140	f506d
0.00	3.51	3.51	0.00	96.49	114	f506e
0.00	3.40	3.40	0.00	96.60	265	f506f
0.00	6.06	6.06	0.00	93.94	33	f506g
0.00	1.77	1.77	0.00	98.23	113	f506h
0.00	2.71	2.71	0.00	97.29	258	f506i
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	148	f506j
0.00	1.03	1.03	0.00	98.97	97	f506k
0.00	0.57	0.57	0.00	99.43	524	f506l

### 7.3.2. المعاناة الآن أو سابقا من احد أنواع السرطان (f507):

وجه هذا السؤال لكل النساء دون استثناء ( 7399 امرأة)، و لتلخيص المعطيات اعتمد الترميز

1 (نعم) 2 (لا) و اخذ المتغير القيمة 9 في حالة المعطيات الناقصة.

بعد معالجة المعطيات، سجلنا 14 حالة تعاني أو عانت سابقا من أحد أنواع السرطان، كما

سجلنا نسبة بسيطة من المعطيات الناقصة، بلغت 0.05% فقط بين المجموع.

جدول رقم 86: توزيع النساء حسب المعاناة (الآن أو سابقاً) من أحد أنواع السرطان

النسب المئوية	التكرار	f507
99.95	7395	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.05	4	ت- الإجابات الناقصة
0.05	4	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 8.3.2. نوع السرطان الذي تعاني (أو عانت) منه المبحوثات (f508):

خصصت استمارة المسح خانتين لتسجيل الرمز الخاص بالسرطان الذي تعاني منه المصابة،

حيث حددت أنواع السرطان بالمجال [1-11] على النحو التالي:

1: سرطان الثدي، 2: سرطان الرحم، 3: سرطان المبيض، 4: الجهاز البولي، 5: كريات الدم البيضاء، 6: تورم الغدد، 7: سرطان الفم، 8: الجهاز الهضمي، 9: الجهاز التنفسي، 10: الجهاز العصبي، 11: العيون. أما الرمز 12 فارتبط بحالات السرطان الأخرى، ووظف الدليل 98 للاثي لا يعرفن، كما أخذ المتغير القيمة 99 في حالة الإجابات الناقصة.

جدول رقم 87: توزيع النساء حسب نوع السرطان الذي تعاني (أو عانت) منه

النسب المئوية	التكرار	f508
50.00	7	أ- الإجابات الموافقة للمجال
21.43	3	ب- الإجابات غير المحددة
28.57	4	ت- الإجابات الناقصة
50.00	7	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد معالجة معطيات هذا المتغير، سجلنا 4 إصابات من سرطان الثدي، حالتين مصابتين

بسرطان الرحم، حالة واحدة مصابة بسرطان آخر. يبين الجدول رقم 87 وجود نسبة كبيرة جداً من

المعطيات الناقصة وصلت إلى نصف المعطيات المتعلقة بهذا المتغير ( 50.00% ) بين مجموع

المصابات بأحد أنواع السرطان (14 امرأة)، ما يجعلها تؤثر في قيمة معطيات المتغير f508.

### 9.3.2. عمر المرأة عند إخبارها أو اكتشافها الإصابة بالسرطان (f509):

تم وضع خانتين لتسجيل عمر المرأة عند اكتشافها إصابتها بالسرطان ووظف الدليل 98 في حالة الإجابات غير المحددة (لا تعرف) و عرف الدليل 99 الإجابات الناقصة.

جدول رقم 88: توزيع النساء حسب عمر المرأة عندما تم إخبارها أو اكتشفت أنها مصابة بالسرطان

النسب المئوية	التكرار	f509
71.43	10	أ- الإجابات الموافقة للمجال
7.14	1	ب- الإجابات غير المحددة
21.43	3	ت- الإجابات الناقصة
28.57	4	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

نسجل من خلال الجدول أعلاه نسبة كبيرة من المعطيات الناقصة بين معطيات هذا المتغير. بلغت المستوى 28.57% من مجموع المعنيات بالسؤال. قد تسيء هذه النسبة لنوعية المعطيات المتعلقة بهذا المتغير.

### 10.3.2. تلقى أي علاج (الآن / في الماضي) للسرطان (f510):

تم استجواب النساء المصابات عن تلقي أي علاج (حاليا أو في الماضي) للسرطان. وضع الدليل 1 في حالة الإجابة بنعم حاليا و الدليل 2 في حالة الإجابة بنعم في الماضي و الدليل 3 في حالة الإجابة بلا، و خصص الدليل 9 كرمز للإجابات الناقصة.

جدول رقم 89: توزيع النساء حسب تلقي أي علاج (الآن / في الماضي) للسرطان

النسب المئوية	التكرار	f510
71.43	10	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
28.57	4	ت- الإجابات الناقصة
28.57	4	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يشير الجدول (رقم 89) إلى وجود نسبة كبيرة من المعطيات الناقصة وصلت المقدار 28.57% من مجموع المعنيات بالسؤال، و هي نسبة كبيرة قد تشوه معطيات المتغير.

### 11.3.2. التحقق من السؤالين f208 و f222 (f510a):

وظف هذا المتغير للتحقق من مصداقية معطيات المتغيرين f208 و f222 (مجموع الموالي الأحياء، الحمل الذي لم ينته بولادة حية) حيث استجوبت نساء العينة (7399 امرأة) عن ما إذا سبق لها الحمل أم لا. خصص الدليل 1 للاتي سبق لهن الحمل و الدليل 2 للاتي لم يسبق لهن الحمل. تمت الإجابة عن هذا السؤال بشكل تام.

جدول رقم 90: توزيع النساء حسب حصول الحمل في السابق

النسب المئوية	التكرار	f510a
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد معالجة المعطيات ، تم تسجيل 6808 حالة سبق لها الحمل و 591 حالة لم تتعرض للحمل.

### 12.3.2. الشعور بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل (f511):

سئلت النسوة اللاتي سبق لهن الحمل (6808 امرأة) عن ما إذا أحسسن بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل. تم ترميز الإجابة نعم بالدليل 1 و الإجابة لا بالدليل 2 و أخذ المتغير الدليل 9 في حالة الإجابات الناقصة.

أحست 479 امرأة أحست بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل من بين المعنيات بالسؤال، و بلغت المعطيات الناقصة نسبة قدرها 1.34%.

جدول رقم 91: توزيع النساء حسب الشعور بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل

النسب المئوية	التكرار	f511
98.66	6717	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.34	91	ت- الإجابات الناقصة
1.34	91	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 13.3.2. مدة المعاناة من مشكلة الإحساس بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل (f512):

وجه هذا السؤال للنساء المعنيات (479 امرأة) على الصيغة: منذ متى تعانين من هذه المشكلة؟ (الشعور بثقل أسفل البطن بسبب الحمل)؟ خصصت خانتين لتسجيل المدة بعدد السنوات و يتم تسجيل 00 إذا كانت المدة تقل عن سنة واحدة و يتم تسجيل 20 إذا كانت المدة أكثر أو تساوي 20 سنة و استخدم الدليل 98 للواتي لا يعرفن عدد السنوات و وظف الدليل 99 في حالة الإجابات الناقصة.

جدول رقم 92: توزيع النساء حسب مدة المعاناة من مشكلة الإحساس بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل

النسب المئوية	التكرار	f512
91.44	438	أ- الإجابات الموافقة للمجال
7.10	34	ب- الإجابات غير المحددة
1.46	7	ت- الإجابات الناقصة
8.56	41	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يشير الجدول رقم 92 إلى نسبة مهمة من المعطيات الناقصة بلغت المستوى 8.56% بين مجموع المعنيات بالسؤال، و هي نسبة قد تنقص من جودة معطيات هذا المتغير.

### 14.3.2. تغير حالة الإحساس بثقل أسفل البطن عند السعال أو العطاس أو رفع شيء ثقيل

(f513):

تم استجواب المعنيات (479 امرأة) عن حالة تغير الشعور بثقل أسفل البطن عند السعال أو العطاس أو ترفع شيء ثقيل و اعتمد الترميز التالي:



1: يبقى كما هو، 2: ينقص، 3: يسوء، 9: الإجابات الناقصة.

جدول رقم 93: توزيع النساء حسب تغير حالة الإحساس بثقل أسفل البطن عند السعال أو العطاس أو

رفع شيء ثقيل

النسب المئوية	التكرار	f513
99.16	475	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.84	4	ت- الإجابات الناقصة
0.84	4	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

تشمل معطيات الجدول رقم 93 قدر بسيط من المعطيات الناقصة ( 0.84%) بين مجموع المعنيات بالسؤال. بعد المعالجة، صرحت 174 امرأة ببقاء الإحساس بثقل أسفل البطن على حاله (عند السعال أو العطاس أو رفع شيء ثقيل). كما أدلت 46 امرأة بنقصانه فيما أكدت 255 من بين المستجوبات سوء الحال.

### 15.3.2. تلقي النصيحة أو الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن (f514):

سئلت المعنيات ( 479 امرأة) عن الاستشارة قصد علاج مشكلة الشعور بثقل أسفل البطن

و تضمن هذا السؤال عشرة (10) متغيرات حسب مصدر الاستشارة:

f514a: الاستشارة لدى طبيب، f514b: ممرضة/ قابلة مدربة، f514c: صيدلي، f514d: قابلة

تقليدية، f514e: معالج تقليدي، f514f: عطار (عشاب)، f514g: ذاتيا، f514h: أقارب، f514i:

شخص آخر، f514j: عدم الاستشارة.

تم اعتماد الترميز الموالي:

الدليل 1: في حالة الاستشارة، الدليل 2: عند عدم الاستشارة، الدليل 9: في حالة الإجابات الناقصة.

بعد المعالجة، سجلنا نسبة بسيطة من المعطيات الناقصة بلغت المقدار 0.42% من بين مجموع

المعنيات بالسؤال، لا يؤثر على جودة المعطيات، كما أحصينا 173 امرأة لم تتلق الاستشارة.

جدول رقم 94: توزيع النساء حسب تلقي النصيحة أو الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	f514
0.00	0.42	0.42	0.00	99.58	f514a
0.00	0.42	0.42	0.00	99.58	f514b
0.00	0.42	0.42	0.00	99.58	f514c
0.00	0.42	0.42	0.00	99.58	f514d
0.00	0.42	0.42	0.00	99.58	f514e
0.00	0.42	0.42	0.00	99.58	f514f
0.00	0.42	0.42	0.00	99.58	f514g
0.00	0.42	0.42	0.00	99.58	f514h
0.00	0.42	0.42	0.00	99.58	f514i
0.00	0.42	0.42	0.00	99.58	f514j

### 16.3.2. أسباب عدم تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن (f515):

تم بحث المعنيات ( 175 امرأة = 173 اللاتي لم يتلقين الاستشارة + حالتان 02 معطيات ناقصة) من خلال السؤال المتضمن للمتغير f515 عن أسباب عدم تلقي الاستشارة لمشكلة الشعور بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل.

تعددت متغيرات هذا السؤال حسب أسباب عدم تلقي الاستشارة على النحو التالي:

f515a: لا تعتقد أن ذلك يساعد، f515b: التكلفة مرتفعة، f515c: الخدمة غير متوفرة، f515d: مشغولة/ الزوج مشغول، f515e: المشكل لا يستدعي، f515f: محرجة، f515g: خائفة، f515h: ظروف أخرى.

وظف الترميز التالي في كل هذه المتغيرات: الدليل 1 في حالة الإجابة بنعم، الدليل 2 في حالة

الإجابة بلا و الدليل 9 في حالة المعطيات الناقصة.

جدول رقم 95: توزيع النساء حسب أسباب عدم تلقي الاستشارة للإحساس بثقل أسفل البطن

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	f515
0.00	5.14	5.14	0.00	94.86	f515a
0.00	5.14	5.14	0.00	94.86	f515b
0.00	5.14	5.14	0.00	94.86	f515c
0.00	5.14	5.14	0.00	94.86	f515d
0.00	5.14	5.14	0.00	94.86	f515e
0.00	5.14	5.14	0.00	94.86	f515f
0.00	5.14	5.14	0.00	94.86	f515g
0.00	5.14	5.14	0.00	94.86	f515h

بعد معالجة معطيات كل هذه المتغيرات الجزئية، لاحظنا وجود 9 معطيات ناقصة توافق النسبة 5.14% بين مجموع المعنيات بهذه الأسئلة الجزئية، ما قد يسيء لجودة المعطيات.

### 17.3.2. مشكلة عدم التحكم في البول لدى المرأة عند السعال أو العطاس أو رفع شيء

تقيل (f516):

استجوبت اللواتي سبق لهن الحمل (6808 امرأة) عن القدرة على التحكم في البول عند السعال أو العطاس أو رفع شيء ثقيل. أخذ المتغير القيمة 1 في حالة الإجابة بنعم، و الدليل 2 في حالة لإجابة بلا، و الرمز 9 في حالة الإجابات الناقصة.

بعد معالجة معطيات هذا السؤال، سجلنا 568 حالة تعاني من مشكلة عدم التحكم في البول عند العطاس أو السعال أو رفع شيء ثقيل. تضمنت المعطيات 84 إجابة ناقصة وافقت النسبة 1.23% بين مجموع المعنيات بالسؤال f516.

جدول رقم 96: توزيع النساء حسب القدرة على التحكم في البول عند السعال أو العطاس أو رفع شيء

تقيل

النسب المئوية	التكرار	f516
98.77	6724	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.23	84	ت- الإجابات الناقصة
1.23	84	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 18.3.2. الاستشارة للعلاج أو تلقي النصيحة عن مشكلة عدم التحكم في البول (f517):

سئلت المعنيات ( 568 امرأة) عن الاستشارة. بغية لعلاج مشكلة عدم التحكم في البول عند السعال أو العطاس أو رفع شيء ثقيل أو المعرفة فقط. شمل هذا السؤال عشرة ( 10 حالات من الاستشارة لخصت في المتغيرات الآتية:

f517a (الاستشارة لدى طبيب)، f517b (مرضة/ قابلة مدربة)، f517c (صيدلي)، f517d (قابلة تقليدية)، f517e (معالج تقليدي)، f517f (عطار/ عشاب)، f517g (ذاتيا)، f517h (أقارب)، f517i (شخص آخر)، f517j (عدم تلقي الاستشارة).

تم ترميز الإجابات كالتالي: 1 (نعم)، 2 (لا)، 9 (الإجابات الناقصة).

من خلال المعالجة، سجلنا على كل المتغيرات الجزئية نسبة معطيات ناقصة بسيطة بلغت المقدار 0.70% من مجموع المعنيات بالسؤال f517 ( 568 مبحوثة). لا يؤثر هذا المقدار على المعطيات، كما أحصينا 268 حالة لم تطلب الاستشارة.

جدول رقم 97: توزيع النساء حسب الاستشارة لعلاج مشكلة عدم التحكم في البول

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	f517
0.00	0.70	0.70	0.00	99.30	f517a
0.00	0.70	0.70	0.00	99.30	f517b
0.00	0.70	0.70	0.00	99.30	f517c
0.00	0.70	0.70	0.00	99.30	f517d
0.00	0.70	0.70	0.00	99.30	f517e
0.00	0.70	0.70	0.00	99.30	f517f
0.00	0.70	0.70	0.00	99.30	f517g
0.00	0.70	0.70	0.00	99.30	f517h
0.00	0.70	0.70	0.00	99.30	f517i
0.00	0.70	0.70	0.00	99.30	f517j

19.3.2. أسباب عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول نتيجة الحمل (f518):

استجوبت النسوة اللواتي لم يستشرن أحداً بغية العلاج أو المعرفة بعدم التحكم في البول ( 272 امرأة= 268 حالة+ 4 إجابات ناقصة في f517) عن أسباب عدم الاستشارة هذه.

تضمن هذا السؤال المتغيرات الآتية:

لا تعتقد أن ذلك يساعد (f518a)، التكلفة مرتفعة (f518b)، الخدمة غير متوفرة (f518c)، مشغولة/ الزوج مشغول (f518d)، المشكل لا يستدعي (f518e)، محرجة (f518f)، خائفة (f518g)، أخرى (f518h).

تم ترميز الإجابة نعم بالدليل 1، الإجابة لا بالدليل 2، الإجابات الناقصة بالدليل 9.

جدول رقم 98: توزيع النساء حسب أسباب عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	f518
0.00	2.94	2.94	0.00	97.06	f518a
0.00	2.94	2.94	0.00	97.06	f518b
0.00	2.94	2.94	0.00	97.06	f518c
0.00	2.94	2.94	0.00	97.06	f518d
0.00	2.94	2.94	0.00	97.06	f518e
0.00	2.94	2.94	0.00	97.06	f518f
0.00	2.94	2.94	0.00	97.06	f518g
0.00	2.94	2.94	0.00	97.06	f518h

سجلنا على هذه المتغيرات نسبة معطيات ناقصة بسيطة قدرها 2.94% من مجموع المعنيات، لا تؤثر على نوعية المعطيات.

### 20.3.2. المعاناة من آلام و حروق عند التبول أو من إفرازات مهبلية حادة أو غير

مألوفة خلال الثلاثة أشهر الماضية (f519):

خص هذا المتغير كل أفراد العينة (7399 امرأة)، ووظف لمعرفة عدد اللاتي عانين من الآلام و الحروق عند التبول أو من إفرازات مهبلية حادة أو غير مألوفة، خلال الثلاثة أشهر الماضية.

احتوى السؤال متغيرين هما: f519a (المعاناة من آلام و حروق عند التبول خلال الثلاث أشهر التي سبقت المسح)، f519b (المعاناة من إفرازات مهبلية حادة أو غير مألوفة في الثلاث أشهر الماضية).

وضع الدليل 1 في حالة المعاناة و الدليل 2 في حالة عدم المعاناة و عرف الدليل 9 المعطيات الناقصة.

جدول رقم 99: توزيع النساء حسب المعاناة من آلام و حروق عند التبول أو من إفرازات مهبلية حادة أو غير مألوفة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة

f519b		f519a		f519
النسب المئوية	التكرار	النسب المئوية	التكرار	
99.93	7394	99.92	7393	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.07	5	0.08	6	ت- الإجابات الناقصة
0.07	5	0.08	6	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد معالجة المعطيات، تبين وجود 836 مبحوثة عانت من آلام و حروق عند التبول و 783 امرأة عانت من إفرازات مهبلية حادة خلال الثلاث أشهر التي سبقت المسح. إلى جانب هذا، شمل الجدول رقم 99 معطيات ناقصة بسيطة لم تتجاوز نسبتها 0.1% من المجموع العام.

21.3.2. تعرض النسوة اللاتي عانين من إفرازات مهبلية حادة خلال 3 أشهر الأخيرة لهرش أو حساسية حول الجهاز التناسلي أو لإفرازات ذات رائحة كريهة أو لآلم حاد في أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية (f520):

خص هذا السؤال النساء اللاتي عانت من إفرازات مهبلية حادة ( 783 حالة)، و تضمن ثلاث متغيرات:

f520a: التعرض لهرش أو حساسية حول الجهاز التناسلي، f520b: التعرض لإفرازات ذات رائحة كريهة، f520c: التعرض لآلم حاد أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية.

وظف الدليل 1 في حالة التعرض للأعراض، و الدليل 2 في حالة عدم التعرض لها، و أخذت المتغيرات القيمة 9 في حالة المعطيات الناقصة.

يشير الجدول رقم 100 إلى معطيات ناقصة بلغت نسبتها المئوية 5.11 في المتغير f520c، قد تنقص من معطيات هذا المتغير.

جدول رقم 100: توزيع النساء حسب التعرض لهرش أو حساسية حول الجهاز التناسلي أو لإفرازات ذات رائحة كريهة أو لألم حاد في أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية

f520c		f520b		f520a		f520
%	التكرار	%	التكرار	%	التكرار	
94.89	743	98.08	768	98.85	774	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	0.00	0	0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
5.11	40	1.92	15	1.15	9	ت- الإجابات الناقصة
5.11	40	1.92	15	1.15	9	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	0.00	0	0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

22.3.2. ظهور مشكل واحد على الأقل أو لا وجود لأي مشكل بالنظر للسؤال f519 (f521):

استهدف هذا السؤال كل أفراد العينة (7399 مبحوثة)، و تم تحديد المركبة (إما f519a = 1 أو f519b = 1): أي ظهور مشكل واحد على الأقل بالدليل 1، و الحالة: لا يوجد لأي مشكل ( f519a = 2 و f519b = 2) بالدليل 2. تم تحديد الحالتين بشكل تام (الجدول رقم 101).

جدول رقم 101: توزيع النساء حسب التعرض لمشكل واحد على الأقل في السؤال f519

النسب المئوية	التكرار	f521
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

تم تسجيل 1155 امرأة ضمن فئة الحالة الأولى (المعاناة من مشكل واحد على الأقل: إما ألم و حرقان عند التبول و إما إفرازات مهبلية حادة أو غير مألوفة) و تم تصنيف 6244 امرأة في الفئة الثانية (لا وجود لأي مشكل).



### 23.3.2. الاستشارة للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (المشاكل) (f522):

استهدف هذا السؤال نسوة الفئة الأولى بالنظر إلى المتغير f521 (1155 امرأة لديها مشكلة واحدة على الأقل من المشاكل المحددة بالسؤال f519).

شمل هذا السؤال المتغيرات الجزئية التالية، حسب مصدر الاستشارة:

f522a: طبيب، f522b: ممرضة أو قابلة مدربة، f522c: صيدلي، f522d: داية، f522e: معالج تقليدي، f522f: عطار(عشاب)، f522g: ذاتيا، f522h: أقارب، f522i: شخص آخر، f522j: عدم تلقي الاستشارة.

و لتمييز النسوة (الأم و حرقان عند التبول، إفرازات مهبلية حادة أو غير مألوفة) وظف الدليل 1 في حالة الاستشارة و الدليل 2 عند عدم الاستشارة و الدليل 9 للإجابات الناقصة.

جدول رقم 102: توزيع النساء حسب الاستشارة للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (المشاكل)

f522	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f522a	98.44	0.00	1.56	1.56	0.00
f522b	98.44	0.00	1.56	1.56	0.00
f522c	98.44	0.00	1.56	1.56	0.00
f522d	98.44	0.00	1.56	1.56	0.00
f522e	98.44	0.00	1.56	1.56	0.00
f522f	98.44	0.00	1.56	1.56	0.00
f522g	98.44	0.00	1.56	1.56	0.00
f522h	98.44	0.00	1.56	1.56	0.00
f522i	98.44	0.00	1.56	1.56	0.00
f522j	98.44	0.00	1.56	1.56	0.00

بعد معالجة معطيات السؤال العام، سجلنا على كل المتغيرات قدرا من المعطيات الناقصة مثل 1.56% من مجموع المعنويات بالسؤال. كما أحصينا 396 حالة لم تقم بأي استشارة حول المشكلة أو المشاكل (الأم أو حرقان عند التبول/ إفرازات مهبلية حادة أو غير مألوفة).

### 24.3.2. أسباب عدم الاستشارة (f523):

استجوبت النسوة اللاتي لم تتطلبن استشارة إضافة إلى الحالات الناقصة (396 امرأة + 18 إجابة ناقصة= 414 مبحوثة) عن أسباب عدم الاستجواب عن مشاكل السؤال f519.

احتوى هذا السؤال ثمانية (08) متغيرات حسب سبب عدم الاستشارة تمثلت فيما يلي:

f523a (لا تعتقد أن ذلك يساعد)، f523b (التكلفة مرتفعة)، f523c (الخدمة غير متوفرة)، f523d (مشغولة/ الزوج مشغول)، f523e (المشكل لا يستدعي)، f523f (محرجة)، f523g (خائفة)، f523h (أخرى).

تم تحديد إمكانيتين للإجابة على السؤال: الأولى: نعم: الدليل 1، الثانية: لا: الدليل 2. أما المعطيات الناقصة فعبر عنها بالرمز 9.

جدول رقم 103: توزيع النساء حسب أسباب عدم الاستشارة للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشاكل

f523	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f523a	92.03	0.00	7.97	7.97	0.00
f523b	92.03	0.00	7.97	7.97	0.00
f523c	92.03	0.00	7.97	7.97	0.00
f523d	92.03	0.00	7.97	7.97	0.00
f523e	92.03	0.00	7.97	7.97	0.00
f523f	92.03	0.00	7.97	7.97	0.00
f523g	92.03	0.00	7.97	7.97	0.00
f523h	92.03	0.00	7.97	7.97	0.00

يشير الجدول رقم 103 إلى نسبة معطيات ناقصة مهمة بلغت المستوى 7.97%، قد تنقص من مصداقية معطيات السؤال.

### 25.3.2. حالة الحمل حالياً بالنظر للسؤال f242 (f524):

خص هذا السؤال كل وحدات العينة (7399 امرأة) حيث أدرج لتحديد عدد النساء الحوامل حالياً (التحقق من معطيات السؤال f242). أعتمد الترميز التالي:  
الدليل 1: ليست حامل حالياً/ غير متأكدة ، الدليل 2: حامل حالياً. لم يشمل هذا السؤال أية معطيات ناقصة.

بعد معالجة معطيات هذا السؤال، تبين وجود 629 حاملاً حالياً و 6770 مبحوثة إما غير حامل أو غير متأكدة.

جدول رقم 104: توزيع النساء بالنظر إلى وضعية الحمل أو عدمه عند تاريخ الملاحظة

النسب المئوية	التكرار	f524
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 26.3.2. حالة الحيض بالنظر للسؤال f245 (f525):

أدرج هذا السؤال لمعرفة استمرار الحيض أو توقفه لدى النسوة غير الحوامل ( 6770 امرأة). وظف الدليل 1 في حالة استمرار الحيض و الدليل 2 في حالة انقطاع الحيض.

تم تصنيف النسوة بشكل تام. و بعد المعالجة، تبين وجود 6377 امرأة لا تزال تحيض و 393 مبحوثة انقطع لديها الحيض.

جدول رقم 105: توزيع النساء حسب حالة الحيض

النسب المئوية	التكرار	f525
100.00	6770	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

27.3.2. وضعية النساء اللائي مازلن يحضن الزوجية بالنظر للسؤال f124 (f526):

أستخدم هذا السؤال لتصنيف المستمرات في الحيض ( 6377 امرأة) بالنظر للزوجية، و مثل الدليل 1 الحالة: متزوجة حالياً (متزوجة/ منفصلة) و الدليل 2 الحالة: غير متزوجة حالياً (أرملة/ مطلقة). لم نسجل أي إجابة ناقصة على معطيات هذا المتغير (f526).

جدول رقم 106: توزيع النساء المستمرات في الحيض حسب الحالة الزوجية

النسب المئوية	التكرار	f526
100.00	6377	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

سجلنا من خلال معالجة معطيات هذا المتغير 5900 امرأة متزوجة حالياً (متزوجة حالياً أو منفصلة) و هي لا تزال تبيض و سجلنا 477 من غير المتزوجات (أرملة أو مطلقة) تبيض.

28.3.2. رغبة الحمل دون جدوى (f527):

خصص هذا السؤال للنسوة المتزوجات و المستمرات في الحيض ( 5900 مبحوثة)، من زاوية رغبة الحمل دون جدوى. وضع الدليل 1 في حالة الإجابة بنعم و الدليل 2 عند الإجابة بلا، و أخذ المتغير القيمة 9 في حالة المعطيات الناقصة.

جدول رقم 107: توزيع النساء حسب محاولتهن الحمل لكن دون جدوى

النسب المئوية	التكرار	f527
99.34	5861	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.66	39	ت- الإجابات الناقصة
0.66	39	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد المعالجة، سجلنا 474 متزوجة حاليا و لا تزال تحيض حاولت الإنجاب إلا أنها لم تفلح في ذلك، و 5387 معنية بالسؤال لم تحاول الحمل، و يشير الجدول رقم 107 إلى وجود معطيات ناقصة لم تتعد النسبة 0.70% من مجموع المعطيات.

29.3.2. عدد أشهر محاولة الحمل دون جدوى (f528):

خص هذا السؤال للنساء المتزوجات حاليا و لازلن يحضن مع محاولتهن الحمل دون جدوى (474 امرأة). أدرج لتحديد عدد أشهر محاولة الحمل دون نجاح. تم تلخيص الإجابة في خانتين (تسجيل عدد الأشهر) و اخذ المتغير القيمة 96 في حالة بلوغ عدد الأشهر 96 أو أكثر. أما الإجابات الناقصة فعرفت بالرمز 99.

جدول رقم 108: توزيع النساء حسب عدد أشهر محاولة الحمل دون جدوى

النسب المئوية	التكرار	f528
92.41	438	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
7.59	36	ت- الإجابات الناقصة
7.59	36	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يشير الجدول رقم 108 إلى نسبة هامة من المعطيات الناقصة بلغت 7.59% بين مجموع المعنيات، قد تنقص من جودة المعطيات.

### 30.3.2. السبب الرئيسي من وراء فشل الحمل حسب رأي المبحوثة (f529):

سئلت السيدات ( 474 امرأة) عن السبب الرئيسي الذي يقف وراء عدم قدرتهن على الحمل حسب آرائهن. تم اعتماد الترميز الآتي:

الوصول لسن اليأس: الدليل 1، العقم: الدليل 2، المرض: الدليل 3، الزوج عقيم: الدليل 4، أسباب أخرى (مع التحديد): الدليل 6، الإجابات غير المحددة: الدليل 8، الإجابات الناقصة: الدليل 9.

يبين الجدول رقم 109، وجود نسبة كبيرة جدا من المعطيات الناقصة بلغت المستوى

42.62% بين مجموع المعنيات، تقلل من إمكانية اعتماد المعطيات كمصدر دقيق.

#### جدول رقم 109: توزيع النساء حسب السبب الرئيسي في فشل الحمل

النسب المئوية	التكرار	f529
57.38	438	أ- الإجابات الموافقة للمجال
41.98	199	ب- الإجابات غير المحددة
0.63	3	ت- الإجابات الناقصة
42.62	202	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 31.3.2. الاستشارة لإنجاح الحمل (f530):

استهدف هذا السؤال النسوة اللاتي فشلن في الحمل رغم محاولتهن ( 474 امرأة) و تعلق

بالاستشارة قصد إنجاح الحمل، حيث شمل على المتغيرات الجزئية:

طبيب (f530a)، ممرضة أو قابلة مدربة (f530b)، صيدلي (f530c)، قابلة تقليدية (f530d)، معالج تقليدي (f530e)، عطار (f530f)، ذاتيا (f530g)، أقارب (f530h)، شخص آخر (f530i)، عدم تلقي الاستشارة (f530j). تجيب النساء على كل هذه المتغيرات بنعم أو لا. و حددت الإجابات الناقصة بالدليل 9.

سجلنا نسبة ضئيلة من المعطيات الناقصة في كل هذه المتغيرات الجزئية (0.63%) (الجدول

رقم 110) و تم إحصاء 122 حالة بين مجموع المعنيات بالسؤال لم تستشر أيا كان قصد الحمل.

جدول رقم 110: توزيع النساء حسب الاستشارة قصد المساعدة على الحمل

f530	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f530a	99.37	0.00	0.63	0.63	0.00
f530b	99.37	0.00	0.63	0.63	0.00
f530c	99.37	0.00	0.63	0.63	0.00
f530d	99.37	0.00	0.63	0.63	0.00
f530e	99.37	0.00	0.63	0.63	0.00
f530f	99.37	0.00	0.63	0.63	0.00
f530g	99.37	0.00	0.63	0.63	0.00
f530h	99.37	0.00	0.63	0.63	0.00
f530i	99.37	0.00	0.63	0.63	0.00
f530j	99.37	0.00	0.63	0.63	0.00

32.3.2. أسباب عدم الاستشارة لإنجاح الحمل (f531):

تم استجواب اللواتي لم يطلبن الاستشارة لإنجاح الحمل ( 122 امرأة + 3 الناقصة = 125 امرأة) عن الأسباب، و ضم هذا السؤال ثمانية (08) أسباب لخصت في المتغيرات التالية:  
 f531a: لا تعتقد أن ذلك يساعد، f531b: التكلفة مرتفعة، f531c: الخدمة غير متوفرة، f531d:  
 مشغولة/ الزوج مشغول، f531e: المشكل لا يستدعي، f531f: محرجة، f531g: خائفة، f531h:  
 أخرى.

وظف الدليل 1 في حالة الإجابة بنعم و الدليل 2 عند الإجابة بلا و الدليل 9 عندما يتعلق الأمر  
 بالإجابات الناقصة.

سجلنا في مختلف المتغيرات الجزئية نسبة مهمة من المعطيات الناقصة بلغت المستوى 7.20%  
 بين مجموع المعنيات (125 امرأة)، قد تنقص من قيمة معطيات هذه المتغيرات (الجدول رقم 111).

جدول رقم 111: توزيع النساء حسب أسباب عدم الاستشارة لأجل إنجاح الحمل

f531	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f531a	92.80	0.00	7.20	7.20	0.00
f531b	92.80	0.00	7.20	7.20	0.00
f531c	92.80	0.00	7.20	7.20	0.00
f531d	92.80	0.00	7.20	7.20	0.00
f531e	92.80	0.00	7.20	7.20	0.00
f531f	92.80	0.00	7.20	7.20	0.00
f531g	92.80	0.00	7.20	7.20	0.00
f531h	92.80	0.00	7.20	7.20	0.00

33.3.2. قيام الأزواج بالاستشارة لإنجاح الحمل (f532):

تم سؤال النسوة اللاتي مازلن يحضن و حاولن الحمل دون جدوى ( 474 امرأة) عن مبادرة أزواجهن للوقوع في الحمل، و أعتمد الترميز التالي:  
الدليل 1: نعم، الدليل 2: لا، الدليل 8: الحالات غير المحددة، الدليل 9: الإجابات الناقصة.

سجلنا من خلال معالجة معطيات هذا السؤال 137 حالة قام الزوج بالاستشارة بغية الحمل، و يشير الجدول رقم 112 إلى نسبة معطيات ناقصة بسيطة وصلت المستوى 2.74% بين مجموع المعنيات بالسؤال (f532)، لا تؤثر سلبا على جودة المعطيات.



جدول رقم 112: توزيع النساء حسب قيام الأزواج بالاستشارة لإنجاح الحمل

النسب المئوية	التكرار	f532
97.26	461	أ- الإجابات الموافقة للمجال
2.32	11	ب- الإجابات غير المحددة
0.42	2	ت- الإجابات الناقصة
2.74	13	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

34.3.2. مصدر استشارة الأزواج لإنجاح الحمل (f533):

سئلت السيدات اللاتي استشار أزواجهن بغية الحمل ( 137 امرأة) عن مصدر تلقي هذه الاستشارة، و حددت مصادر الاستشارة بناء على المتغيرات التالية:  
 f533a: طبيب، f533b: ممرضة، f533c: صيدلي، f533d: معالج تقليدي، f533e: عشاب، f533f: أخرى مع التحديد.

وظف الترميز الآتي:

1: نعم، 2: لا، 8: الإجابات غير المحددة، 9: الإجابات الناقصة.

جدول رقم 113: توزيع النساء حسب مصادر استشارة الأزواج لإنجاح الحمل

f533	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f533a	97.81	0.00	2.19	2.19	0.00
f533b	97.81	0.00	2.19	2.19	0.00
f533c	97.81	0.00	2.19	2.19	0.00
f533d	97.81	0.00	2.19	2.19	0.00
f533e	97.81	0.00	2.19	2.19	0.00
f533f	97.81	0.00	2.19	2.19	0.00

تم تسجيل ثلاثة ( 03 ) معطيات ناقصة على مختلف المتغيرات الجزئية لهذا السؤال وافقت النسبة 2.19% من مجموع المعنيات (137 حالة).

### 35.3.2. المعانات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من: استمرار نزيف الدورة الشهرية أكثر

من سبعة أيام، كثافة النزيف بصفة غير مألوفة، صاحبته آلام حادة، عدم انتظامها  
(f534):

تم استجواب النسوة اللاتي لا زلن يحضن ( 6377 امرأة ) عن التعرض خلال الثلاثة أشهر الماضية عن احد المشاكل التالية: دوام نزيف الدورة الشهرية لأكثر من سبعة أيام، كثافة النزيف بصفة غير مألوفة، صاحبته آلام حادة، عدم انتظامها. حيث ضم هذا السؤال أربعة متغيرات:  
f534a (المعاناة من استمرار نزيف الدورة الشهرية أكثر من 7 أيام)، f534b (كثافة نزيف الدورة الشهرية بشكل غير معتاد)، f534c (صاحبت الدورة الشهرية آلام حادة)، f534d (المعاناة من عدم انتظام الدورة الشهرية).

تم تحديد إكمانيتين للإجابة عن السؤال الخاص بالمعانات خلال الثلاث أشهر الماضية من المشاكل المذكورة:

نعم بللدليل 1، لا بللدليل 2. أما المعطيات الناقصة فقد تم تحديدها بللدليل 9.

جدول رقم 114: توزيع النساء حسب المعانات خلال الثلاثة أشهر الماضية من المشاكل المذكورة

f534d		f534c		f534b		f534a		f534
%	التكرار	%	التكرار	%	التكرار	%	التكرار	
98.60	6283	98.53	6283	98.71	6295	98.78	6299	أ- الإجابات الموافقة
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	ب- الإجابات غير
1.40	94	1.47	94	1.29	82	1.22	78	ت- الإجابات الناقصة
1.40	94	1.47	94	1.29	82	1.22	78	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	ج- الإجابات غير

بعد معالجة المعطيات، سجلنا 283 مبحوثة عاشت استمرار نزيف الدورة الشهرية لأكثر من سبعة أيام و عانت 316 امرأة من مشكل كثافة نزيف الدورة الشهرية بشكل غير مألوف و تعرضت

418 حالة لآلام حادة أثناء الدورة الشهرية و لقيت 519 مبحوثة اختلال الدورة الشهرية، خلال الثلاث أشهر التي سبقت المسح.

يشير الجدول رقم 114 إلى قدر من المعطيات الناقصة لم تتجاوز نسبته عتبة 1.50%، لا يؤثر على نوعية معطيات السؤال f534.

### 36.3.2. وجود مشكل واحد على الأقل بالنظر للسؤال f534\_ (f535):

يميز هذا المتغير بين حالتين:

الأولى (الدليل 1) وجود مشكل على الأقل (إجابة واحدة أو أكثر بنعم في السؤال f534)، الثانية (الدليل 2) لا وجود لأي مشكل (كل الإجابات في السؤال f534 كانت لا (الدليل 2)).

أعطت معطيات المسح النتائج التالية:

عاشت 850 امرأة مشكل واحد على الأقل (من مشاكل السؤال f534) فيما لم تعان 5527 مبحوثة من أي مشكل خلال الثلاثة أشهر الماضية. لم يشمل هذا المتغير معطيات ناقصة.

جدول رقم 115: توزيع النساء حسب وجود مشكل على الأقل

النسب المئوية	التكرار	f535
100.00	6377	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 37.3.2. الاستشارة بغية علاج المشكلة/ المشاكل أو تلقي النصيحة (f536):

استجوبت النساء اللاتي عشن مشكل واحد على الأقل من مشاكل السؤال f534 (850 امرأة) عن ما إذا طلبن استشارة قصد علاج لمشكلة (المشاكل) التي عرفنها خلال الثلاثة أشهر الماضية أو تلقين نصائحا. و تضمن هذا السؤال المتغيرات التالية، بالنظر إلى الاستشارة:

طبيب (f536a)، ممرضة أو قابلة مدربة (f536b)، صيدلي (f536c)، قابلة تقليدية (f536d)، معالج تقليدي (f536e)، عطار (f536f)، معالجة ذاتية (f536g)، أقارب (f536h)، شخص آخر (f536i)، عدم الاستشارة (f536j).

تم تصنيف الإجابات على النحو التالي: نعم (الدليل 1)، لا (الدليل 2). أما الإجابات الناقصة فحددت بالدليل 9.

جدول رقم 116: توزيع النساء حسب طلب الاستشارة لعلاج المشاكل المبينة في السؤال f534 التي عانين منها خلال الثلاث أشهر الماضية

f536	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f536a	99.18	0.00	0.82	0.82	0.00
f536b	99.18	0.00	0.82	0.82	0.00
f536c	99.18	0.00	0.82	0.82	0.00
f536d	99.18	0.00	0.82	0.82	0.00
f536e	99.18	0.00	0.82	0.82	0.00
f536f	99.18	0.00	0.82	0.82	0.00
f536g	99.18	0.00	0.82	0.82	0.00
f536h	99.18	0.00	0.82	0.82	0.00
f536i	99.18	0.00	0.82	0.82	0.00
f536j	99.18	0.00	0.82	0.82	0.00

من خلال معالجة معطيات هذه المتغيرات الجزئية، لاحظنا بعض المعطيات الناقصة وفق النسبة 0.82% بين مجموع المعنيات (850 مبحوثة). و سجلنا 411 امرأة لم تقم بمتابعة المشكلة/ المشاكل التي عانت منها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

### 38.3.2. أسباب عدم الاستشارة (f537):

خص هذا السؤال من الاستمارة النساء اللاتي لم يتابعن المشاكل ( 411 امرأة + 7 حالات غير مبينة). لتحديد الأسباب التي حالت دون طلب المشورة (المشاكل المطروحة في السؤال f534)، بناء على الاقتراحات التالية:

f537a: لا تعتقد أن ذلك يساعد، f537b: التكلفة مرتفعة، f537c: الخدمة غير متوفرة، f537d: مشغولة/ الزوج مشغول، f537e: المشكل لا يستدعي، f537f: مخرجة، f537g: خائفة، f537h: سن اليأس، f537i: هذه الحالة دائما، f537j: أخرى.

عولجت هذه المتغيرات الجزئية على الصيغة التالية:

نعم: الدليل 1، لا: الدليل 2، الإجابات الناقصة: الدليل 9.

بعد معالجة المعطيات، لاحظنا نسبة من ال معطيات الناقصة في كل المتغيرات الجزئية بلغت المستوى 5.50% (من بين 418 امرأة)، قد يسيء هذا القدر من النسوة غير المصنفات لجودة المعطيات العامة.

جدول رقم 117: توزيع النساء حسب أسباب عدم متابعة المشكلة (المشاكل)

f537	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f537a	94.50	0.00	5.50	5.50	0.00
f537b	94.50	0.00	5.50	5.50	0.00
f537c	94.50	0.00	5.50	5.50	0.00
f537d	94.50	0.00	5.50	5.50	0.00
f537e	94.50	0.00	5.50	5.50	0.00
f537f	94.50	0.00	5.50	5.50	0.00
f537g	94.50	0.00	5.50	5.50	0.00
f537h	94.50	0.00	5.50	5.50	0.00
f537i	94.50	0.00	5.50	5.50	0.00
f537j	94.50	0.00	5.50	5.50	0.00

### 39.3.2. المكان المعتاد لتلقي الرعاية الصحية (f538):

تم استجواب كل وحدات العينة ( 7399 امرأة) عن مكان تلقي الرعاية الصحية ، حيث صيغ السؤال على النحو التالي: عندما تكون لديك مشكلة صحية وتحتاجين إلى تلقي رعاية أين تذهبين عادة لطلب الخدمة؟

وظفت 8 مداليل لحصر مختلف الفئات:

- 1 (مستشفى/ مركز أمومة) ، 2 (مصحة متعددة الخدمات/ مركز صحي)، 3 (مصحة خاصة)،
- 4 (طبيب خاص)، 5 (في المنزل)، 6 (أخرى)، 8 (لا تعرف/ غير متأكدة)، 9 (الإجابات الناقصة).

جدول رقم 118: توزيع النساء حسب مكان تلقي الرعاية الصحية عادة

النسب المئوية	التكرار	f538
98.77	7308	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.93	69	ب- الإجابات غير المحددة
0.30	22	ت- الإجابات الناقصة
1.23	91	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يشير الجدول رقم 118 إلى نسبة بسيطة من المعطيات الناقصة بلغت المقدار 1.23% من مجموع وحدات العينة (7399 امرأة).

### 40.3.2. العوامل المعيقة لتلقي الرعاية الطبية و درجتها (f539):

هنالك عوامل كثيرة قد تعيق طلب الرعاية الطبية أو العلاج، لحصرها طرح السؤال التالي على 7399 امرأة: عندما تكونين مريضة وتريدين تلقي الرعاية الطبية أو العلاج، هل تشكل العوامل التالية لك عائق كبيراً أم لا؟

معرفة وجهة الذهاب (f539a)، الحصول على الإذن للذهاب؟ (f539b)، الحصول على المال للكشف والعلاج؟ (f539c)، بعد المسافة إلى مركز الصحة؟ (f539d)، ضرورة ركوب المواصلات؟ (f539e)، عدم الرغبة في الذهاب بمفردك؟ (f539f)، عدم وجود نسوة تقدمن الرعاية؟ (f539g).

في كل من هذه الأسئلة الجزئية اعتمد الترميز التالي:

الدليل 1: تشكل عائقا كبيرا، الدليل 2: لا تشكل عائقا كبيرا، الدليل 3: لا تشكل عائق، الدليل 9: الإجابات الناقصة.

جدول رقم 119: توزيع النساء حسب عوامل إعاقتهن في تلقي الرعاية الطبية

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	f539
0.00	0.07	0.07	0.00	99.93	f539a
0.00	0.12	0.12	0.00	99.88	f539b
0.00	0.11	0.11	0.00	99.89	f539c
0.00	0.12	0.12	0.00	99.88	f539d
0.00	0.11	0.11	0.00	99.89	f539e
0.00	0.08	0.08	0.00	99.92	f539f
0.00	0.08	0.08	0.00	99.92	f539g

يشير الجدول رقم 119 إلى نسبة بسيطة من المعطيات الناقصة مهما كان المتغير الجزئي لم تتجاوز عتبة 0.20% من مجموع المعنيات.

#### 4.2. محور مرض الإيدز (السيدا) والأمراض الأخرى المنقولة جنسيا:

في هذا القسم من الاستمارة تم تخصيص 16 سؤالا لاستفسار النساء عن مرض الإيدز (السيدا) و الأمراض الأخرى المنقولة جنسيا.

#### 1.4.2. المعرفة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (f601):

تم استجواب النسوة (7399 امرأة)، عن ما إذا سبق لهن و سمعن عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. تم ترميز الإجابة 'نعم' بالدليل 1، و الإجابة 'لا' بالدليل 2، و الإجابات الناقصة بالدليل 9.

جدول رقم 120: توزيع النساء حسب المعرفة السابقة بالأمراض المتنقلة عن طريق الاتصال الجنسي

النسب المئوية	التكرار	f601
99.96	7396	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.04	3	ت- الإجابات الناقصة
0.04	3	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد معالجة معطيات هذا المتغير، تبين أن 5009 مبحوثة سبق لها و سمعت عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، و نسبة معطيات ناقصة ضئيلة بلغت 0.04% من المجموع.

#### 2.4.2. المعرفة بالأمراض المنقولة جنسيا (f602):

تطرق السؤال لمعرفة النساء (5009 امرأة) بالأمراض المتنقلة عن طريق الاتصال الجنسي، و تعددت المتغيرات الجزئية حسب الأمراض التالية:  
السفلي/ الزهري (f602a)، السيلان (f602b)، الفطار (f602c)، الإيدز/ السيدا (f602d)، أخرى مع التحديد (f602e).

وظف الدليل 1 في حالة التعرف التلقائي بالمرض و الدليل 2 في حالة التعرف عليه بعد التفصي و الدليل 3 للاتي لم يتعرفن على المرض و أخذ المتغير القيمة 9 في حالة المعطيات الناقصة.



جدول رقم 121: توزيع النساء حسب معرفتهن بالأمراض المنقولة جنسيا

f602	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f602a	99.48	0.00	0.52	0.52	0.00
f602b	99.42	0.00	0.58	0.58	0.00
f602c	99.32	0.00	0.68	0.68	0.00
f602d	99.94	0.00	0.06	0.06	0.00
f602e	94.73	0.00	5.27	5.27	0.00

سجلنا معطيات ناقصة بسيطة على كل المتغيرات الجزئية في هذا السؤال ماعدا المتغير الجزئي f602e الذي بلغت نسبة معطياته الناقصة المقدار 5.27% من مجموع المستجوبات (الجدول رقم 121).

3.4.2. إصابة النساء بالأمراض المنقولة جنسيا خلال الإثني عشر شهرا

الماضية (f603):

استجوبت النساء (كل وحدات العينة: 7399 امرأة) عن الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي خلال 12 شهرا الأخيرة. احتوى هذا السؤال على أربعة متغيرات جزئية لخصت حسب الأمراض التالية:  
السفلس (الزهري): f603a، السيلان: f603b، الفطار: f603c، أمراض أخرى منقولة جنسيا: f603d.

استخدم الدليل 1 في حالة الإجابة بنعم، الدليل 2 في حالة الإجابة بلا، الدليل 8 في حالة الإجابات غير المحددة، الدليل 9 في حالة الإجابات الناقصة (في كل المتغيرات الجزئية).

جدول رقم 122: توزيع النساء حسب الإصابة بالأمراض المتنقلة جنسيا خلال 12 شهرا الأخيرة

f603	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f603a	90.96	9.26	0.08	9.34	0.00
f603b	90.20	9.73	0.07	9.80	0.00
f603c	90.20	9.72	0.08	9.80	0.00
f603d	89.07	10.34	0.59	10.93	0.00

يشير الجدول رقم 122 إلى معطيات ناقصة مهمة فاقت عشر (10/1) المعطيات (f603d):  
10.93%)، قد تنقص من قيمة المعطيات.

#### 4.4.2. الإصابة بمرض أو أكثر حسب الحالة الزوجية (متزوجة حاليا، غير متزوجة

حاليا) بالنظر للسؤالين f124 و f603 (f604):

أدرج هذا السؤال للتمييز بين ثلاث فئات من النساء، تمثل الفئة الأولى (الدليل 1) النسوة اللاتي أصبن بأحد الأمراض المتنقلة جنسيا أو أكثر، وتشمل الفئة الثانية (الدليل 2) النساء اللواتي لم يصبن بأي من تلك الأمراض و هن متزوجات حاليا (متزوجة، منفصلة)، و ضمت الفئة الثالثة (الدليل 3) النسوة اللاتي لم يصبن بأي من الأمراض المتنقلة جنسيا و هن غير متزوجات حاليا (مطلقة، أرملة) و ذلك بالنظر لمعطيات السؤالين f124 و f603(a,b,c,d). لم يشمل هذا السؤال أي معطيات ناقصة.

توزعت الإجابات على هذا السؤال على النحو التالي:

إصابة 118 امرأة بمرض أو أكثر و 6752 حالة لم تصب بأي مرض و هي متزوجة حاليا (متزوجة/منفصلة) و 529 امرأة لم تتعرض للإصابة بأي مرض و هي ليست متزوجة حاليا (أرملة/مطلقة).

جدول رقم 123: توزيع النساء وفق الإصابة بمرض أو أكثر حسب الحالة الزوجية (متزوجة حالياً، ليست متزوجة حالياً)

النسب المئوية	التكرار	f604
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

#### 5.4.2. الاستشارة لعلاج الأمراض المنقولة جنسياً أو لتلقي النصيحة عنها (f605):

استجوبت النسوة اللاتي أصبن بمرض أو أكثر ( 118 امرأة) عن الاستشارة قصد علاج الأمراض المنقولة جنسياً التي أصبن بها خلال الإثنى عشر شهراً الماضية. تعددت المتغيرات الجزئية لهذا المتغير حسب مصدر الاستشارة على النحو التالي:

عند طبيب (f605a)، لدى ممرضة/ قابلة مدربة (f605b)، من قبل صيدلي (f605c)، من طرف قابلة تقليدية (f605d)، عند معالج تقليدي (f605e)، استشارة عطار/ عشاب (f605f)، المعالجة الذاتية (f605g)، من أقارب (f605h)، عن شخص آخر مع التحديد (f605i)، عدم تلقي الاستشارة (f605j). و تم تحديد الإجابة 'نعم' بالدليل 1 و الإجابة 'لا' بالدليل 2 أما الإجابات الناقصة فعرفت بالدليل 9.

يشير الجدول رقم 124 إلى نسبة بسيطة من المعطيات الناقصة بلغت المستوى 2.54% من مجموع المعنيات بهذا السؤال (في كل المتغيرات الجزئية).

و حسب معطيات المسح، لم تقم 26 امرأة تعرضت للإصابة بمرض أو أكثر (الأمراض المنقولة جنسياً) خلال الإثنى عشر شهراً الماضية بالمتابعة الطبية.

جدول رقم 124: توزيع النساء حسب الاستشارة لعلاج الأمراض أو لتلقي النصيحة عنها

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	f605
0.00	2.54	2.54	0.00	97.46	f605a
0.00	2.54	2.54	0.00	97.46	f605b
0.00	2.54	2.54	0.00	97.46	f605c
0.00	2.54	2.54	0.00	97.46	f605d
0.00	2.54	2.54	0.00	97.46	f605e
0.00	2.54	2.54	0.00	97.46	f605f
0.00	2.54	2.54	0.00	97.46	f605g
0.00	2.54	2.54	0.00	97.46	f605h
0.00	2.54	2.54	0.00	97.46	f605i
0.00	2.54	2.54	0.00	97.46	f605j

#### 6.4.2. أسباب عدم المتابعة الطبية للأمراض المنقولة جنسياً (f606):

تم بحث النسوة اللاتي أصبن بمرض أو أكثر و لم يقمن بالمتابعة الطبية (29 امرأة: 26 امرأة لم يتابعن المرض + 3 إجابات ناقصة) عن أسباب عدم المتابعة الطبية للأمراض المنقولة جنسياً التي أصبن بها خلال الإثنى عشر شهراً الأخيرة. توزعت المتغيرات الجزئية وفق الأسباب التالية: لا تعتقد أن ذلك يساعد: f606a، التكلفة مرتفعة: f606b، الخدمة غير متوفرة: f606c، مشغولة أو الزوج مشغول: f606d، المشكل لا يستدعي: f606e، محرجة: f606f، خائفة: f606g، أخرى: f606h.

وظف الدليل 1 في حالة الإجابة نعم و الدليل 2 إذا كانت الإجابة لا. أما الإجابات الناقصة فتم

ترميزها بالدليل 9.

بعد معالجة معطيات هذا المتغير، سجلنا معطيات ناقصة هامة تجاوزت نسبتها عشر (10/1) المعطيات (10.34% في مختلف المتغيرات الجزئية)، قد تسيء لجودة المعطيات.

جدول رقم 125: توزيع النساء حسب أسباب عدم المتابعة الطبية للأمراض المنقولة جنسيا

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	f606
0.00	10.34	10.34	0.00	89.66	f606a
0.00	10.34	10.34	0.00	89.66	f606b
0.00	10.34	10.34	0.00	89.66	f606c
0.00	10.34	10.34	0.00	89.66	f606d
0.00	10.34	10.34	0.00	89.66	f606e
0.00	10.34	10.34	0.00	89.66	f606f
0.00	10.34	10.34	0.00	89.66	f606g
0.00	10.34	10.34	0.00	89.66	f606h

7.4.2. الحالة الزوجية الحالية للنساء المصابات (بمرض أو أكثر) بالنظر للسؤال f124  
:(f607)

وظف هذا السؤال لتمييز النسوة المصابات بمرض أو أكثر من الأمراض المتنتلة جنسيا خلال الإثنى عشر شهرا الماضية (118 امرأة). تم حصر فئتين:  
الفئة 1: متزوجة حاليا (متزوجة، منفصلة)، الحالة 2: غير متزوجة حاليا (مطلقة، أرملة).

لم يشمل هذا المتغير على معطيات ناقصة. و سجلنا من خلال المعالجة 115 متزوجة حاليا، و ثلاثة (03) غير متزوجات.

جدول رقم 126: توزيع النساء المصابات بمرض أو أكثر حسب الحالة الزوجية الحالية

النسب المئوية	التكرار	f607
100.00	118	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

#### 8.4.2. ذهاب الأزواج للاستشارة أو لعلاج نفس المرض (f608):

استجوبت المتزوجات حالياً المصابات بمرض أو أكثر من الأمراض المتنقلة جنسياً خلال 12 شهراً الأخيرة (115 امرأة)، عن ذهاب أزواجهن للاستشارة أو لتلقي علاج نفس المرض الذي تعرضن له. ولهذا الغرض تم اعتماد الترميز التالي:

الدليل 1 بالنسبة للاتي ذهب أزواجهن للاستشارة أو لتلقي العلاج و الدليل 2 بالنسبة للاتي لم يستشر أزواجهن عن المرض و الدليل 3 بالنسبة للواتي لم يعلم أزواجهن بالمرض و حدد الدليل 8 اللاتي لا يعرفن. أما الإجابات الناقصة فعرفت بالدليل 9.

بعد المعالجة، أحصينا 28 امرأة ذهب أزواجهن للاستشارة و 78 مبحوثة لم يقم الأزواج بالاستشارة و 05 نساء لم يعلمن أزواجهن بمرضهن. كما سجلنا معطيات ناقصة بنسبة قدرها 3.48% بين مجموع المعنيات.

جدول رقم 127: توزيع النساء حسب ذهاب الأزواج للاستشارة عن نفس المرض

النسب المئوية	التكرار	f608
96.52	111	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
3.48	4	ت- الإجابات الناقصة
3.48	4	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 9.4.2. إصابة الزوج بأي من الأمراض المنقولة جنسيا خلال الإثنى عشر شهرا

الأخيرة (f609):

تم استجواب المتزوجات حاليا ( 6867 زوجة)، عن إصابة أزواجهن بأي من الأمراض المتنتقلة عن طريق الاتصال الجنسي خلال الإثنى عشر شهرا الماضية، وظف الدليل 1 عند الإجابة بنعم و الدليل 2 في حالة الإجابة بلا و الدليل 8 عند الإجابات غير المحددة و أخذ المتغير القيمة 9 في حالة الإجابات الناقصة.

جدول رقم 128: توزيع النساء حسب إصابة الزوج بأي من الأمراض المنقولة جنسيا خلال 12 شهرا

الماضية

النسب المئوية	التكرار	f609
97.15	6671	أ- الإجابات الموافقة للمجال
2.46	169	ب- الإجابات غير المحددة
0.39	27	ت- الإجابات الناقصة
2.85	196	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

تم تسجيل 34 امرأة أصيب أزواجهن بأحد الأمراض المتنتقلة عن طريق الاتصال الجنسي خلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة و معطيات ناقصة بلغت نسبتها 2.85% من مجموع المبحوثات، لا تؤثر في نوعية المعطيات.

## 10.4.2. ذهاب الزوج للاستشارة أو العلاج (f610):

سئلت النساء ( 34 امرأة اللاتي أصيب أزواجهن بمرض من الأمراض (المذكورة في

(f603a,b,c,d)، عن ذهاب أزواجهن للاستشارة أو العلاج. تم اعتماد نفس الترميز السابق.

تبين بعد معالجة معطيات هذا المتغير، وجود 21 حالة ذهب زوجها للاستشارة أو العلاج. كما يضم الجدول رقم 129 معطيات ناقصة مهمة بلغت نسبتها 5.88% من مجموع المعنيات، قد تسيء لجودة المعطيات.

## جدول رقم 129: ذهاب الزوج من أجل الاستشارة أو العلاج

النسب المئوية	التكرار	f610
94.12	32	أ- الإجابات الموافقة للمجال
2.94	1	ب- الإجابات غير المحددة
2.94	1	ت- الإجابات الناقصة
5.88	2	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 11.4.2. تلقي المرأة أي نصيحة أو علاج لنفس المرض عند إصابة الزوج (f611):

تم استجواب النسوة (34 امرأة اللاتي أصيب أزواجهن بمرض من الأمراض المتنقلة جنسيا) عن تلقيها أي نصيحة أو علاج لنفس المرض. تم ترميز الإجابة 'نعم' بالدليل 1 و الإجابة 'لا' بالدليل 2. أما الإجابات الناقصة فعرفت بالدليل 9.

## جدول رقم 130: توزيع النساء حسب تلقي المرأة أي نصيحة أو علاج لنفس المرض عندما أصيب به

زوجها

النسب المئوية	التكرار	f611
88.24	30	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
11.76	4	ت- الإجابات الناقصة
11.76	4	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد المعالجة، تم إحصاء 16 حالة تلقت نصيحة لعلاج المرض الذي أصيب به الزوج و تم تسجيل نسبة كبيرة من المعطيات الناقصة على هذا المتغير بلغت 11.76% من مجموع المعنيات، قد تنقص من قيمة المعطيات.



## 12.4.2. معرفة النساء لمرض الإيدز بالنظر للسؤال f602d\_f612):

صنفت النساء ( 7399 امرأة: كل وحدات العينة) حسب معرفتهن لمرض الإيدز (السيدا) وذلك بالنظر للسؤال f602. ميز الدليل 1 اللاتي يعرفن الإيدز (السيدا) و حدد الدليل 2 اللواتي لا يعرفن الإيدز (السيدا). لم يشمل المتغير معطيات ناقصة.

حسب معطيات المسح، سجلنا 4965 مبحوثة أدلت بمعرفتها لمرض الإيدز (السيدا) و 2434 امرأة لا تعرفه.

جدول رقم 131: توزيع النساء حسب معرفتهن لمرض الإيدز بالنظر للمتغير f602d

النسب المئوية	التكرار	f612
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 13.4.2. المصادر الإعلامية التي تلقت منها المبحوثات أكبر قدر من المعلومات عن

### مرض الإيدز (f613):

تم استجواب النسوة اللاتي يعرفن مرض فقدان المناعة المكتسبة ( 4965 امرأة) عن المصادر الإعلامية التي تلقين منها أكبر قدر من المعلومات عن مرض السيدا. ضم هذا المتغير 11 متغيرا جزئيا وفق المصادر الإعلامية على الشكل التالي:

الراديو ( f613a)، التلفزيون ( f613b)، الصحف/المجلات ( f613c)، الكتيبات/الملصقات (f613d)، مرشدين صحيين (f613e)، المساجد/الكنائس (f613f)، المدارس/الأساتذة (f613g)، اجتماعات المنطقة (f613h)، أصدقاء/أقارب ( f613i)، مكان العمل ( f613j)، أخرى مع التحديد (f613k).

صنفت الإجابات في مختلف المتغيرات الجزئية على النحو التالي:

نعم: الدليل 1، لا: الدليل 2، و الإجابات الناقصة: الدليل 9.

جدول رقم 132: توزيع النساء حسب المصادر الإعلامية التي تلقين منها أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	f613
0.00	0.26	0.26	0.00	99.74	f613a
0.00	0.26	0.26	0.00	99.74	f613b
0.00	0.26	0.26	0.00	99.74	f613c
0.00	0.26	0.26	0.00	99.74	f613d
0.00	0.26	0.26	0.00	99.74	f613e
0.00	0.26	0.26	0.00	99.74	f613f
0.00	0.26	0.26	0.00	99.74	f613g
0.00	0.26	0.26	0.00	99.74	f613h
0.00	0.26	0.26	0.00	99.74	f613i
0.00	0.26	0.26	0.00	99.74	f613j
0.00	0.26	0.26	0.00	99.74	f613k

بعد المعالجة، سجلنا في مختلف المتغيرات الجزئية المتعلقة بهذا السؤال معطيات ناقصة بسيطة لا تؤثر على جودة المعطيات، حيث بلغت نسبتها المقدار 0.26% من مجموع المستجوبات.

#### 14.4.2. معرفة النسوة للوسائل التي تمكن المرء من الإصابة بالإيدز (f614):

استجوبت النسوة (4965 امرأة اللواتي يعرفن مرض الإيدز) عن الكيفية التي تمكن المرء من الإصابة بالإيدز. توزعت المتغيرات الجزئية حسب الطرق التي تمكن من الإصابة بالإيدز كالاتي:  
 f614a: الاتصال الجنسي، f614b: عدم استخدام الواقي الذكري، f614c: نقل الدم،  
 f614d: الحقن، f614e: لسعات البعوض، f614f: أخرى.

تم تبني الترميز التالي في كل المتغيرات الجزئية:  
1: نعم، 2: لا، 8: الإجابات غير المحددة، 9: الإجابات الناقصة.

جدول رقم 133: توزيع النساء حسب معرفتهن للوسائل التي تمكن المرء من الإصابة بالإيدز

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	f614
0.00	9.06	0.30	8.76	90.94	f614a
0.00	9.06	0.30	8.76	90.94	f614b
0.00	9.06	0.30	8.76	90.94	f614c
0.00	9.06	0.30	8.76	90.94	f614d
0.00	9.06	0.30	8.76	90.94	f614e
0.00	9.06	0.30	8.76	90.94	f614f

تم تسجيل نسبة كبيرة من المعطيات الناقصة بلغت المستوى 9.06% بين مجموع الإجابات، قد تسيء لنوعية المعطيات.

#### 15.4.2. معرفة النساء لإمكانية قيام المرء بشيء يجنبه الإصابة بالإيدز (f615):

استفسرت النساء ( 4965 امرأة اللواتي يعرفن مرض الإيدز) عن إمكانية تجنب الإصابة بالإيدز (السيدا)، و رمزت الإجابات على النحو التالي:

نعم: الدليل 1، لا: الدليل 2، الإجابات غير المحددة: الدليل 8، الإجابات الناقصة: الدليل 9.

بعد المعالجة، صرحت 4145 مستجوبة بإمكانية تجنب الإصابة بالإيدز، و يشير الجدول رقم 134 لوجود معطيات ناقصة معتبرة بلغت المقدار 12.41% من مجموع الإجابات، حيث تمثل قسط كبير من البيانات، يمكنها من الإساءة لجودة معطيات هذا المتغير.

جدول رقم 134: توزيع النساء حسب معرفتهن بإمكانية تجنب الإصابة بالإيدز

النسب المئوية	التكرار	f615
87.59	4349	أ- الإجابات الموافقة للمجال
12.19	605	ب- الإجابات غير المحددة
0.22	11	ت- الإجابات الناقصة
12.41	616	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

#### 16.4.2. معرفة النسوة لوسائل تجنب الإصابة بالإيدز (f616):

تم استجواب النسوة (4145 امرأة اللاتي اجبن بنعم في السؤال f615) عن الطرق التي تجنب المرء من الإصابة بالإيدز (السيدا). حددت المتغيرات الجزئية الوسائل المقترحة في الاستمارة على النحو التالي:

الممارسة الجنسية الآمنة (f616a)، استخدام الواقي الذكري (f616b)، تجنب نقل الدم (f616c)، تجنب الحقن (f616d)، وسائل أخرى (f616e).

وظف الدليل 1: في حالة الإجابة بنعم و الدليل 2: لما تكون الإجابة بلا و الدليل 8: عند الإجابات غير المحددة. أما الإجابات الناقصة فعرفت بالرمز 9. (في كل المتغيرات الجزئية للسؤال).

جدول رقم 135: توزيع النساء حسب معرفة الطرق التي تجنب المرء من الإصابة بالإيدز

f616	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f616a	99.35	0.53	0.12	0.65	0.00
f616b	99.35	0.53	0.12	0.65	0.00
f616c	99.35	0.53	0.12	0.65	0.00
f616d	99.35	0.53	0.12	0.65	0.00
f616e	99.35	0.53	0.12	0.65	0.00

نلاحظ من خلال الجدول رقم 135 وجود معطيات ناقصة بسيطة قدرها 0.65% من مجموع الإجابات مهما كان المتغير الجزئي، لا تؤثر في مصداقية المعطيات.

## 5.2. قسم تنظيم الأسرة و اتجاهات الإنجاب:

خصص في هذا القسم من الاستمارة 45 سؤالاً، استجوبت من خلالها النساء عن بعض جوانب المختلفة لتنظيم الأسرة و اتجاهات الإنجاب.

### 1.5.2. تصنيف النساء بالنظر إلى أسباب عدم تتويج الحمل (f700):

تم تصنيف النساء (7399 امرأة) حسب إجابات السؤال بالنظر إلى أسباب عدم تتويج الحمل إلى فئتين:

الفئة الأولى: الدليل 1: في هذه الحالة يأخذ السؤال f529 القيم: 1 (سن اليأس)، 2 (عقيمة)، 4 (الزوج مريض/عقيم).

الفئة الثانية: الدليل 2: يأخذ السؤال f529 القيم: 3 (مريضة)، 6 (أسباب أخرى)، 8 (لا تعرف أو لا توجد إجابة).

بعد معالجة معطيات المتغير f700، أحصينا 79 امرأة من الفئة الأولى، و سجلنا 7320 امرأة من الفئة الثانية. وهي الفئة المستهدفة بأسئلة هذا المحور.

### جدول رقم 136: توزيع النساء بالنظر للسؤال المتعلق بسبب عدم نجاح الحمل (f529)

النسب المئوية	التكرار	f700
100.00	7399	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 2.5.2. استعمال وسائل تأخير أو منع الحمل في السابق (f701):

سئلت المعنيات (7320 امرأة، الفئة الثانية في السؤال السابق) عن الوسائل والطرق المختلفة التي يمكن استخدامها لتأخير أو منع الحمل و عن ما إذا سبق و أن استعملت أي شيء أو حاولت بأي طريقة أن تؤخر أو تمنع نفسها عن الحمل. لهذا الغرض أعتمد الترميز الآتي:

الدليل 1 عند الإجابة بنعم ، الدليل 2 عند الإجابة بلا، و الرمز 9 للدلالة على الإجابات الناقصة.

جدول رقم 137: توزيع النساء حسب استعمالهن السابق لوسائل تأخير أو منع الحمل

النسب المئوية	التكرار	f701
99.66	7295	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.34	25	ت- الإجابات الناقصة
0.34	25	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بينت معطيات المسح استعمال 5659 امرأة لوسائل و طرق منع أو تأخير الحمل و نسبة معطيات ناقصة بسيطة عند المقدار 0.34% بين المعنيات.

### 3.5.2. استعمال موانع الحمل (f702):

تم استجواب المستعملات (5659 امرأة) عن هذه الوسائل. ضم هذا السؤال المتغيرات الجزئية التالية:

f702a: الحبوب، f702b: اللولب، f702c: الحقن، f702d: الغرز، f702e: العازل الواقي للرجل، f702f: العازل الواقي للمرأة، f702g: الحاجز المهبلي، f702h: المرهم أو الكريم الموضعي، f702i: ربط الأنابيب الرحمية، f702j: التعقيم، f702k: إطالة فترة الرضاعة الطبيعية، f702l: فترة الأمان، f702m: العزل، f702n: أخرى مع التحديد.

في كل سؤال جزئي، نحدد ثلاث فئات: المستعملات (الدليل 1)، غير المستعملات (الدليل 2) و غير العارفات بالوسيلة (الدليل 8). و وظيف الدليل 9 لتمييز الإجابات الناقصة.

يشير الجدول رقم 138 إلى معطيات ناقصة بسيطة لم تتجاوز نسبتها 1.00% (إلا في حالة واحدة، f702n: 2.33%)، لا يمكنها أن تؤثر في جودة البيانات.

جدول رقم 138: توزيع النساء حسب استعمال وسائل منع أو تأخير الحمل

ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت) %	ت- الإجابات الناقصة %	ب- الإجابات غير المحددة %	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	f702
0.00	0.02	0.02	0.00	99.98	f702a
0.00	0.48	0.48	0.00	99.52	f702b
0.00	0.60	0.60	0.00	99.40	f702c
0.00	0.95	0.95	0.00	99.05	f702d
0.00	0.69	0.69	0.00	99.31	f702e
0.00	0.62	0.62	0.00	99.38	f702f
0.00	0.67	0.67	0.00	99.33	f702g
0.00	0.76	0.76	0.00	99.24	f702h
0.00	0.64	0.64	0.00	99.36	f702i
0.00	0.85	0.85	0.00	99.15	f702j
0.00	0.88	0.88	0.00	99.12	f702k
0.00	0.69	0.69	0.00	99.31	f702l
0.00	0.81	0.81	0.00	99.19	f702m
0.00	2.33	2.33	0.00	97.67	f702n

4.5.2. عدد الأبناء الأحياء إن وجدوا حين استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أول مرة

:(f703)

استجوبت المستعملات استعملن لوسائل تأخير أو منع الحمل ( 5659 امرأة) عن عدد أطفالهن الأحياء (إن وجدوا) عند الاستخدام لأول مرة. خصصت خانتان (لتسجيل عدد الأطفال) و وظف الرمز 98 عندما تكون الإجابات غير محددة و الدليل 99 عند الإجابات الناقصة.

بعد معالجة معطيات هذا المتغير، سجلنا نسبة بسيطة من المعطيات الناقصة بلغت 0.39% بين مجموع المعنويات.

جدول رقم 139: توزيع النساء حسب عدد الأبناء الأحياء حين استخدام وسيلة تنظيم الأسرة لأول مرة

النسب المئوية	التكرار	f703
99.61	5637	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.32	18	ب- الإجابات غير المحددة
0.07	4	ت- الإجابات الناقصة
0.39	22	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 5.5.2. غاية استخدام وسيلة تنظيم الأسرة لأول مرة (f704a):

سئلت النساء اللاتي استعملن وسائل تنظيم الأسرة (5659 امرأة) عن الهدف من استعمال هذه الوسائل (الرغبة في إنجاب طفل آخر لكن بعد فترة، الرغبة في التوقف عن الإنجاب كلية)، بحيث لخصت الإجابات على الشكل الآتي:

الدليل 1: الراغبات في إنجاب طفل آخر لكن بعد فترة، الدليل 2: الراغبات في التوقف عن الإنجاب، الدليل 6: المستعملات لأسباب أخرى (مع التحديد)، الدليل 9: في حالة الإجابات الناقصة.

جدول رقم 140: توزيع النساء حسب سبب استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أول مرة

النسب المئوية	التكرار	f704a
98.39	5568	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.61	91	ت- الإجابات الناقصة
1.61	91	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

سجلنا 4926 راغبة في الإنجاب بعد فترة، و 595 راغبة في التوقف كلية عن الإنجاب، فيما أرجعت 47 امرأة استعمال وسيلة منع الحمل لأسباب أخرى. يشير الجدول رقم 363 إلى نسبة معطيات ناقصة بسيطة وصلت إلى 1.61% بين مجموع المبحوثات.



## 6.5.2. استعمال الحبوب، الحقن، الغرس بالنظر للسؤال f702 (f704b):

ارتبط السؤال باستعمال المرأة للحبوب، الحقن أو الغرس. لهذا الغرض تم اعتماد الترميز

التالي:

الدليل 1: "نعم" ( الحبوب أو الحقن أو الغرس)، الدليل 2: "لا" أو "لا تعرف" (الحبوب أو الحقن أو الغرس). لم يشمل هذا المتغير أي معطيات ناقصة.

بهذا الشكل تم تصنيف النسوة إلى فئتين: الأولى و تمثل المستعملات لإحدى الوسائل. تتكون هذه الفئة من 5423 امرأة، الثانية و تمثل غير المستعملات أو اللاتي لا يعرفن هذه الوسائل ( 236 امرأة).

جدول رقم 141: توزيع النساء حسب استعمال الحبوب، الحقن، الغرس

النسب المئوية	التكرار	f704b
100.00	5659	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 7.5.2. عدد سنوات استعمال وسائل منع حمل المشتملة على هرمونات (الحبوب، الحقن،

الغرس) (f704c):

سئلت النسوة المستعملات للحبوب أو الحقن أو الغرس ( 5423 امرأة) عن عدد سنوات الاستعمال، و لخصت الإجابة في خانتين. وظف الدليل 0 إذا قلت المدة عن سنة و الرمز 40 إذا كانت المدة 40 سنة أو أكثر و الدليل 98 في حالة الإجابات غير المحددة و اخذ المتغير القيمة 99 في حالة الإجابات الناقصة.

بعد المعالجة، أحصينا نسبة من المعطيات الناقصة بلغت 3.56% من مجموع المعطيات.

جدول رقم 142: توزيع النساء حسب عدد سنوات استعمال وسائل منع حمل المشتملة على هرمونات

النسب المئوية	التكرار	f704c
96.44	5230	أ- الإجابات الموافقة للمجال
2.90	157	ب- الإجابات غير المحددة
0.66	36	ت- الإجابات الناقصة
3.56	193	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 8.5.2. الحالة الزوجية الحالية بالنظر للسؤال f124 (f705):

صنفت النسوة حسب هذا المتغير إلى:

متزوجة حالياً (متزوجة/ منفصلة): الدليل 1، غير متزوجة حالياً (مطلقة/ أرملة): الدليل 2.

أعطت المعالجة 5391 امرأة متزوجة حالياً (متزوجة/ منفصلة)، و 268 امرأة غير متزوجة حالياً (مطلقة/ أرملة).

### جدول رقم 143: توزيع النساء حسب الحالة الزوجية الحالية بالنظر للسؤال f124

النسب المئوية	التكرار	f705
100.00	5659	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 9.5.2. الحالة الحالية للحمل بالنظر للسؤال f242 (f706):

تم تصنيف النسوة المتزوجات حالياً ( 5391 امرأة) بالنظر إلى السؤال f242 (الوضعية بالنظر للحمل). خص الدليل 1 حالة عدم الحمل/ أو عدم التأكد منه، و الدليل 2 حالة الحمل حالياً. لم يشمل هذا المتغير معطيات ناقصة.

جدول رقم 144: توزيع النساء بالنظر للسؤال f242 (بالنظر إلى الحمل)

النسب المئوية	التكرار	f706
100.00	5391	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

سجلنا 4963 امرأة ليست حامل حاليا أو غير متأكدة من حملها و 428 امرأة حامل عند

الملاحظة.

10.5.2. استعمال المرأة أو الزوج لأي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة لتجنب الحمل

:(f707)

تم استجواب المعنيات (4963 متزوجة و غير حامل حاليا) عن استعمالهن أو أزواجهن لأي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة لتجنب الحمل، و تم تحديد حالتين على النحو التالي:  
نعم: الدليل 1، لا: الدليل 2، لم يشمل هذا المتغير أي معطيات ناقصة.

أعطت معطيات المسح 3726 حالة مستعملة (أو الزوج مستعملا) لوسائل تنظيم الأسرة.

جدول رقم 145: توزيع النساء حسب استعمال المرأة أو الزوج لأي من وسائل تنظيم الأسرة لتجنب

الحمل

النسب المئوية	التكرار	f707
100.00	4963	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 11.5.2. وسيلة منع الحمل المستعملة (f708a):

تم سؤال النسوة اللاتي يستعملن وسائل منع الحمل ( 3726 امرأة) عن الوسيلة المستعملة لتنظيم الأسرة و تجنب الحمل، لهذا الغرض اعتمد الترميز الموالي:

الحبوب: الدليل 01، اللولب: الدليل 02، الحقن: الدليل 03، الغرز: الدليل 04، العازل الواقي للرجل: الدليل 05، العازل الواقي للمرأة: الدليل 06، الحاجز المهبلي للمرأة: الدليل 07، المرهم أو الكريم الموضعي: الدليل 08، ربط الأنابيب الرحمية: الدليل 09، التعقيم للرجال: الدليل 10، إطالة فترة الرضاعة الطبيعية: الدليل 11، فترة الأمان: الدليل 12، العزل: الدليل 13، أخرى (مع التحديد): الدليل 96، الإجابات الناقصة: الدليل 99.

جدول رقم 146: توزيع النساء حسب وسيلة منع الحمل المستعملة

النسب المئوية	التكرار	f708a
99.87	3721	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.13	5	ت- الإجابات الناقصة
0.13	5	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يشير الجدول أعلاه إلى نسبة معطيات ناقصة قدرها 0.13% بين مجموع المستجوبات ، و للتذكير سجلنا نسبة قدرها 81.48% من المستعملات للحبوب، و 194 مستعملة للولب.

## 12.5.2. استعمال اللولب في الماضي (f708b) بالنظر للسؤالين f702 و f708a:

تم استجواب النساء اللواتي لا يستعملن اللولب حالياً ( 3726 امرأة- 194 امرأة= 3532 امرأة) عن استعمال اللولب في السابق. ووظف الدليل 1 لتحديد غير المستعملات على الإطلاق و الدليل 2 للاتي استعملته في الماضي. لم يشمل هذا المتغير أي معطيات ناقصة.

لم تستعمل 3270 امرأة اللولب على الإطلاق و استعملته 262 امرأة اللولب قبل تاريخ الملاحظة.

جدول رقم 147: استعمال اللولب في الماضي بالنظر للسؤالين f702 و f708

النسب المئوية	التكرار	f708b
100.00	3532	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 13.5.2. سبب عدم استعمال اللولب على الإطلاق (f708c):

استجوبت النساء اللاتي لم يستعملن اللولب على الإطلاق ( 3270 امرأة) عن سبب عدم الاستعمال. وضع الدليل 1 في حالة عدم الارتياح للوسيلة ، الدليل 2 في حالة الخوف من الأعراض الجانبية، الدليل 3 في حالة اعتراض الزوج، الدليل 4 في حالة عدم معرفة الوسيلة، الدليل 5 عندما ترى أن الوسيلة معقدة، الدليل 6 في حالة وجود أسباب أخرى (مع التحديد). أما الإجابات الناقصة فرمزت بالدليل 9.

تم تسجيل معطيات ناقصة نسبتها 1.41% من مجموع المعنيات، و نقول بهذا أن النسبة لا تؤثر على نوعية المعطيات.

جدول رقم 148: توزيع النساء حسب سبب تجنب اللولب على الإطلاق

النسب المئوية	التكرار	f708c
98.59	3224	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.41	46	ت- الإجابات الناقصة
1.41	46	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 14.5.2. المشاكل التي صادفت النساء عند استعمال اللولب (f708d):

سئلت النسوة اللاتي استعملن اللولب في الماضي ( 262 امرأة) عما إذا صادفهن مشاكل عند استعمال اللولب. تم تحديد هذه المشاكل وفق المتغيرات الجزئية التالية:

f708da: النزيف الدموي، f708db: التهاب/ تنقل اللولب، f708dc: يتطلب متابعة طبية مستمرة،  
 f708dd: ارتفاع التكلفة، f708de: صعوبة الحصول على الوسيلة، f708df: عدم الارتياح،  
 f708dg: اعتراض الزوج، f708dh: مشاكل أخرى.

و تم اعتماد الترميز في كل هذه المتغيرات الجزئية: الدليل 1: عند الإجابة بنعم، الدليل 2:  
 عند الإجابة بلا. أما الإجابات الناقصة فعرفت بالدليل 9.

#### جدول رقم 149: مشاكل استعمال اللولب

f708d	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f708da	77.10	0.00	22.90	22.90	0.00
f708db	77.10	0.00	22.90	22.90	0.00
f708dc	77.10	0.00	22.90	22.90	0.00
f708dd	77.10	0.00	22.90	22.90	0.00
f708de	77.10	0.00	22.90	22.90	0.00
f708df	77.10	0.00	22.90	22.90	0.00
f708dg	77.10	0.00	22.90	22.90	0.00
f708dh	77.10	0.00	22.90	22.90	0.00

من خلال معالجة المعطيات، تبين قدر من المعطيات الناقصة، حيث مثلت ربع المعطيات  
 (22.90%)، قد تسيء النسبة المذكورة لنوعية المعطيات.

#### 15.5.2. تصنيف النساء حسب نوع الوسيلة المستعملة بالنظر للسؤال f708a

(f709a):

يصنف هذا السؤال النساء (3532 امرأة لا تستعمل اللولب حالياً) إلى ثلاثة فئات على النحو

التالي:

الدليل 1: اللاتي يستعملن إحدى الوسائل (من 01 إلى 08) في السؤال (f708a)؛

الدليل 2: اللواتي يستعملن التعقيم (09 أو 10) في السؤال (f708a)؛  
 الدليل 3: اللاتي يستعملن احد الوسائل (من 11 إلى 96) في السؤال (f708a).  
 لم يشمل هذا السؤال على أي معطيات ناقصة.

سجلنا بعد معالجة المعطيات، 3128 امرأة من الفئة الأولى و 58 امرأة من الفئة الثانية ،  
 و 346 امرأة تنتمي للفئة الثالثة.

جدول رقم 150: توزيع النساء حسب نوع الوسيلة المستعملة بالنظر للسؤال f708a

النسب المئوية	التكرار	f709a
100.00	3532	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

16.5.2. مصدر الحصول على (اسم الوسيلة الحالية) آخر مرة (f709b):

استجوبت النسوة ( 3322 امرأة اللاتي لا يستعملن اللولب) عن المصدر الذي تحصلت منه  
 على الوسيلة آخر مرة. و تم تحديد الإجابات على النحو التالي:  
 مستشفى حكومي: الدليل 1، مركز رعاية الأمومة و الطفولة: الدليل 2، مصحة خاصة: الدليل 3،  
 صيدلية: الدليل 4، طبيب خاص: الدليل 5، الزوج: الدليل 6، أصدقاء/ أقارب: الدليل 7، مصدر آخر  
 مع التحديد: الدليل 96، الإجابات غير المحددة: الدليل 98. أما الإجابات الناقصة فعرفت بالدليل 99.

جدول رقم 151: توزيع النساء حسب مصدر الحصول على الوسيلة آخر مرة

النسب المئوية	التكرار	f709b
98.10	3259	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.12	4	ب- الإجابات غير المحددة
1.78	59	ت- الإجابات الناقصة
1.90	63	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد المعالجة، مثلت الصيدليات مصدر أغلبية المستجوبات ( 68.03%)، و سجلنا نسبة معطيات ناقصة بسيطة بلغت 1.90% بين المعنيات.

### 17.5.2. مكان إجراء عملية التعقيم (للمرأة أو للزوج) (f709c):

تم استجواب النسوة عن مكان إجراء عملية التعقيم، و وظفت 6 مداليل لحصر مختلف الفئات:  
1: مستشفى/ مركز أمومة، 2: مصحة متعددة الخدمات/ مركز صحي، 3: طبيب خاص/ مصحة خاصة، 6: أخرى مع التحديد، 8: الإجابات غير المحددة، 9: الإجابات الناقصة.

جدول رقم 152: توزيع النساء حسب مكان إجراء عملية التعقيم

النسب المئوية	التكرار	f709c
93.10	54	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
6.90	4	ت- الإجابات الناقصة
6.90	4	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

من خلال المعالجة، سجلنا 50 مبحوثة أجرت عملية التعقيم بمستشفى أو مركز أمومة و 04 حالات عند طبيب خاص أو مصحة خاصة و لم نسجل أي من الحالات المقترحة الأخرى، كما أحصينا نسبة كبيرة من المعطيات الناقصة بلغت المستوى 6.90% بين مجموع المعنيات، قد تسيء لجودة معطيات هذا المتغير.

### 18.5.2. السبب الرئيسي لاختيار عملية التعقيم (للمرأة أو للزوج) (f709d):

تم استجواب المبحوثات ( 3726 امرأة اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل) عن السبب الرئيسي لاختيار عملية التعقيم، و صنفنا الإجابات على الشكل الآتي:

مضمونة: الدليل 01، سهولة الاستعمال: الدليل 02، تكلفة منخفضة/ مجانية: الدليل 03، نصيحة طبيب/ قابلة: الدليل 04، بدون أعراض جانبية: الدليل 05، تأثير دائم: الدليل 06، أخرى (مع التحديد): الدليل 96، الإجابات الناقصة: الدليل 99.



أعطت بيانات المسح نسبة ضئيلة من المعطيات الناقصة لم تتجاوز عتبة 0.5% من مجموع المعنيات.

جدول رقم 153: توزيع النساء حسب السبب الرئيسي لاختيار عملية التعقيم

النسب المئوية	التكرار	f709d
99.60	3711	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.40	15	ت- الإجابات الناقصة
0.40	15	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

19.5.2. مدد استعمال الوسيلة دون انقطاع (الأشهر، السنوات) (f710):

شمل هذا المتغير متغيرين جزئيين:

f710a: تم استجواب النسوة اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل ( 3726 امرأة) عن مدة استعمال الوسيلة الحالية دون انقطاع (بالسنوات، بالأشهر). تم اعتماد الترميز التالي: الدليل 1: إذا كانت المدة بالأشهر، الدليل 2: إذا كانت المدة معبر عنها بالسنوات، الدليل 9: في حالة الإجابات الأخرى.

f710b: استجوبت نفس الفئة من النسوة ( 3726 امرأة) عن مدة استعمال الوسيلة الحالية، و خصصت للإجابة عن المدد خانتين، و وظف الرمز 98 للاتي لا يتذكرن المدد و استخدم الدليل 99 لخصر الإجابات الناقصة.

تم تسجيل 1186 مدة شهرية و 2495 مدة سنوية و عبرت 45 امرأة عن المدد بحسابات زمنية أخرى. دخلت الإجابات في المجال [0-24] و يشير الجدول رقم 154 إلى نسبة معطيات ناقصة قدرها 1.21% بين المبحوثات في هذا السؤال.

جدول رقم 154: توزيع النساء حسب مدد استعمال الوسيلة الحالية دون انقطاع

المجموع		معييار المدد (أشهر/ سنوات) f710a						مدد استعمال الوسيلة دون انقطاع f710b
		9		2		1		
%	التكرار	%	التكرار	%	التكرار	%	التكرار	
55.85	2081	0.00	0	42.99	1602	12.86	479	4 - 0
29.88	1113	0.00	0	19.12	712	10.76	401	9 - 5
8.59	320	0.00	0	4.22	157	4.38	163	14 - 10
3.58	133	0.00	0	0.57	21	3.01	112	19 - 15
0.91	34	0.00	0	0.08	3	0.83	31	24 - 20
0.48	18	0.48	18	0	0	0	0	98
0.72	27	0.72	27	0	0	0	0	99
100.00	3726	1.21	45	66.96	2495	31.83	1186	المجموع

20.5.2. مصادفة مشاكل عند استعمال الوسيلة الحالية (f711):

استجوبت المعنيات ( 3726 امرأة، اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل) عن التعرض لأي مشاكل عند استعمال الوسيلة الحالية، و ترجمت الإجابة نعم بالدليل 1، و الإجابة لا بالدليل 2، و الإجابات الناقصة بالدليل 9.

جدول رقم 155: توزيع النساء حسب التعرض لمشاكل عند استعمال الوسيلة الحالية

النسب المئوية	التكرار	f711
99.81	3719	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.19	7	ت- الإجابات الناقصة
0.19	7	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد معالجة المعطيات، لاحظنا وجود 416 حالة صادفت مشاكل عند استعمال الوسيلة الحالية و يبين الجدول رقم 155 وجود نسبة بسيطة من المعطيات الناقصة (0.19%).

## 21.5.2. مصادفة المشاكل عند استعمال الوسيلة الحالية (f712):

تم استجواب النسوة اللواتي صادفن مشاكل حسب السؤال السابق ( 416 امرأة) عن مشاكل الاستعمال. حددت هذه المشاكل بالمتغيرات الجزئية التالية:

f712a: مشاكل صحية، f712b: الوسيلة غير فعالة، f712c: اعتراض الزوج، f712d: صعوبة الحصول عليها، f712e: ارتفاع الكلفة، f712f: عدم الارتياح لاستعمالها، f712g: مشاكل أخرى.

و اعتمد في مختلف المتغيرات الترميز التالي:

نعم: الدليل 1، لا: الدليل 2، الإجابات غير المحددة: الدليل 8، الإجابات الناقصة: الدليل 9.

### جدول رقم 156: توزيع النساء حسب مشاكل استعمال الوسيلة الحالية

f712	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f712a	99.28	0.48	0.24	0.72	0.00
f712b	99.28	0.48	0.24	0.72	0.00
f712c	99.28	0.48	0.24	0.72	0.00
f712d	99.28	0.48	0.24	0.72	0.00
f712e	99.28	0.48	0.24	0.72	0.00
f712f	99.28	0.48	0.24	0.72	0.00
f712g	99.28	0.48	0.24	0.72	0.00

حسب معطيات المسح، بلغت نسبة المعطيات الناقصة المقدار 0.72% بين مجموع المعطيات

بالسؤال (f712)، لا تؤثر على نوعية المعطيات.

## 22.5.2. السبب الرئيسي لتوقف النساء عن استعمال وسائل تنظيم الأسرة (f713):

استجوبت النساء اللاتي توقفن عن استعمال وسائل تنظيم الأسرة ( 1665 امرأة) عن السبب الرئيسي الذي جعلهن يتوقفن عن استعمال وسائل تنظيم الولادات، و لخصت الإجابات على النحو الآتي:

عدم نجاح الوسيلة/ الحمل: الدليل 1، نقص في التمتع بالعلاقة الجنسية: الدليل 2، أثرت على الدورة الشهرية: الدليل 3، أثارت مشاكل صحية: الدليل 4، صعوبة عند الاستعمال: الدليل 5، صعوبة الحصول عليها: الدليل 6، زيادة في الوزن: الدليل 7، عدم الارتياح للوسيلة: الدليل 8، الرغبة في إنجاب طفل آخر: الدليل 9، تعويض طفل متوفى: الدليل 10، عدم وجود خصوصية في الاستعمال: الدليل 11، سن اليأس: الدليل 12، أسباب أخرى (مع التحديد): الدليل 96، الإجابات الناقصة: الدليل 99.

جدول رقم 157: توزيع النساء حسب السبب الرئيسي للتوقف عن استعمال وسائل تنظيم الولادات

النسب المئوية	التكرار	f713
99.64	1659	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.36	6	ت- الإجابات الناقصة
0.36	6	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

تم إحصاء نسبة صغيرة من المعطيات الناقصة حددت عند المستوى 0.36% بين مجموع المعنيات.

## 23.5.2. توزيع النساء حسب الحالة الزوجية الحالية بالنظر للسؤال f124 (f714):

تم تصنيف النساء اللاتي لم يصادفن مشاكل عند استعمال الوسيلة الحالية (3326 امرأة) حسب الحالة الزوجية الحالية إلى حالتين:

1: متزوجة حاليا (متزوجة/ منفصلة)، 2: غير متزوجة حاليا (مطلقة/ أرملة). لم يشمل هذا المتغير على أية معطيات ناقصة.

جدول رقم 158: توزيع النساء حسب الحالة الزوجية الحالية بالنظر للسؤال f124

النسب المئوية	التكرار	f714
100.00	3326	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

من خلال المعالجة، سجلنا 3062 متزوجة حالياً و 264 مطلقة أو أرملة.

## 24.5.2. النية في استعمال أي وسيلة لتنظيم الولادات مستقبلاً (f715):

استجوبت النسوة المتزوجات حالياً (3062 امرأة) عن نية استعمال أحد وسائل تنظيم الولادات مستقبلاً. و حددت الإجابة نعم بالدليل 1، و الإجابة لا بالدليل 2، و الإجابات غير المحددة بالدليل 8، و الإجابات الناقصة بالدليل 9.

جدول رقم 159: توزيع النساء حسب النية في استعمال أحد وسائل تنظيم الولادات مستقبلاً

النسب المئوية	التكرار	f715
100.00	3062	أ- الإجابات الموافقة للمجال
9.54	292	ب- الإجابات غير المحددة
1.01	31	ت- الإجابات الناقصة
10.55	323	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

أعلنت 1216 مبحوثة عن نية استخدام وسائل تنظيم الولادات في المستقبل، فيما لا تنوي 1523 حالة استعمال وسائل منع الحمل مستقبلاً. يشير الجدول رقم 159 إلى نسبة معطيات ناقصة كبيرة تجاوزت عشر (10/1) الإجابات، يجعلها تؤثر في قيمة المعطيات.

## 25.5.2. السبب الرئيسي لعدم الرغبة في استعمال وسيلة لتنظيم الولادات في المستقبل

(f716):

استجوبت السيدات اللاتي لا ينوين استعمال أي وسيلة مستقبلا ( 1523 امرأة) عن السبب الرئيسي في ذلك و تم تبني الترميز الآتي:

1: ترغب في إنجاب طفل آخر ، 2: يتعارض مع المعتقدات الدينية ، 3: تعارض تنظيم الأسرة ، 4: الزوج غير موافق، 5: الخوف من الآثار الجانبية، 6: عدم المعرفة، 7: صعوبة الحصول عليها، 8: التكلفة مرتفعة، 9: صعوبة في الاستعمال، 10: القضاء و القدر/ بيد الله، 11: سن اليأس/ العقم، 12: عدم الارتياح للوسائل المتاحة، 96: أسباب أخرى، 98: الإجابات غير المحددة، 99: الإجابات الناقصة.

بلغت نسبة المعطيات الناقصة المقدار 2.03% بين مجموع المعنيات.

جدول رقم 160: توزيع النساء حسب السبب الرئيسي لغياب الرغبة في استعمال وسيلة لتنظيم

الولادات مستقبلا

النسب المئوية	التكرار	f716
97.97	1492	أ- الإجابات الموافقة للمجال
1.64	25	ب- الإجابات غير المحددة
0.39	6	ت- الإجابات الناقصة
2.03	31	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 26.5.2. وقت بدء استعمال وسيلة تنظيم الولادات (f717):

سئلت النسوة اللاتي لديهن نية استعمال الوسيلة مستقبلا (1216 امرأة) عن وقت بدء استعمال هذه الوسيلة، و رمزت الإجابة على النحو التالي: خلال 12 شهرا: الدليل 1، ما بين سنة و سنتين: الدليل 2، ثلاث سنوات أو أكثر: الدليل 3، لم تقرر بعد/ لا تعرف: الدليل 8، الإجابات الناقصة: الدليل 9.

يشير الجدول رقم 161 إلى نسبة كبيرة جدا من المعطيات الناقصة اقتربت من ثلث البيانات (31% من الإجابات)، تسيء ضرورة إلى نوعية معطيات المسح.

جدول رقم 161: توزيع النساء حسب وقت بدء استعمال أحد وسائل تنظيم الولادات

النسب المئوية	التكرار	f717
69.00	839	أ- الإجابات الموافقة للمجال
30.26	368	ب- الإجابات غير المحددة
0.74	9	ت- الإجابات الناقصة
31.00	377	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 27.5.2. الوسيلة المفضل استعمالها مستقبلا (f718):

تم سؤال النساء اللائي لديهن نية الاستعمال مستقبلا ( 1216 امرأة) عن الوسيلة المفضل استعمالها مستقبلا. اعتمد لتلخيص معطيات هذا السؤال الترميز الموالي:

الحبوب (الدليل 1)، اللولب (الدليل 2)، الحقن (الدليل 3)، الغرز (الدليل 4)، العازل الواقي للرجل (الدليل 5)، العازل الواقي للمرأة (الدليل 6)، الحاجز المهبطي (الدليل 7)، المرهم أو الكريم الموضعي (الدليل 8)، ربط الأنابيب الرحمية (الدليل 9)، التعقيم للرجال (الدليل 10)، إطالة فترة الرضاعة الطبيعية (الدليل 11)، فترة الأمان (الدليل 12)، العزل (الدليل 13)، أخرى مع التحديد (الدليل 96)، الإجابات غير المحددة (الدليل 98)، الإجابات الناقصة (الدليل 99).

جدول رقم 162: توزيع النساء حسب الوسيلة المفضل استعمالها مستقبلا

النسب المئوية	التكرار	f718
96.13	1169	أ- الإجابات الموافقة للمجال
2.97	36	ب- الإجابات غير المحددة
0.90	11	ت- الإجابات الناقصة
3.87	47	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بلغت نسبة المعطيات الناقصة حسب الجدول أعلاه 3.87% بين مجموع الإجابات.

## 28.5.2. الموافقة على استعمال الأزواج لوسائل تنظيم الأسرة (f719):

استجوبت النساء اللاتي لسن في سن اليأس و غير العقيمت و أزواجهن غير عقيمين ( 7320 امرأة) عن موافقتهن على استعمال أزواجهن وسائل لتنظيم الأسرة، و رمزت الإجابات: توافق: الدليل 1، توافق بشروط: الدليل 2، لا توافق: الدليل 3، الإجابات غير المحددة: الدليل 8، الإجابات الناقصة: الدليل 9.

جدول رقم 163: توزيع النساء حسب الموافقة على استعمال أزواجهن لوسائل تنظيم الولادات

النسب المئوية	التكرار	f719
96.31	7050	أ- الإجابات الموافقة للمجال
2.86	209	ب- الإجابات غير المحددة
0.83	61	ت- الإجابات الناقصة
3.69	270	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يشير الجدول رقم 163 إلى نسبة معطيات ناقصة قدرها 3.69%، كما سجلنا 6506 حالة توافق على استعمال الزوج لوسائل تنظيم الأسرة و 231 امرأة توافق بشروط و 313 مبحوثة لا توافق.

## 29.5.2. الحالة الزوجية للنساء بالنظر للسؤال f124 (f720):

أدرج هذا المتغير لتمييز النسوة ( 7320 امرأة) حسب الحالة الزوجية الحالية، و تم ترميز الفئة الأولى: متزوجة حالياً (متزوجة/ منفصلة) بالدليل 1، الثانية: غير متزوجة حالياً (مطلقة/ أرملة) بالدليل 2. لم يشمل هذا المتغير معطيات ناقصة.

بعد المعالجة، سجلنا 6788 امرأة من الفئة الأولى (متزوجة حالياً) و 532 امرأة من الفئة الثانية (غير متزوجة حالياً).



جدول رقم 164: توزيع النساء حسب الحالة الزوجية الحالية

النسب المئوية	التكرار	f720
100.00	7320	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

30.5.2. موافقة الزوج على استعمال الأزواج لوسائل تنظيم الولادات (f721):

تم استجواب النساء المتزوجات حالياً ( 6788 امرأة) عن موافقة أزواجهن على استعمال الأزواج وسائل تنظيم الولادات. وظف الدليل 1 في حالة الموافقة، و الدليل 2 في حالة الموافقة بشروط، و الدليل 3 في حالة عدم الموافقة، و الدليل 8 في حالة الإجابات غير المحددة، و يأخذ المتغير القيمة 9 في حالة الإجابات الناقصة.

جدول رقم 165: توزيع النساء حسب موافقة الزوج على استعمال الأزواج لوسائل تنظيم الولادات

النسب المئوية	التكرار	f721
92.32	6267	أ- الإجابات الموافقة للمجال
7.06	479	ب- الإجابات غير المحددة
0.62	42	ت- الإجابات الناقصة
7.68	521	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

أعطى المسح 5613 امرأة يوافق زوجها على استعمال الأزواج لوسائل تنظيم الأسرة و 213 امرأة يوافق لكن بشروط و 441 امرأة من لا يوافق أزواجهن على استعمال وسائل تنظيم الولادات. و يشير الجدول أعلاه إلى نسبة معطيات ناقصة هامة، بلغت المقدار 7.68% بين مجموع الإجابات، قد تنقص من قيمة المعطيات.

## 31.5.2. عدد مرات التحدث مع الزوج عن تنظيم الولادات خلال السنة الماضية

(f722):

استجوبت النسوة المتزوجات حالياً ( 6788 امرأة) عن عدد المرات التي تحدثن فيها مع أزواجهن عن تنظيم الولادات خلال السنة الماضية، و أخذت الإجابة ولا مرة/ أبداً الدليل 1، مرة أو مرتان الدليل 2، أكثر من ذلك الدليل 3، الإجابات الناقصة الدليل 9.

جدول رقم 166: توزيع النساء حسب عدد مرات التحدث مع الزوج عن تنظيم الولادات خلال السنة

الماضية

النسب المئوية	التكرار	f722
94.46	6412	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
5.54	376	ت- الإجابات الناقصة
5.54	376	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

من خلال المعالجة، سجلنا 1814 حالة لم تناقش مع زوجها تنظيم الولادات خلال السنة الماضية، و 1945 امرأة تحدثت مرة أو مرتين عن ذلك، و 2653 مبحوثة تحدثت أكثر من مرتين. يشير الجدول رقم 166 إلى نسبة معطيات ناقصة هامة قدرها 5.54% بين مجموع الإجابات، قد تسيء لجودة المعطيات الخاصة بهذا المتغير.

## 32.5.2. الوسيلة المستعملة حالياً بالنظر للمتغير (f708a) (f724):

صنفت النساء ( 6788 امرأة المتزوجات حالياً) حسب هذا المتغير إلى فئتين: المستعملات

لربط الأنابيب الرحمية/ التعقيم للرجال: الدليل 1 و المستعملات لأي وسيلة أخرى أو لا تستعمل: الدليل 2.

سجلنا 58 حالة استعملت وسيلة ربط الأنابيب الرحمية أو التعقيم (الرجال)، و 6730 امرأة لا

تستعمل هذه الوسيلة.

جدول رقم 167: توزيع النساء حسب الوسيلة المستعملة حالياً بالنظر للسؤال f708a

النسب المئوية	التكرار	f724
94.46	6788	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

33.5.2. رغبة النساء الحوامل و غير الحوامل حالياً في إنجاب الأطفال مستقبلاً

:(f725)

استجوبت النسوة الحوامل و غير الحوامل حالياً ( 6730 امرأة) عن رغبتهن في إنجاب مزيد من الأطفال مستقبلاً. و حددت رغبة إنجاب طفل آخر بالدليل 1، و رغبة التوقف عن الإنجاب بالدليل 2، و حالات عدم القدرة على الحمل بالدليل 3، و الإجابة 'بيد الله' بالدليل 4، والإجابات غير المحددة بالدليل 8، و الإجابات الناقصة بالدليل 9.

جدول رقم 168: توزيع النساء (الحوامل و غير الحوامل حالياً) حسب رغبتهن في إنجاب أطفال

مستقبلاً

النسب المئوية	التكرار	f725
97.10	6535	أ- الإجابات الموافقة للمجال
2.42	163	ب- الإجابات غير المحددة
0.48	32	ت- الإجابات الناقصة
2.90	195	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يبين الجدول رقم 168 نسبة معطيات ناقصة قدرها 2.9% من مجموع الإجابات. كما سجلنا بعد معالجة المعطيات 2251 حالة ترغب في إنجاب طفل آخر و 3026 امرأة ترغب في التوقف عن الإنجاب و 327 مبحوثة لا تستطيع أن تحمل و 931 امرأة أرجعت الأمر لله.

### 34.5.2 جنس المولود القادم (f726):

تم استجواب النساء اللواتي يرغبن في إنجاب طفل آخر (2251 امرأة) عن رغبتهن في جنس محدد (ولد، بنت، سيان)، و تم تبني الترميز الآتي:

ولد: الدليل 1، بنت: الدليل 2، سيان: الدليل 3، بيد الله: الدليل 4، أخرى (مع التحديد): الدليل 6، الإجابات الناقصة: الدليل 9.

### جدول رقم 169: توزيع النساء حسب جنس الطفل القادم

النسب المئوية	التكرار	f726
98.13	2209	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.87	42	ت- الإجابات الناقصة
1.87	42	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يشير الجدول إلى نسبة معطيات ناقصة بلغت 1.87% من مجموع الإجابات، لا تؤثر على جودة البيانات.

### 35.5.2. مدة الانتظار المفضلة لدى النساء اللاتي يرغبن في إنجاب الطفل القادم (بالنظر

### للسؤال (f242) (f727a):

استجوبت النسوة (2251 امرأة اللاتي يرغبن في إنجاب طفل آخر) عن المدة التي قد تنتظرها قبل الحصول على الطفل التالي المرغوب فيه. وظف الدليل 1 في حالة الإجابة بالأشهر و الدليل 2 الإجابة بالسنوات و الدليل 9 للإجابات الأخرى مع التحديد. لم نسجل على هذا المتغير أي معطيات ناقصة.

بعد المعالجة، تبين أن 148 امرأة ترغب الحصول على الولادة التالية بشكل مستعجل، لأن المدد أعلن عنها بالأشهر و 1480 امرأة أجابت بالسنوات و 623 امرأة عبرت عن المدة المفضلة في انتظار الطفل القادم بحسابات زمنية أخرى.

جدول رقم 170: توزيع النساء الحوامل حالياً حسب المدة المفضلة لانتظار الطفل القادم بعد الوضع

النسب المئوية	التكرار	f727a
100.00	2251	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

36.5.2. الزمن الفاصل بين ولادتين (الحوامل) أو بعد تاريخ الملاحظة و الولادة

المستقبلية (بالنظر للسؤال f242) (f727b):

تم استجواب النساء ( 2251 امرأة) عن المدة التي تفضلها ولادتين (الأخيرة و المستقبلية). خصصت خانتان للإجابة عن السؤال، الدليل 94 للإجابة قريب/ حالا و الدليل 95 للاتي لا يستطيع أن يحملن و الدليل 96 للإجابات الأخرى مع التحديد و الدليل 98 في حالة الإجابات غير المحددة. أما الإجابات الناقصة فعرفت بالدليل 99.

جدول رقم 171: توزيع النساء حسب المدة المفضلة لانتظار الطفل المرغوب فيه

النسب المئوية	التكرار	f727b
91.56	2061	أ- الإجابات الموافقة للمجال
6.00	135	ب- الإجابات غير المحددة
2.44	55	ت- الإجابات الناقصة
8.44	190	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

دخلت الإجابات في المجال [ 1 - 18] و يشير الجدول إلى نسبة معطيات ناقصة كبيرة بلغت

المقدار 8.44% بين المعنيات بالسؤال، و الذي قد يسيء لنوعية معطيات هذا المتغير.

## 37.5.2. حديث النساء مع أزواجهن حول عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم طوال

### حياتهم الإنجابية (f728):

طرح هذا السؤال على النسوة المتزوجات حالياً ( 6788 امرأة) لتحديد عدد اللاتي كان لهن حديثاً مع أزواجهن حول عدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابهم طوال حياتهن الإنجابية. وظف الدليل 1 للاتي سبق لهن الحديث و الدليل 2 للاتي لم يسبق لهن الحديث مع أزواجهن و تم تحديد الإجابات الناقصة بالدليل 9.

جدول رقم 172: توزيع النساء حسب حديث النساء مع أزواجهن حول عدد الأطفال المرغوب في

### إنجابهم طوال حياتهن

النسب المئوية	التكرار	f728
99.18	6732	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.82	56	ت- الإجابات الناقصة
0.82	56	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد المعالجة، تبين أن عدد اللواتي سبق لهن الحديث مع أزواجهن في الموضوع قد بلغ 3602 امرأة و وصل عدد اللاتي لم يسبق لهن الحديث مع أزواجهن عن عدد الأطفال المرغوب فيه 3130 امرأة. يشير الجدول إلى نسبة معطيات ناقصة قدرها 0.82% من مجموع المعنيات.

## 38.5.2. مقارنة عدد الأطفال الذين يرغب فيهم الزوج بالنسبة للعدد المرغوب من

### طرف المرأة (f729):

تم استجواب النساء ( 6788 امرأة = المتزوجات حالياً) لمقارنة عدد الأطفال المرغوب من طرفيهما. حدد الدليل 1 الأزواج الذين يرغبون في نفس العدد مقارنة بعدد الأطفال الذين ترغب فيهم زوجاتهم، و الدليل 2 الذين يحبون عدداً أكبر، و تم تحديد الذين يفضلون عدداً أصغر بالدليل 3، أما الإجابات غير المحددة أخذت الدليل 8، و عرفت الإجابات الناقصة بالدليل 9.

يظهر الجدول رقم 173 نسبة كبيرة جدا من المعطيات الناقصة، بلغت المقدار 27.36% من مجموع المعنيات، قد يسيء لجودة معطيات هذا المتغير.

جدول رقم 173: مقارنة عدد الأطفال الذين يرغبهم الزوج بالعدد الذي ترغبه الزوجة

النسب المئوية	التكرار	f729
72.64	4931	أ- الإجابات الموافقة للمجال
26.36	1789	ب- الإجابات غير المحددة
1.00	68	ت- الإجابات الناقصة
27.36	1857	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

39.5.2. عدد الأطفال المفضل من قبل المرأة (f730):

استجوبت النسوة ( 7320 امرأة = غير العقيمات و لسن في سن اليأس و أزواجهن ليسوا مصابين بالعقم) عن عدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابه طوال حياتهن. وظفت خانتان لتحديد عدد الأطفال المفضل لدى النسوة. حددت الإجابات أخرى (مع التحديد) بالرمز 96، و وظف الدليل 99 في حالة الإجابات الناقصة.

بلغت نسبة المعطيات الناقصة المقدار 0.64% من مجموع المعنيات. أخذت الإجابات المجال [0 - 20 طفلا] و مثلت نسبة الإجابات الأخرى القيمة 11.34%.

جدول رقم 174: توزيع النساء حسب العدد المفضل من الأطفال

النسب المئوية	التكرار	f730
99.36	7273	أ- الإجابات الموافقة للمجال
00.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.64	47	ت- الإجابات الناقصة
0.64	47	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 40.5.2. المفاضلة بين الجنسين من وجهة نظر الأمهات (f731):

تضمن هذا السؤال ثلاثة متغيرات جزئية:

f731a: سئلت النساء اللاتي حددن إجابتهن بعدد في السؤال السابق ( 6444 امرأة) عن عدد الذكور بين عدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابهم طوال حياتهن. وضعت خانتان لتسجيل عدد الذكور المفضل لدى المعنيات و تم تحديد الإجابات الناقصة بالدليل 99. أخذت الإجابات المجال [0 - 15 ولدا].

f731b: استجوبت النساء اللاتي حددن إجابتهن في المتغير السابق (6437 امرأة) عن عدد الإناث بين عدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابهم طوال حياتهن. وضعت خانتان لتحديد العدد المفضل من الإناث. لم يشمل هذا المتغير أية معطيات ناقصة. شملت الإجابات المجال [0 - 15 بنتا].

f731c: يمثل هذا المتغير عدد الأطفال مهما كان جنس المولود. لم يتضمن هذا المتغير معطيات ناقصة. و أخذت الإجابات قيم المجال [0 - 20 طفلا].

جدول رقم 175: توزيع النساء حسب عدد الذكور، عدد الإناث و عدد الولادات مهما كان الجنس المفضل لدى المرأة

f731c		f731b		f731a		f731
%	التكرار	%	التكرار	%	التكرار	
100.00	6436	100.00	6437	99.89	6437	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	0.00	0	0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	0.00	0	0.11	7	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	0.00	0	0.11	7	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	0.00	0	0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

يبين الجدول رقم 175 وجود معطيات ناقصة ضئيلة تخص المتغير f731a (0.11%)، لا تسيء لجودة المعطيات.

## 41.5.2. الفترة المفضلة بين ولادتين متتاليتين حسب المستجوبات (f732):

استهدف هذا السؤال النسوة غير العقيمات و لسن في سن اليأس و أزواجهن غير مصابين بالعقم (7320 امرأة):



f732a: سئلت نسوة هذه الفئة عن الفترة المفضلة لديهن بين ولادتين متتاليتين. وظف الدليل 1 للتعبير عن الفترة بالأشهر و الدليل 2 للاتي عبرن عنها بالسنوات و الدليل 9 للحالات الأخرى (مع التحديد). لم يشمل هذا المتغير معطيات ناقصة.

f732b: استهدف هذا السؤال نفس الفئة ( 7320 امرأة) لمعرفة الفترة المفضلة لديهن بين ولادتين متتاليتين. تم وضع خانيتين لتحديد عدد الأشهر/ عدد السنوات المفضل بين ولادتين متواليتين لدى النساء. وضع الدليل 96 في حالة الإجابة بحسابات زمنية أخرى (مع التحديد) و حدد الدليل 99 الإجابات ناقصة.

بعد المعالجة، سجلنا 40 حالة عبرت بالأشهر و 7108 مبحوثة أجابت بالسنوات و 172 من النساء عبرن بمقاييس زمنية أخرى.

ضم المجال [ 10 - 42 شهرا] الإجابات بالأشهر و المجال [ 1 - 10 سنوات] الإجابات بالسنوات، و تم تسجيل نسبة ضئيلة من المعطيات الناقصة قدرت بالقيمة 0.83% من مجموع المعنيات (الجدول رقم 176).

جدول رقم 176: توزيع النساء حسب مقياس الفترة و الفترة المفضلة ما بين ولادتين متتاليتين

المجموع		مقياس المدد المفضلة f732a						الفترة المفضلة بين ولادتين متتاليتين f732b
		9		2		1		
%	التكرار	%	التكرار	%	التكرار	%	التكرار	
86.78	6352	0.00	0	86.78	6352	0.00	0	5 - 1
10.48	767	0.00	0	10.34	756	0.15	11	10 - 6
0.38	29	0.00	0	0.00	0	0.38	29	42 - 11
1.52	111	1.52	111	0.00	0	0.00	0	96
0.83	61	0.83	61	0.00	0	0.00	0	99
100.00	7320	2.35	172	97.10	7108	0.55	40	المجموع

## 42.5.2. آراء النساء في مجال الأعمار الأنسب لزواج البنات (f733):

أدرج هذا السؤال لمعرفة السن الأمثل لزواج البنات حسب آراء النسوة ( 7399 امرأة)، و تم وضع خانتين لتحديد العمر الأنسب لزواج بناتهن، مثل الرقم 40 الأعمار الأكبر أو المساوية لأربعين سنة (40 سنة) و وظف الدليل 96 لتحديد الإجابات الأخرى. أما الإجابات الناقصة فحددت بالدليل 99.

جدول رقم 177: توزيع النساء حسب آرائهن في السن الأنسب للزواج (البنات)

النسب المئوية	التكرار	f733
99.78	7383	أ- الإجابات الموافقة للمجال
00.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.22	16	ت- الإجابات الناقصة
0.22	16	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

بعد معالجة معطيات هذا المتغير، دخلت الإجابات ضمن المجال [10 - 40 سنة]. مثل السن 20 منوال الظاهرة حيث بلغت نسبتها 33.63% بين مجموع الإجابات . يشير الجدول إلى نسبة معطيات ناقصة مقدارها 0.22% فقط بين المستجوبات.

## 43.5.2. عدد الأطفال المفضلين من طرف النساء لبناتهن (f734):

صيغ هذا السؤال في الاستمارة على الشكل التالي: في رأيك ما هو عدد الأطفال الذين ترغبين أن تنجبهم ابنتك في المستقبل؟ وظفت خانتان لتحديد العدد المفضل و وضع الدليل 96 للإجابات الأخرى (مع التحديد). حدد الدليل 99 الإجابات الناقصة. شمل هذا السؤال كل أفراد العينة دون استثناء (7399 امرأة).

بعد المعالجة، تبين أن عدد الأطفال المرغوب فيهم (من قبل النساء لبناتهن) ينتمي إلى المجال [0 - 20 طفلاً]، و بلغت نسبة المعطيات الناقصة القيمة 0.30% بين مجموع المعنيات.

جدول رقم 178: توزيع النساء حسب عدد الأطفال الذين يرغبن فيهن لبناتهن مستقبلاً

النسب المئوية	التكرار	f734
99.70	7383	أ- الإجابات الموافقة للمجال
00.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.30	22	ت- الإجابات الناقصة
0.30	22	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

#### 44.5.2. الموافقة على دخول البنات لعالم الشغل (f735):

سئلت النساء (كل وحدات العينة = 7399 امرأة) عن موافقتهن لدخول بناتهن سوق الشغل في حالة ما أتيحت لهن فرصة جيدة للعمل مقابل أجر نقدي. لهذا الغرض صنفنا الإجابات حسب الترميز التالي: الموافقات: الدليل 1، الموافقات بشروط: الدليل 2 و غير الموافقات: الدليل 3، الإجابات الناقصة: الدليل 9.

بعد معالجة معطيات هذا المتغير سجلنا موافقة 6747 امرأة على دخول بناتهن سوق الشغل و موافقة 310 امرأة بشروط فيما لم توافق 293 حالة على عمل البنات، و تم تسجيل قدر بسيط من المعطيات الناقصة (0.66%).

جدول رقم 179: توزيع النساء حسب الموافقة على دخول بناتهن عالم الشغل

النسب المئوية	التكرار	f735
99.44	7350	أ- الإجابات الموافقة للمجال
00.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.66	49	ت- الإجابات الناقصة
0.66	49	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 6.2. محور الصحة الإيجابية:

تناولت الاستمارة في هذا المحور 19 سؤالاً سئلت من خلالها النسوة عن الجوانب المتعلقة بالصحة الإيجابية.

### 1.6.2. تلقي كشف نسائي خلال الإثني عشر شهراً الماضية (f904):

تم استجواب نسوة الفئة العمرية 40 - 49 سنة (2643 امرأة) عن تعرضهن لأي كشف نسائي خلال الإثني عشر شهراً الماضية و لخصت الإجابات على النحو التالي: 1: نعم، 2: لا و 9: الإجابات الناقصة.

بعد المعالجة، سجلنا نسبة صغيرة من المعطيات الناقصة بلغت المقدار 2.38% بين مجموع المعنيات.

جدول رقم 180: توزيع النساء حسب تلقي كشف نسائي خلال 12 شهراً الماضية

f904	التكرار	النسب المئوية
أ- الإجابات الموافقة للمجال	2580	97.62
ب- الإجابات غير المحددة	0	00.00
ت- الإجابات الناقصة	63	2.38
ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)	63	2.38
ج- الإجابات غير الموافقة للمجال	0	0.00

### 2.6.2. عدد مرات تلقي الكشف النسائي خلال الإثني عشر شهراً الماضية (f905):

سئلت النسوة اللاتي تلقين كشفاً نسائياً خلال الإثني عشر شهراً الماضية (466 امرأة) عن عدد الكشوف المعاشة خلال 12 شهراً الأخيرة. تم وضع خانتان لتحديد العدد و خصص الدليل 10 للاتي عرفن عشرة كشوف أو أكثر. أما الإجابات الناقصة فحددت بالدليل 99.

أخذت الإجابات المجال [1 - 10 مرات] و يشير الجدول أعلاه إلى نسبة معطيات ناقصة قدرها 3.90% بين مجموع المعنيات بالسؤال.

جدول رقم 181: توزيع النساء حسب عدد مرات تلقي الكشف النسائي خلال 12 شهرا الماضية

النسب المئوية	التكرار	f905
96.10	444	أ- الإجابات الموافقة للمجال
00.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
3.90	18	ت- الإجابات الناقصة
3.90	18	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 3.6.2. مكان تلقي آخر كشف نسائي (f906):

أدرجت خمسة إجابات لتحديد مكان تلقي آخر كشف نسائي:

- 1: مستشفى/ مركز أمومة، 2: مصحة متعددة الخدمات/ مركز صحي، 3: مصحة خاصة، 4: لدى طبيب خاص، 6: أخرى (تحدد). أما الإجابات الناقصة فتعرف بالدليل 9.

جدول رقم 182: توزيع النساء حسب مكان تلقي آخر كشف نسائي

النسب المئوية	التكرار	f906
99.57	464	أ- الإجابات الموافقة للمجال
00.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.43	2	ت- الإجابات الناقصة
0.43	2	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

تلقت أغلبية المبحوثات الكشف عند أطباء خواص. بلغ عددهن 304 امرأة من بين مجموع المعنيات و بلغت نسبة المعطيات الناقصة المقدار 0.43% من مجموع المستجوبات.

### 4.6.2. أسباب عدم تلقي الكشف (f907):

استجوبت النسوة اللواتي لم يتلقين الكشف النسائي (2177 امرأة) عن أسباب عدم تلقي الكشف النسائي خلال 12 شهرا الأخيرة. وشمل هذا السؤال ثمانية متغيرات جزئية لخصت الأسباب التالية:

ليست على علم بأهمية الكشف ( f907a )، لم تشعر بالحاجة/ لا تشكو من مشاكل أو أعراض (f907b)، التكلفة مرتفعة (f907c)، الخدمة غير متوفرة ( f907d )، مشغولة/ الزوج مشغول (f907e)، محرجة (f907f)، خائفة (f907g)، أسباب أخرى (مع التحدي) (f907h).

تم تبني الترميز التالي في كل المتغيرات الجزئية:

1: نعم، 2: لا. أما الإجابات الناقصة فحددت بالدليل 9.

بعد معالجة معطيات هذه المتغيرات، تبين أن نسبة المعطيات الناقصة بلغت القيمة %3.12 بين مجموع المعنيات مهما كان المتغير الجزئي. لا تؤثر هذه النسبة في جودة المعطيات.

جدول رقم 183: توزيع النساء حسب أسباب عدم تلقي الكشف خلال 12 شهرا الأخيرة

f907	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f907a	96.88	0.00	3.12	3.12	0.00
f907b	96.88	0.00	3.12	3.12	0.00
f907c	96.88	0.00	3.12	3.12	0.00
f907d	96.88	0.00	3.12	3.12	0.00
f907e	96.88	0.00	3.12	3.12	0.00
f907f	96.88	0.00	3.12	3.12	0.00
f907g	96.88	0.00	3.12	3.12	0.00
f907h	96.88	0.00	3.12	3.12	0.00

5.6.2. قيام النساء بعمليات المسحة (التطهر) خلال الإثنى عشر شهرا الماضية

:(f908)

سئلت النسوة (2643 امرأة) عن تلقي مسحة خلال 12 شهرا الماضية. خصص الرمز 1 في

حالة الإجابة بنعم و الدليل 2 عند الإجابة بلا و عرفت الإجابات الناقصة بالدليل 9.

جدول رقم 184: توزيع النساء حسب قيام النساء بعمل مسحة خلال 12 شهرا الماضية

النسب المئوية	التكرار	f908
97.62	2580	أ- الإجابات الموافقة للمجال
00.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
2.38	63	ت- الإجابات الناقصة
2.38	63	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

من خلال المعالجة، أحصينا 102 امرأة تعرضت لمسحة خلال 12 شهرا الأخيرة و سجلنا على هذا السؤال معطيات ناقصة بلغت نسبتها المقدار 2.38% بين مجموع المعنيات.

### 6.6.2. مكان عمل آخر مسحة (f909):

استجوبت النساء ( 102 امرأة) عن مكان القيام بأخر مسحة و لتلخيص المعطيات اعتمد

الترميز التالي:

1: مستشفى/ مركز أمومة، 2: مصحة متعددة الخدمات/ مركز صحي، 3: مصحة خاصة، 4: لدى طبيب خاص، 6: أخرى (تحدد) و اخذ المتغير القيمة 9 في حالة الإجابات الناقصة.

تشير معطيات الجدول رقم 185 إلى معطيات ناقصة نسبتها 1.98% بين مجموع

المبحوثات.

جدول رقم 185: توزيع النساء حسب مكان عمل المسحة آخر مرة

النسب المئوية	التكرار	f909
98.02	99	أ- الإجابات الموافقة للمجال
00.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.98	2	ت- الإجابات الناقصة
1.98	2	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 7.6.2. تكلفة المسحة آخر مرة (f910):

تم استجواب النسوة (102 امرأة) عن تكلفة آخر مسحة. خصصت أربعة خانات لتحديد سعر المسحة بالعملة المحلية و اعتمد الدليل 9995 في حالة مجانية الخدمة و الدليل 9998 في حالة الإجابات غير المحددة. تعرف كل امرأة بالدليل 9999 في حالة الإجابات الناقصة.

جدول رقم 186: توزيع النساء حسب تكلفة المسحة المهبلية آخر مرة

النسب المئوية	التكرار	f910
93.14	95	أ- الإجابات الموافقة للمجال
5.88	6	ب- الإجابات غير المحددة
0.98	1	ت- الإجابات الناقصة
6.86	7	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

أخذت قيم معطيات هذا المتغير المجال [100 - 1700 دينار] و مثلت 86 امرأة فيما تلقت 9 نساء الخدمة مجاناً. بلغت نسبة المعطيات الناقصة المقدار 6.86% بين مجموع المعنيات. هذه الكمية قد تسيء لنوعية المعطيات.

## 8.6.2. أسباب عدم تلقي المسحة خلال الإثني عشر أشهر الأخيرة (f911):

سئلت السيدات اللواتي لم يقمن بالمسحة (2541 امرأة) عن أسباب تجنب العملية. لخصت هذه الأسباب في المتغيرات الجزئية التالية:

f911a: ليست على علم بالأهمية، f911b: لم تشعر بالحاجة/ لا تشكو من مشاكل أو أعراض ،  
f911c: التكلفة مرتفعة، f911d: الخدمة غير متوفرة، f911e: مشغولة/ الزوج مشغول، f911f:  
مخرجة، f911g: خائفة، f911h: أخرى مع التحدي.

تم اعتماد الترميز التالي: 1: في حالة الإجابة بنعم، 2: في حالة الرد بلا، 9: الإجابات الناقصة. (مهما كان المتغير الجزئي).



جدول رقم 187: توزيع النساء حسب أسباب عدم تلقي المسحة

f911	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f911a	97.36	0.00	2.64	2.64	0.00
f911b	97.36	0.00	2.64	2.64	0.00
f911c	97.36	0.00	2.64	2.64	0.00
f911d	97.36	0.00	2.64	2.64	0.00
f911e	97.36	0.00	2.64	2.64	0.00
f911f	97.36	0.00	2.64	2.64	0.00
f911g	97.36	0.00	2.64	2.64	0.00
f911h	97.36	0.00	2.64	2.64	0.00

بعد المعالجة، بلغت نسبة المعطيات الناقصة المستوى 2.64% من مجموع المعنيات في مختلف المتغيرات الجزئية المتعلقة بالسؤال العام f111.

9.6.2. معرفة النساء بالفحص الذاتي للثدي لاكتشاف أورام الثدي مبكرا (f912):

تم استجواب المبحوثات ( 2643 امرأة) عن معرفتهن لإجراء الفحص الذاتي بغية الكشف المبكر عن أورام الثديين. لهذا الغرض، أدرجت إجابتان لتلخيص المعطيات: نعم: الدليل 1، لا: الدليل 2، الإجابات الناقصة: الدليل 9.

بلغ عدد اللاتي هن على علم بإمكانية إجراء فحص ذاتي لاكتشاف أورام الثدي مبكرا 765 امرأة و يشير الجدول السابق إلى نسبة معطيات ناقصة وصلت المستوى 2.38% بين مجموع المعنيات بالسؤال. (الجدول رقم 188).

جدول رقم 188: توزيع النساء حسب معرفة النساء الفحص الذاتي للثديين لاكتشاف أورام الثدي

مبكرا

النسب المئوية	التكرار	f912
97.62	2580	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
2.38	63	ت- الإجابات الناقصة
2.38	63	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 10.6.2. الفحص الذاتي المنتظم للصدر (f913):

استجوبت السيدات (765 امرأة) حول إجراء الفحص الذاتي المنتظم للصدر ووظف الدليل 1 في حالة الفحص المنتظم و الدليل 2 في حالة الفحص المتذبذب و الدليل 3 عند عدم الفحص و عرف الدليل 9 الإجابات الناقصة.

جدول رقم 189: توزيع النساء حسب الفحص الذاتي للثدي بانتظام

النسب المئوية	التكرار	f913
98.82	756	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.18	9	ت- الإجابات الناقصة
1.18	9	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

سجلنا نسبة بسيطة من المعطيات الناقصة بلغت المقدار 1.18% بين مجموع المبحوثات في هذا السؤال.

### 11.6.2. إجراء فحص الثدي لاكتشاف الأورام مبكرا خلال الإثني عشرة شهرا الماضية

(f914):

أدرج هذا السؤال لمعرفة إقبال النساء (2643 امرأة) على إجراء فحص طبي للثدي من أجل اكتشاف الأورام مبكرا خلال 12 شهرا الأخيرة. تم حصر الحالات التالية:

1: اللاتي أقبلن على الفحص، 2: اللواتي لم يقمن بالفحص، 9: الإجابات الناقصة.

بلغ عدد اللواتي أجرين الفحص الطبي (للثدي) 117 امرأة (4.43%) و عدد اللاتي لم يقمن بالفحص 2459 امرأة (93.04%) و بلغت نسبة المعطيات الناقصة المقدار 2.53% بين مجموع المعنيات.

جدول رقم 190: توزيع النساء حسب إجراء الفحص الطبي للثدي لاكتشاف الأورام مبكرا خلال 12 شهرا الأخيرة

النسب المئوية	التكرار	f914
97.47	2576	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
2.53	67	ت- الإجابات الناقصة
2.53	67	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 12.6.2. مكان تلقي آخر فحص طبي للثدي (f915):

خص هذا السؤال النسوة اللاتي قمن بالفحص الطبي للثدي ( 117 امرأة). تم حصر الحالات

التالية:

الدليل 1: مستشفى/ مركز أمومة، 2: مصحة متعددة الخدمات/ مركز صحي، 3: مصحة خاصة، 4: لدى طبيب خاص، 6: أخرى (تحدد). أما الإجابات الناقصة فعرفت بالدليل 9. لم نسجل على هذا المتغير معطيات ناقصة.

جدول رقم 191: توزيع النساء حسب مكان تلقي آخر فحص طبي للثدي

النسب المئوية	التكرار	f915
100.00	117	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

### 13.6.2. تكلفة الفحص الطبي للثدي آخر مرة (f916):

سئلت النسوة اللاتي قمن بالفحص الطبي للثدي ( 117 امرأة) عن تكلفته آخر مرة و لتلخيص المعطيات خصصت أربعة خانات لتحديد سعر الفحص بالعملة المحلية. عرف الفحص المجاني بالدليل 995 و أخذت الإجابات غير المحددة الدليل 998. أما الإجابات الناقصة فتم تحديدها بالدليل 999.

جدول رقم 192: توزيع النساء حسب تكلفة الفحص الطبي للثدي آخر مرة

النسب المئوية	التكرار	f916
96.58	113	أ- الإجابات الموافقة للمجال
3.42	4	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
3.42	4	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

توزعت إجابات 78 امرأة على المجال [100 - 800 دينار] فيما تلقت 35 امرأة الفحص مجاناً و يشير الجدول رقم 192 إلى معطيات ناقصة قدرها 3.42% من مجموع المعنيات.

### 14.6.2. أسباب عدم تلقي الفحص الطبي للثدي خلال الإثني عشرة شهرا الماضية

(f917):

استجوبت النساء اللاتي لم يتلقين الفحص ( 2526 امرأة = 2459+67) عن أسباب تجنب الفحص الطبي للثدي خلال 12 شهرا الأخيرة. تعددت متغيرات السؤال الجزئية حسب الأسباب التي حالت دون تلقي النساء الفحص الطبي (خلال الإثني عشرة شهرا الأخيرة) على الشكل التالي:  
ليست على علم بأهمية الفحص ( f117a )، لم تشعر بالحاجة/ لا تشكو من مشاكل أو أعراض (f117b)، التكلفة مرتفعة (f117c)، الخدمة غير متوفرة (f117d)، مشغولة/ الزوج مشغول (f117e)، محرجة (f117f)، خائفة (f117g)، أخرى (مع التحدي) (f117h).

تم تبني الترميز: 1: نعم، 2 لا، 9 المعطيات الناقصة، مهما كان المتغير الجزئي.

جدول رقم 193: توزيع النساء حسب أسباب عدم تلقي الفحص الطبي للتدني خلال 12 شهرا الماضية

f917	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة= (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f917a	97.31	0.00	2.69	2.69	0.00
f917b	97.31	0.00	2.69	2.69	0.00
f917c	97.31	0.00	2.69	2.69	0.00
f917d	97.31	0.00	2.69	2.69	0.00
f917e	97.31	0.00	2.69	2.69	0.00
f917f	97.31	0.00	2.69	2.69	0.00
f917g	97.31	0.00	2.69	2.69	0.00
f917h	97.31	0.00	2.69	2.69	0.00

بعد المعالجة، بلغت نسبة المعطيات الناقصة في مختلف المتغيرات الجزئية المستوى 2.69% من بين مجموع المعنيات بالسؤال العام f917. قد لا تؤثر في نوعية المعطيات.

## 15.6.2. تعريض الثديين للأشعة (f918):

تم استجواب النسوة (2643 امرأة) عن إجراء الأشعة للتدنيين. تم حصر حالتين للإجابة:

1: في حالة تلقي الأشعة ، 2: في حالة النفي. أخذت الإجابات الناقصة الدليل 9.

بعد معالجة معطيات هذا المتغير، سجلنا 84 حالة تعرضت للأشعة على مستوى الثديين

و بلغت نسبة المعطيات الناقصة المقدار 2.35% بين مجموع المستجوبات.

جدول رقم 194: توزيع النساء حسب إجراء الأشعة على الثديين

النسب المئوية	التكرار	f918
97.65	2581	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
2.35	62	ت- الإجابات الناقصة
2.35	62	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

16.6.2. تاريخ آخر تعرض للأشعة على مستوى الثديين (المدة) (f919):

سئلت اللاتي تعرضن للأشعة ( 84 امرأة) عن تاريخ آخر تعرض لأشعة الثديين و صنفت

النساء حسب هذا المتغير على النحو التالي:

1 إذا قلت المدة عن سنة، 2 عندما تتراوح المدة بين سنة و سنتين، 3 إذا كانت المدة بين سنتين و خمس سنوات، 4 عندما تفوق المدة أكثر من خمسة سنوات، و أخذ المتغير القيمة 9 في حالة الإجابات الناقصة.

بعد المعالجة، تبين لنا وجود نسبة بسيطة من المعطيات الناقصة، بلغت القيمة 1.19% من مجموع المعنيات، لا تؤثر في قيمة المعطيات.

جدول رقم 195: توزيع النساء حسب المدة منذ إجراء آخر أشعة للثديين

النسب المئوية	التكرار	f919
98.81	83	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
1.19	1	ت- الإجابات الناقصة
1.19	1	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

17.6.2. مكان تلقي أشعة الثديين (آخر مرة) (f920):

سئلت النساء اللاتي تعرضن للأشعة ( 84 امرأة) عن مكان تلقي الخدمة في آخر مرة و تم

تبني الترميز التالي:

1: مستشفى/ مركز أمومة، 2: مصحة متعددة الخدمات/ مركز صحي، 3: مصحة خاصة، 4: لدى طبيب خاص، 5: مركز خاص للأشعة، 6: أخرى (تحدد)، 9: الإجابات الناقصة.

جدول رقم 196: توزيع النساء حسب مكان تلقي آخر أشعة

النسب المئوية	التكرار	f920
100.00	84	أ- الإجابات الموافقة للمجال
0.00	0	ب- الإجابات غير المحددة
0.00	0	ت- الإجابات الناقصة
0.00	0	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

تمت الإجابة على هذا السؤال بشكل تام . للإشارة، أكثر من 44% من النساء اجرين الأشعة عند خواص و 11.90% في مراكز متخصصة بالأشعة.

## 18.6.2. تكلفة الأشعة (آخر خدمة) (f921):

تم استجواب النساء ( 84 امرأة) عن كلفة إجراء آخر عملية (أشعة). خصصت أربعة خانوات لتحديد سعر إجراء الأشعة و حدد الدليل 9995 في حالة مجانية الأشعة و وظيف الدليل 9998 عند الإجابات غير المحددة و أخذ المتغير القيمة 9999 في حالة الإجابات الناقصة.

دخلت إجابات 54 حالة في المجال [ 400 - 3000 دينار] فيما تلقت 19 امرأة الأشعة بالمجان. سجلنا نسبة كبيرة للغاية من المعطيات الناقصة بلغت المستوى 13.10% بين مجموع المعنيات، قد تسيء لنوعية المعطيات.

جدول رقم 197: توزيع النساء حسب كلفة إجراء آخر أشعة على التديين

النسب المئوية	التكرار	f921
86.90	73	أ- الإجابات الموافقة للمجال
8.33	7	ب- الإجابات غير المحددة
4.77	4	ت- الإجابات الناقصة
13.10	11	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت)
0.00	0	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال

## 19.6.2. أسباب عدم إجراء الأشعة (f922):

استجوبت النساء اللاتي لم يتلقين الأشعة على مستوى الثديين (2559 امرأة) عن أسباب تجنب هذه الأشعة، بحيث اختلفت حسبها المتغيرات الجزئية على الشكل التالي:

f922a: لم يحين، f922b: ليست على علم بالأهمية، f922c: لم تشعر بالحاجة، f922d: ارتفاع التكلفة، f922e: الخدمة غير متوفرة، f922f: مشغولة/ الزوج مشغول، f922g: محرجة، f922h: خائفة، f922i: أسباب أخرى (مع التحديد). لهذا الغرض تم اعتماد الترميز التالي:

وظف الدليل 1 عند الإجابة بنعم للسبب و الدليل 2 عند الإجابة بالنفي، ووظف الدليل 9 عند الإجابات الناقصة.

بعد معالجة معطيات هذا السؤال، سجلنا نسب متواضعة من المعطيات الناقصة في مختلف المتغيرات الجزئية، بحيث بلغت المقدار 2.54% من بين مجموع الإجابات، قد لا تؤثر على جودة المعطيات.

جدول رقم 198: توزيع النساء حسب أسباب عدم إجراء الأشعة على الثديين

f922	أ- الإجابات الموافقة للمجال %	ب- الإجابات غير المحددة %	ت- الإجابات الناقصة %	ث- المعطيات الناقصة = (ب+ت) %	ج- الإجابات غير الموافقة للمجال %
f922a	97.46	0.00	2.54	2.54	0.00
f922b	97.46	0.00	2.54	2.54	0.00
f922c	97.46	0.00	2.54	2.54	0.00
f922d	97.46	0.00	2.54	2.54	0.00
f922e	97.46	0.00	2.54	2.54	0.00
f922f	97.46	0.00	2.54	2.54	0.00
f922g	97.46	0.00	2.54	2.54	0.00
f922h	97.46	0.00	2.54	2.54	0.00
f922i	97.46	0.00	2.54	2.54	0.00



### الفصل 3

#### اختبارات التوافق الداخلي أو الارتباط بين المتغيرات:

تستخدم هذه الاختبارات لفحص التوافق بين عدة متغيرات، اعتماداً على جداول مركبة ترتبط فيما بينها بعلاقة حقيقية أو منطقية. تمكننا هذه الاختبارات من كشف أخطاء التوافق بين عدة متغيرات، و هي اختبارات معقدة في بعض الحالات.

#### 1.3. النساء المؤهلات:

نظرياً، تبحث كل النساء المؤهلات (النساء غير العازبات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة) و للتحقق من هذه الفرضية، قمنا على أساس هذه الاختبارات و بناءً على ملفين، الأول ملف الأسرة وفق الشرط التالي: انتقاء النساء غير العازبات اللاتي ينتمين للفئة العمرية 15-49 سنة، الملف الثاني يخص النساء المبحوثات (ملف الخصوبة). بحيث يفترض أن يشمل الملفان نفس عدد الملاحظات. إذا مس المسح مجموع النساء المؤهلات للبحث على أرض الواقع نقول بجودة المعطيات و يترجم عدم التوافق خطأ الملاحظة.

بمقارنة الملفين نحصل على رابط يأخذ القيمتين ' 1 1'. تمثل الخانة الأولى ملف الخصوبة و تمثل الثانية ملف الأسرة (جدول رقم 199).

## جدول رقم 199: النساء المؤهلات

النسبة الصاعدة	التكرار الصاعد	النسبة المئوية	التكرار	الربط بين المتغيرات <sup>1</sup>
3.48	267	3.48	267	<b>1 .</b>
100.00	7666	96.52	7399	<b>1 1</b>

تمثل الصيغة '1' النساء المؤهلات اللاتي لم يتعرضن للبحث. لم يعط التقرير النهائي معدل غير المستجوبات المتعلق بفئة النساء 15-49 سنة، إلا أننا نقول أن المعطيات ذات نوعية جيدة لأن نسبة غير المستجوبات لم تبلغ سوى 3.48 % فقط (الجدول رقم 199).

2.3. التوافق الداخلي بين التمدرس و المستوى التعليمي:

يربط الجدول أدناه بين الوضعية بالنظر إلى التمدرس f104 (1: ممتدسة حالياً أو 2: درست سابقاً أو 3: عدم الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية) و أعلى مستوى دراسي عرفته المبحوثة f105 (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي) و آخر سنة أكملتها المبحوثة بنجاح f106 و تجاوز المرحلة الابتدائية f107 (1: لم تكمل الابتدائي، 2: أكملت الابتدائي).

جدول رقم 200: التوافق الداخلي بين حالة التمدرس و المستوى التعليمي

النسب المئوية	التكرار	الربط بين المتغيرات <sup>2</sup>
0.01	1	<b>1 0 1 1</b>
0.01	1	<b>1 1 1 1</b>
0.04	3	<b>1 2 1 1</b>
0.03	2	<b>1 3 1 1</b>
0.05	4	<b>1 4 1 1</b>
0.19	14	<b>1 5 1 1</b>
0.01	1	<b>2 6 1 1</b>

<sup>1</sup> الخانة 1: النساء المبحوثات في ملف الخصوبة، الخانة 2: النساء المؤهلات (النساء غير العازبات المنتميات لفئة العمرية [15 - 49 سنة] ملف الأسرة).

<sup>2</sup> الخانة 1: حالة التمدرس (1: نعم حالياً، 2: نعم في الماضي، 3: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: المستوى التعليمي (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: آخر سنة أكملت بنجاح (السنة 0 - السنة 9، 99: الإجابات الناقصة)، الخانة 4: إكمال الابتدائي (1: لم تكمل، 2: أكملت الابتدائي).

تمثل المعطيات المدرجة في الجدول أخطاء ملاحظة، بحيث صرحت 26 مبحوثة (0.35% فقط من مجموع المستجوبات) بأنهن متمدرسات حالياً في مختلف سنوات الابتدائي (f104) (من السنة 0 إلى السنة السادسة(6)) رغم انتمائهن للفئة العمرية 15-49 سنة. يفترض أن هذه الأعمار لا تسمح بالتمدرس بالمستوى الابتدائي، غير أن نسبة هؤلاء النسوة بسيطة (0.35%) قد لا تؤثر في نوعية المعطيات العامة.

### 3.3. التوافق الداخلي بين المستوى التعليمي و القدرة على القراءة و الكتابة:

طرح السؤال المتعلق بالقدرة على القراءة f108 (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة) و القدرة على الكتابة f108b (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة) على نسوة المستوى الابتدائي على الأكثر (غير المتمدرسات + نسوة المستوى الابتدائي). تم تحديد هذه الفئة بواسطة الدليل 1 (المستوى الابتدائي) في السؤال المرتبط بالمتغير f105 (المستوى التعليمي للمبحوثة).

جدول رقم 201: التوافق الداخلي بين المستوى التعليمي و القدرة على القراءة و الكتابة

ربط المتغيرات <sup>3</sup>	التكرار	%
.. 1	128	1.73

يحدد احتمال الإجابة '1'. فئة نسوة المستوى الابتدائي اللاتي لم تسأل عن القدرة على القراءة و الكتابة. يفترض أن تستجوب هذه الفئة في السؤالين: القدرة على القراءة و القدرة على الكتابة.

### 4.3. التوافق الداخلي بين القدرة على القراءة و وتيرة القراءة و وتيرة مشاهدة التلفزيون:

لخصت الإجابة عن السؤال المتعلق بالقدرة على القراءة f108 إما بالإيجاب (الدليل 1) أو بالنفي (الدليل 2) و تم إحالة النساء اللاتي لا يعرفن القراءة مباشرة على السؤال المتعلق بتيرة مشاهدة التلفزيون (f110) دون المرور على سؤالي القدرة على الكتابة (f108b) و وتيرة القراءة (f109).

<sup>3</sup> الخانة 1: المستوى التعليمي (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي)، الخانة 2: القدرة على القراءة (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: القدرة على الكتابة (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة).

بعد إجراء الاختبار تبين تحقيق الإحالة المعتمدة في الاستمارة (من السؤال f108 مباشرة إلى السؤال f110).

جدول رقم 202: التوافق الداخلي بين القدرة على القراءة و وتيرة القراءة و وتيرة مشاهدة التلفزيون

ربط المتغيرات <sup>4</sup>	التكرار	%
1 . . 2	2449	68.50
2 . . 2	484	13.54
3 . . 2	143	4.00
4 . . 2	496	13.87
9 . . 2	3	0.08

5.3. التوافق الداخلي في الإحالات بين الحالة المهنية الحالية و ممارسة أي نشاط و الحالة

المهنية في الماضي و القيام بأي عمل خلال 12 شهرا الماضية:

حصرت الإجابة على السؤالين المتعلقين بالحالة المهنية الحالية ( f112 ) و ممارسة أي نشاط (f113) في إكنايتين: الأولى 1: نعم و الثانية 2: لا. طلب من العائلات حاليا و الممارسات لنشاط نوع العمل الرئيسي (f116) دون التطرق للسؤالين: f114 (ممارسة عمل في الماضي) و f115 (القيام بأي عمل خلال 12 شهرا الأخيرة).

يبين الجدول رقم 203 تحقيق التوافق الداخلي بين هذه المتغيرات حسب الإحالة المعتمدة في الاستمارة.

للإشارة، بعد التطرق للإحالات المعتمدة في الاستمارة المتعلقة بملف الخصوبة لاحظنا أن كل الإحالات متوافقة داخليا و صحيحة.

<sup>4</sup> الخانة الأولى: القدرة على القراءة (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: القدرة على الكتابة (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: وتيرة القراءة (1: تقريبا يوميا، 2: مرة على الأقل في الأسبوع، 3: أقل من مرة في الأسبوع، 4: لا تقرأ على الإطلاق، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 4: وتيرة مشاهدة التلفزيون (1: تقريبا يوميا، 2: مرة على الأقل في الأسبوع، 3: أقل من مرة في الأسبوع، 4: لا تقرأ على الإطلاق، 9: الإجابات الناقصة).

جدول رقم 203: التوافق الداخلي في الإحالات بين الحالة المهنية الحالية و ممارسة أي نشاط و الحالة المهنية في الماضي و القيام بأي عمل خلال 12 شهرا الماضية

النسبة الصاعدة	%	التكرار الصاعد	التكرار	ربط المتغيرات <sup>5</sup>
8.92	8.92	660	660	. . . 1
11.12	2.20	823	163	. . . 1 2
12.06	0.93	892	69	1 1 2 2
16.65	4.60	1232	340	2 1 2 2
17.03	0.38	1260	28	9 1 2 2
99.65	82.62	7373	6113	. 2 2 2
99.76	0.11	7381	8	. 9 2 2
99.77	0.01	7382	1	1 1 9 2
99.81	0.04	7385	3	2 1 9 2
99.99	0.18	7398	13	. 2 9 2
100.00	0.01	7399	1	. 9 9 2

### 6.3. التوافق بين المستوى التعليمي و المهنة الرئيسية للمبحوثة (f105 و f116):

يمكننا هذا الاختبار من كشف الأخطاء المتعلقة بعدم ملائمة المستوى الدراسي مع المهنة الرئيسية المصرح بها. يأخذ المتغير f105 (المستوى التعليمي للمبحوثة) المداليل: 1(المستوى الابتدائي)، 2 (المستوى المتوسط)، 3 (المستوى الثانوي)، 4 (المستوى الجامعي). و مثل المتغير f116 المهنة الرئيسية للمبحوثة، و لتحديد المهن أستخدم ترميز دليل المكتب العالمي للعمل المعتمد لدى هيئة الأمم المتحدة، حيث يأخذ المتغير قيم المجال [111 - 933].

<sup>5</sup> الخانة 1: الحالة المهنية الحالية ( 1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: ممارسة أي نشاط (فلاحي أو تجاري) (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: ممارسة أي عمل في الماضي ( 1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 4: القيام بأي عمل خلال 12 شهرا الأخيرة (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة).

جدول رقم 204: التوافق الداخلي بين المستوى التعليمي للمبحوثة و مهنتها الرئيسية

ربط المتغيرات <sup>6</sup>	التكرار	%
122 .	1	0.01
131 .	2	0.03
221 .	2	0.03
222 .	1	0.01
122 1	1	0.01
231 1	1	0.01
241 1	1	0.01
112 2	1	0.01
122 2	1	0.01
131 2	2	0.03
222 2	2	0.03

تحدد الرموز التالية المهن الموافقة حسب الدليل:

112: إطار سامي في الإدارة (مدير مركزي بالوزارة).

122: إطار في مديرية متخصصة (مدير مصلحة إدارية و مالية).

131: مدير توجيه و مسير (مسير مؤسسة صناعية).

221: مختص في العلوم الحيوية (مختص في البيولوجيا، مختص في علم البكتيريا).

222: طبيب، صيدلي، طبيب أسنان، بيطري.

231: أستاذ جامعي.

241: مختص في الوظائف الإدارية و التجارية أو خبير في المحاسبة.

نلاحظ (الجدول رقم 204) أن بعض المبحوثات صرحن بعدم التمدرس (.) أو بكونهن من

ذوات المستوى الابتدائي (1) أو المتوسط (2)، لكن بالمقابل يشغلن مناصباً تتطلب مستويات تعليمية

أعلى (إطارات سامية (مدير مركزي بالوزارة، مدير أو مسير مؤسسة صناعية، مدير مصلحة إدارية

و مالية)) و بعضهن يشغل مهناً تتطلب مستوى علمياً عالياً (طبيب، صيدلي، أستاذ جامعي). سجلنا 15

<sup>6</sup> الخانة 1: المستوى التعليمي (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: العمل الرئيسي للمبحوثة (999، 933-111: الإجابات الناقصة).

حالة من الإجابات غير المتوافقة تمثل نسبة قدرها 0.20% فقط من مجموع المستجوبات. لا تؤثر هذه الأخطاء في جودة المعطيات.

### 7.3. التوافق الداخلي بين حالة تمدرس الزوج و مستواه التعليمي و آخر سنة أكملها بنجاح و الحصول على الشهادة الابتدائية و القدرة على القراءة:

يمكننا تجميع هذه المتغيرات من كشف بعض الأخطاء المتعلقة بقدرة الزوج على القراءة و مستواه الدراسي. قمنا ببناء اختبارات التوافق الداخلي بين المتغيرات ذات الصلة بالمستوى التعليمي (المستوى الدراسي، آخر سنة أكملت بنجاح، الحصول على الشهادة الابتدائية) و القدرة على القراءة. كما هو مبين في الجدول رقم 205.

أقرت بعض المبحوثات بعدم قدرة الزوج على القراءة رغم إكماله عدة سنوات دراسية بنجاح (كل الاحتمالات المدرجة في الجدول رقم 206). سجلنا 92 حالة تمثل نسبة قدرها 1.24% من المجموع، بحيث لا تؤثر في جودة المعطيات.

جدول رقم 205: التوافق الداخلي بين حالة تمدرس الزوج و مستواه التعليمي و آخر سنة أكملها بنجاح و الحصول على الشهادة الابتدائية و القدرة على القراءة

ربط المتغيرات <sup>7</sup>	التكرار	%
<b>2 1 4 1 1</b>	29	0.39
<b>9 1 4 1 1</b>	2	0.03
<b>2 1 5 1 1</b>	59	0.80
<b>2 1 6 1 1</b>	2	0.03

<sup>7</sup> الخانة 1: تمدرس الزوج (1: نعم، 2: لا، 8: لا تعرف، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة الثانية: أعلى مستوى تعليمي للزوج (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 8: الإجابات غير المحددة، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: آخر سنة أكملها بنجاح (1 - 12 سنة، 98: الإجابات غير المحددة، 99: الإجابات الناقصة)، الخانة 4: الحصول على الشهادة الابتدائية (1: لم يكمل الابتدائي، 2: أكمل الابتدائي أو أعلى)، الخانة 5: قدرة الزوج على القراءة (1: نعم، 2: لا، 8: الإجابات غير المحددة، 9: الإجابات الناقصة).

### 8.3. التوافق الداخلي بين المستوى التعليمي والمهنة الرئيسية للأزواج:

يهدف هذا الاختبار لكشف التناقض بين المستوى التعليمي للزوج f130 و المهنة الرئيسية التي يشغلها . كما أشرنا سابقا تم اعتماد الدليل المعمول به (ثلاثة أرقام : دليل المكتب العالمي للعمل ) حيث يأخذ المجال [111- 933]. قمنا بتحديد بعضها، بغية قراءة معطيات الجدول رقم 206.

- الدليل 121: مدير، 213: مهندس في الإعلام الآلي، 214: مهندس/ مهندس معماري، 233: أستاذ ثانوي مختص في البيداغوجيا، 242: محامي، وكيل جمهورية، بالإضافة إلى الرموز التي عرفناها سالفا أنظر في المحور السابق:
- 112: إطار سامي في الإدارة (مدير مركزي بالوزارة).
- 122: إطار في مديرية متخصصة (مدير مصلحة إدارية و مالية).
- 131: مدير توجيه و مسير (مسير مؤسسة صناعية).
- 221: مختص في العلوم الحيوية (مختص في البيولوجيا، مختص في علم البكتيريا).
- 222: طبيب، صيدلي، طبيب أسنان، بيطري.
- 231: أستاذ جامعي.
- 241: مختص في الوظائف الإدارية و التجارية أو خبير في المحاسبة.

نستنتج من الجدول رقم 206 أن بعض الأزواج لم يسبق لهم التمدرس (.) أو من ذوي المستوى الابتدائي (1) أو المتوسط و يشغلون بالمقابل مناصب تتطلب مستويات أعلى (مدراء، إطارات سامية) و بعضهم يشغل مهن تتطلب مستوى علمياً عالياً (أطباء، مهندسون، محامين، أساتذة). سجلنا 372 حالة عدم توافق بين المتغيرين مثلت النسبة 5.00% من المجموع، الشيء الذي قد يؤثر على جودة المعطيات.



جدول رقم 206: التوافق الداخلي بين المستوى التعليمي للزوج و مهنته الرئيسية

ربط المتغيرات <sup>8</sup>	التكرار	%
112 .	1	0.01
121 .	1	0.01
131 .	153	2.07
213 .	4	0.05
242 .	1	0.01
112 1	3	0.04
121 1	2	0.03
122 1	1	0.01
131 1	97	1.31
213 1	2	0.03
214 1	1	0.01
112 2	3	0.04
121 2	17	0.23
131 2	78	1.05
214 2	3	0.04
221 2	1	0.01
222 2	3	0.04
233 2	1	0.01

9.3. التوافق الداخلي بين وسط الإقامة (ريف/ حضر) و عدم تلقي الكشف عن الحمل

بسبب عدم توفر الخدمة:

يكشف هذا الاختبار عن الأخطاء في التصريح المتعلق بعدم الكشف عن الحمل بسبب عدم توفر الخدمة (عدم وجود: مستشفى/ مركز أمومة، مصحة/ مركز صحي، مصحة خاصة، طبيب خاص) و ذلك من خلال ربط محل إقامة المبحوثات بسبب عدم الكشف عن الحمل بداعي غياب الخدمة. أخذ المتغير المتعلق بمحل الإقامة (mstrate) القيمتان: 1: إذا كان وسط الإقامة حضري، 2: عندما يكون وسط الإقامة ريفي. كما حدد الدليل 3 بالنظر إلى المتغير f235: عدم الكشف عن الحمل بسبب غياب الخدمة.

<sup>8</sup> الخانة 1: المستوى التعليمي للزوج ( 1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 8: الإجابات غير المحددة، 9: الإجابات الناقصة )، الخانة 2: المهنة الرئيسية للزوج (111- 933، 996: بطال، 998: لا تعرف، 999: الإجابات الناقصة).

يشير الجدول رقم 207 إلى وجود حالة واحدة مقيمة بالوسط الحضري و صرحت في المقابل بعدم الكشف عن الحمل لسبب غياب الخدمة، مثلت نسبة قدرها 0.01% فقط من المجموع، لا تؤثر على مصداقية المعطيات.

جدول رقم 207: التوافق الداخلي بين وسط الإقامة (ريف/حضر) و عدم تلقي الكشف عن الحمل بسبب عدم توفر الخدمة

النسبة الصاعدة	التكرار الصاعد	%	التكرار	ربط المتغيرات <sup>9</sup>
57.43	4249	57.43	4249	<b>1</b>
58.14	4302	0.72	53	<b>1 1</b>
58.39	4320	0.24	18	<b>2 1</b>
58.40	4321	0.01	1	<b>3 1</b>
58.64	4339	0.24	18	<b>4 1</b>
58.74	4346	0.09	7	<b>5 1</b>
59.18	4379	0.45	33	<b>6 1</b>
59.24	4383	0.05	4	<b>9 1</b>
98.39	7280	39.15	2897	<b>2</b>
98.93	7320	0.54	40	<b>1 2</b>
99.12	7334	0.19	14	<b>2 2</b>
99.30	7347	0.18	13	<b>3 2</b>
99.59	7369	0.30	22	<b>4 2</b>
99.66	7374	0.07	5	<b>5 2</b>
99.91	7392	0.24	18	<b>6 2</b>
100.00	7399	0.09	7	<b>9 2</b>

10.3. التوافق الداخلي بين عدد الولادات الحية للمبحوثة و عدم تلقيها الكشف عن الحمل

بسبب خبرتها السابقة:

قمنا بوضع هذا الاختبار لكشف عدم التوافق بين عدد الولادات الحية (f208) و تصريحها بعدم الكشف عن الحمل (المنتهي بولادة غير حية) لسبب خبرتها السابقة. يأخذ المتغير f235 القيمة 2 إذا تمثل سبب عدم الكشف عن الحمل في وجود خبرة سابقة للمبحوثة.

<sup>9</sup> الخانة 1: وسط الإقامة (1: حضري، 2: ريفي)، الخانة 2: سبب عدم الكشف عن الحمل (1: عدم وجود متاعب، 2: لديها خبرة سابقة، 3: الخدمة غير موجودة، 4: التكلفة مرتفعة، 5: مشغولة/ الزوج مشغول، 6: أخرى (تحدد)، 9: الإجابات الناقصة).

يبين الجدول رقم 208 أن النسوة المصريحات بعدم الكشف عن الحمل كان بسبب خبرتهن و هو ما يعكس التوافق بين المتغيرين (f208 و f235).

جدول رقم 208: التوافق الداخلي بين عدد الولادات الحية للمبحوثة و عدم الكشف عن الحمل بسبب

اكتساب الخبرة سابقاً

النسبة الصاعدة	التكرار الصاعد	%	التكرار	ربط المتغيرات <sup>10</sup>
3.13	1	3.13	1	<b>1 2</b>
21.88	7	18.75	6	<b>2 2</b>
37.50	12	15.63	5	<b>3 2</b>
46.88	15	9.38	3	<b>4 2</b>
59.38	19	12.50	4	<b>5 2</b>
68.75	22	9.38	3	<b>6 2</b>
75.00	24	6.25	2	<b>7 2</b>
87.50	28	12.50	4	<b>8 2</b>
93.75	30	6.25	2	<b>9 2</b>
100.00	32	6.25	2	<b>10 2</b>

11.3. التوافق الداخلي بين عدد الولادات الحية للمبحوثة و عدم طلب استشارة طبية

بالنظر إلى الأعراض (المدرجة في السؤال f238) بسبب خبرتها السابقة:

يكشف هذا الاختبار عدم التوافق بين تصريحات النسوة بعدم طلب الاستشارة الطبية بسبب

اكتساب التجربة (حصلن على ولادات حية في الماضي) و عدد الولادات الحية لدى المبحوثة.

مثل المتغير f241 أسباب عدم تلقي الاستشارة الطبية ( 1: لا يشكل مشكلة ، 2: لديها تجربة

سابقة، 3: الخدمة غير متوفرة، 4: التكلفة مرتفعة، 5: مشغولة/ الزوج مشغول ، 6: استعملت علاج

غير طبي ، 96: أخرى (تحدد)، 99: الإجابات الناقصة) كما مثل المتغير f208 عدد ولادات

المبحوثات، حيث أخذ المتغير قيم المجال [0 - 16 طفلاً].

<sup>10</sup> الخانة 1: أسباب عدم الكشف عن الحمل ( 1: عدم وجود متاعب، 2: لديها خبرة سابقة، 3: الخدمة غير موجودة، 4: التكلفة مرتفعة، 5: مشغولة/ الزوج مشغول، 6: أخرى (تحدد)، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: عدد الولادات الحية [0 - 16 طفلاً].

يفترض أن يكون التصريح بعدم الاستشارة الطبية لسبب اكتساب الخبرة مرافقا لولادات حية حصلت عليها المبحوثة طوال حياتها الإنجابية.

نستنتج من خلال الجدول رقم 209 أن هناك توافق في التصريحات بين المتغيرين حيث أن لكل النسوة المصرحات باكتسابهن الخبرة ولادتين حيتين على الأقل.

جدول رقم 209: التوافق الداخلي بين عدد الولادات الحية للمرأة و عدم الاستشارة حول الأعراض

بسبب تجربتها السابقة

النسبة الصاعدة	التكرار الصاعد	%	التكرار	ربط المتغيرات <sup>11</sup>
14.29	1	14.29	1	<b>2 2</b>
28.57	2	14.29	1	<b>3 2</b>
57.14	4	28.57	2	<b>4 2</b>
71.43	5	14.29	1	<b>5 2</b>
85.71	6	14.29	1	<b>8 2</b>
100.00	7	14.29	1	<b>9 2</b>

### 12.3. التوافق الداخلي بين حالة الحمل و الحالة الزوجية للمرأة:

يرتكز التوافق الداخلي بين الحالة الزوجية للمبحوثة ( f140 ) و الحالة الحالية للحمل ( f242 ) على أن تكون كل النسوة الحاملات متزوجات حالياً. يأخذ المتغير f140 القيمة 1 إذا كانت المرأة متزوجة حالياً (متزوجة/ منفصلة) و القيمة 2 إذا كانت غير متزوجة حالياً (مطلقة/ أرملة) و أخذ المتغير f242 القيمة 1: في حالة وجود حمل و القيمة 2: إذا كانت المرأة غير حامل حالياً و القيمة 8: إذا كانت غير متأكدة من الحمل.

يشير الجدول رقم 210 إلى وجود ثلاثة نسوة حوامل رغم أنهن غير متزوجات حالياً (مطلقات/ أرامل)، ما يفسر عدم التوافق بين المتغيرين إلا في حالة طلاقهن أو ترملهن حديثاً. رغم هذا فإن ثلاث حالات تمثل عدداً بسيطاً لا يؤثر على جودة المعطيات.

<sup>11</sup> الخانة 1: أسباب عدم الاستشارة الطبية عن الأعراض ( 1: لا يشكل مشكلة، 2: لديها تجربة سابقة، 3: الخدمة غير متوفرة، 4: التكلفة مرتفعة، 5: مشغولة/ الزوج مشغول، 6: استعملت علاج غير طبي، 96: أخرى (تحدد)، 99: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: عدد الولادات الحية [0 - 16 طفلاً].

جدول رقم 210: التوافق الداخلي بين حالة الحمل و الحالة الزوجية

التكرار	ربط المتغيرات <sup>12</sup>
3	<b>2 1</b>

13.3. التوافق الداخلي بين حالة الدورة الشهرية و عمر المرأة بالسنوات:

صرحت بعض النسوة بانقطاع الدورة الشهرية ( f245 ) بسبب بلوغهن سن اليأس (يأخذ المتغير f245 القيمة 2: إذا كان سن اليأس سبب انقطاع الدورة الشهرية)، ربطنا هذا المتغير بمتغير عمر المبحوثة بالسنوات (f103) لأجل اختبار توافق عمر المرأة مع بلوغ سن اليأس.

جدول رقم 211: التوافق الداخلي بين حالة الدورة الشهرية و عمر المرأة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>13</sup>
1	<b>24 2</b>
1	<b>27 2</b>
1	<b>29 2</b>
1	<b>30 2</b>
1	<b>32 2</b>
1	<b>33 2</b>
1	<b>34 2</b>
1	<b>35 2</b>
2	<b>36 2</b>
3	<b>37 2</b>
3	<b>38 2</b>
3	<b>39 2</b>
10	<b>40 2</b>
6	<b>41 2</b>
17	<b>42 2</b>
14	<b>43 2</b>
18	<b>44 2</b>

<sup>12</sup> الخانة 1: الحالة الحالية للحمل ( 1: نعم، 2: لا، 8: غير متأكدة، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: الحالة الزوجية الحالية للمبحوثة ( 1: متزوجة (متزوجة، منفصلة)، 2: غير متزوجة (مطلقة، أرملة)).

<sup>13</sup> الخانة الأولى: حالة الدورة الشهرية ( 1: نعم، 2: سن اليأس، 3: فترة نفاس، 4: لم تحض أبداً، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة الثانية: عمر المرأة بالسنوات (15 – 49 سنة).

يبدأ عموماً سن اليأس مع العمر الخامس و الأربعين كحد أدنى و قد يمتد حتى سن الرابعة و الخمسين كحد أقصى، و ذلك حسب النسوة، و نمط المعيشة.

يبين الجدول رقم 211 وجود نسوة تراوحت أعمارهن بين 24 و 40 سنة ممن صرحن بانقطاع الدورة الشهرية لديهن بسبب بلوغهن سن اليأس. بلغ عدد هؤلاء النسوة 84 حالة من بين 391 امرأة، يمثل نسبة قدرها 21.48%.

### 14.3. التوافق الداخلي بين الحالة بالنظر إلى الدورة الشهرية و الوضعية بالنظر للحمل:

لكشف الأخطاء المتعلقة بعدم التوافق بين المتغير المتعلق الدورة الشهرية (f245) و متغير حالة الحمل (f242) ربطنا النساء النفساء ( =f242 3) بالنسوة الحوامل أو غير المتأكدات من الحمل (f245 = 2 أو = 8). من المفروض أن تكون النسوة النفساء غير معنيات بالسؤال الخاص بالحمل. سجلنا خمسة نسوة غير متأكدات من حالة الحمل و 298 مبحوثة أجابت بلا (غير حوامل حالياً) من بين 6770 مستجوبة رغم وجودهن في حالة نفاس، وافقت هذه الحالات ( 05 غير متأكدات) نسبة قدرها 0.07% بين مجموع المعنيات، لا تؤثر على نوعية المعطيات (الجدول رقم 212).

### جدول رقم 212: التوافق الداخلي بين حالة الدورة الشهرية و حالة الحمل

التكرار	ربط المتغيرات <sup>14</sup>
298	<b>2 3</b>
5	<b>8 3</b>

### 15.3. التوافق الداخلي بين الكشف عن المرض المزمن من طرف طبيب و تناول العلاج

بصفة مستمرة:

يهدف هذا الاختبار لكشف التناقض بين التصريح في الإجابة عن سؤال الكشف عن المرض المزمن من طرف طبيب ( a, ..., f504a: 1: نعم، 2: سن اليأس، 3: فترة نفاس، 4: لم تحض أبداً، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: حالة الحمل الحالية (1: نعم، 2: لا، 8: غير متأكدة، 9: الإجابات الناقصة).

<sup>14</sup> الخانة 1: حالة الدورة الشهرية ( 1: نعم، 2: سن اليأس، 3: فترة نفاس، 4: لم تحض أبداً، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: حالة الحمل الحالية (1: نعم، 2: لا، 8: غير متأكدة، 9: الإجابات الناقصة).

العلاج بصفة مستمرة أو منتظمة ( f506a,...., 1 ) (1: نعم، 2: لا))، بحيث يفترض أن تكون النساء المتناولات علاج الأمراض المزمنة بصفة منتظمة قد كُشفن عن المرض لدى طبيب (تناول العلاج بانتظام وفق وصفة طبية).

يبين الجدول رقم 213 تصريح بعض النسوة ( 11 حالة) بعدم الكشف عن الأمراض المزمنة لدى طبيب من جهة و تناول العلاج بصفة منتظمة من جهة أخرى، غير أن هذا الرقم البسيط لا يؤثر على مصداقية المعطيات.

جدول رقم 213: التوافق الداخلي بين الكشف عن المرض المزمن من طرف طبيب و تناول العلاج بصفة مستمرة

اسم المرض المزمن	عدد المعنيات	ربط المتغيرات <sup>15</sup>	التكرار	%
ضغط الدم f506c * f504c	369	<b>1 2</b>	3	0.81
أمراض القلب f506e * f504e	114	<b>1 2</b>	1	0.88
أمراض المفاصل f506f * f504f	265	<b>1 2</b>	2	0.75
أمراض الكلى f506h * f504h	113	<b>1 2</b>	1	0.88
الأنيميا f506j * f504j	148	<b>1 2</b>	1	0.68
مرض مزمن آخر f506l * f504l	524	<b>1 2</b>	3	0.57

16.3. التوافق الداخلي بين سبب عدم الاستشارة الطبية إثر الإحساس بثقل أسفل البطن

كنتيجة للحمل (بسبب غياب الخدمة) و وسط الإقامة (حضري، ريفي):

استهدف هذا الاختبار النساء اللواتي صرحن بعدم الاستشارة الطبية عند الإحساس بثقل أسفل البطن كنتيجة للحمل لسبب غياب الخدمة (f515c=1) رغم إقامتهن بالوسط الحضري (mstrate=1).

سجلنا بعد إجراء الاختبار 9 سيدات مقيمات بالوسط الحضري و كان غياب الخدمة سبب عدم استشارتهن الطبية عند الإحساس بثقل أسفل البطن كنتيجة للحمل (الجدول 214). يفترض أن تتوفر المناطق الحضرية على المرافق الصحية الضرورية (مستشفى، مركز صحي، مستوصف، عيادة خاصة). وافق عدد هذه الحالات النسبة 5.14% بين مجموع المعنيات بالسؤال f515c.

<sup>15</sup> الخانة 1: الكشف عن المرض المزمن عند طبيب (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: تناول العلاج بانتظام (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة).

جدول رقم 214: التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية إثر الإحساس بثقل أسفل البطن كنتيجة

للحمل بسبب غياب الخدمة و وسط الإقامة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>16</sup>
9	<b>1 1</b>

17.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية حول مشكلة عدم التحكم في البول

لاعتقاد النسوة أن ذلك لا يساعد (1 = f518a) و مستوى التعليم (1 > f105):

يهدف هذا الاختبار لكشف أخطاء عدم توافق الإجابات بين عدم الاستشارة الطبية (عدم التحكم في البول) للاعتقاد بأن ذلك لا يساعد (1 = f518a) و مستوى تعليم المبحوثة (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي). من المفروض أن يرفع مستوى تعليم المرأة من درجة الوعي و الثقافة الصحية.

جدول رقم 215: التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند عدم التحكم في البول اعتقاداً أن ذلك

لن يساعد و مستوى تعليم المرأة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>17</sup>
11	<b>2 1</b>
7	<b>3 1</b>

نلاحظ أن بعض النساء ذوات المستوى المتوسط و الثانوي ( 11 حالة من المستوى المتوسط و 7 حالات من المستوى الثانوي) ما يفرض عليهن الوعي بأهمية الاستشارة الطبية حول مشكلة عدم التحكم في البول اعتقدن أن الاستشارة الطبية لن تساعد في حل المشكلة. بلغت نسبة هذه الحالات المقدار 6.26% بين مجموع المستجوبات في السؤال f518a (272 امرأة).

<sup>16</sup> الخانة الأولى: أسباب عدم الاستشارة الطبية للإحساس بثقل أسفل البطن ( 1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة الثانية: وسط الإقامة (1: حضري، 2: ريفي).

<sup>17</sup> الخانة الأولى: عدم الاستشارة بسبب أنها لا تعتقد أن ذلك يساعد ( 1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة الثانية: المستوى التعليمي ( 1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة).



### 18.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند عدم التحكم في البول لغياب الخدمة (1=f518c) و وسط الإقامة (1=mstrate):

يكشف هذا الاختبار عدم التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية بالنظر إلى مشكلة عدم التحكم في البول، نتيجة للحمل لغياب الخدمة (1=f518c) و وسط الإقامة (1: حضري، 2: ريفي)، بحيث يفترض أن توفر المناطق الحضرية أدنى المرافق الصحية.

بعد المعالجة، تبين وجود ثلاث سيدات مقيمات بالوسط الحضري أرجعن سبب عدم الاستشارة الطبية عند مجابهة مشكلة عدم التحكم في البول إلى غياب الخدمة. يمثل هذا العدد نسبة قدرها 1.10% من مجموع المستجوبات المعنيات بالسؤال f518 (272 امرأة)، إلا أن هذه النسبة لا تؤثر على جودة المعطيات.

### جدول رقم 216: التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند عدم التحكم في البول نظراً لغياب الخدمة و وسط الإقامة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>18</sup>
3	<b>1 1</b>

### 19.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند مجابهة مشاكل (هرش أو حساسية، إفرازات ذات رائحة كريهة، آلام أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية) بسبب انشغالها/ انشغال الزوج و الحالة المهنية للمبحوثة و لزوجها:

ربطنا بين متغير عدم الاستشارة الطبية عند مجابهة هذه المشاكل و كون المرأة مشغولة أو زوجها مشغول (1=f523d) و الحالة المهنية للمبحوثة (لا تعمل: 2=f112) و الحالة المهنية للزوج (بطل: 996=f135). يفترض أن يكن المبحوثات (414 امرأة) اللاتي لم يطلبن استشارة طبية كونهن مشغولات أو أزواجهن مشغولون من العاملات أو أزواجهن من العمال.

<sup>18</sup> الخانة 1: عدم الاستشارة حول مشكل عدم التحكم في البول بسبب غياب الخدمة (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: وسط الإقامة (1: حضري، 2: ريفي).

بعد المعالجة، سجلنا وجود حالتين لا تعملان و لا أزواجهما رغم ردهن عدم الاستشارة لظروف الانشغال. يشكل هذا العدد (حالتان) نسبة قدرها 0.48% من مجموع مستجوبات السؤال f523. لا تؤثر هذه النسبة البسيطة على مصداقية المعطيات.

جدول رقم 217: التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند مجابهة مشاكل (هرش أو حساسية، إفرازات ذات رائحة كريهة، آلام أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية) لانشغالهن/ انشغال أزواجهن و الحالة المهنية للمبحوثة و الحالة المهنية لزوجها

التكرار	ربط المتغيرات <sup>19</sup>
2	<b>996 2 1</b>

20.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند ظهور بعض المشاكل (هرش أو حساسية، إفرازات ذات رائحة كريهة، آلام أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية) بسبب انعدام الخدمة و وسط الإقامة:

يظهر لنا هذا الاختبار عدم التوافق بين ظاهرة عدم الاستشارة الطبية عند ظهور الأعراض المذكورة لغياب الخدمة (الخدمة غير متوفرة: 1=f523c) و متغير وسط الإقامة (الوسط الحضري: mstrate=1) اعتماداً على فرضية وفرة الخدمات الصحية الأساسية في المناطق الحضرية.

جدول رقم 218: التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية لغياب الخدمة و محل الإقامة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>20</sup>
6	<b>1 1</b>

<sup>19</sup> الخانة 1: عدم الاستشارة بسبب شغل المرأة و زوجها ( 1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: الحالة المهنية للمبحوثة ( 1: تعمل، 2: لا تعمل، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: مهنة الزوج (111-933، 996: بطال، 998: لا تعرف، 999: الإجابات الناقصة).

<sup>20</sup> الخانة 1: عدم الاستشارة الطبية لمشاكل'هرش أو حساسية، إفرازات ذات رائحة كريهة، آلام أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية بسبب غياب الخدمة (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: وسط الإقامة (1: ريفي، 2: حضري).

يبين الجدول رقم 218 وجود ست (06) نسوة يقمن بالوسط الحضري (mstrate=1) لكنهن أرجعن سبب عدم طلب الاستشارة الطبية لغياب الخدمة (f523c=1). يمثل هذا العدد (6) نسبة بسيطة قدرها 1.45% من مجموع المعنيات بالسؤال الجزئي f523c.

### 21.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة للاعتقاد أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي:

يمكننا الاختبار من عد النساء اللاتي لم يطلبن استشارة عند ظهور بعض المشاكل المذكورة لاعتقادهن بعدم أهمية ذلك (f523a= 1)، رغم امتلاكهن مستوى تعليمياً متوسطاً أو ثانوياً أو جامعياً (f105>1: متوسط على الأقل). من المنطقي أن تكون النسوة المتعلمات على درجة من الوعي و من الثقافة الصحية و الوقائية.

سجلنا 14 حالة (09 مستوى متوسط، 04 مستوى ثانوي و واحدة من المستوى الجامعي) ربطت عدم الاستشارة الطبية باعتقادهن أن ذلك لا يساعد في حل المشاكل، تمثل نسبة هؤلاء المقدار 3.38% بين مجموع المستجوبات في السؤال الجزئي f523a.

جدول رقم 219: التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة (هرش أو حساسية، إفرازات ذات رائحة كريهة، آلام أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية) للاعتقاد أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي

التكرار	ربط المتغيرات <sup>21</sup>
9	<b>1 2</b>
4	<b>1 3</b>
1	<b>1 4</b>

<sup>21</sup> الخانة 1: عدم الاستشارة الطبية على مشاكل هرش أو حساسية، إفرازات ذات رائحة كريهة، آلام أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية بسبب أنها لا تعتقد أن ذلك يساعد (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: المستوى التعليمي (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة).

### 22.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة بغية الحمل للاعتقاد أن ذلك لا يساعد

#### و المستوى التعليمي:

يمكننا ربط متغير المستوى التعليمي ( $f105 > 1$ ) بمتغير عدم الاستشارة الطبية بغرض الحمل بسبب الاعتقاد أن ذلك لا يساعد ( $1=f531a$ ) من كشف عدم التوافق بين المتغيرين. يفترض أن يكون المستوى التعليمي المقبول عاملاً يساعد على البحث في مشكل فشل الحصول على حمل.

نلاحظ من خلال الجدول رقم 220 وجود 28 امرأة أرجعن عدم الاستشارة الطبية للاعتقاد بأن ذلك لا يساعد رغم بلوغهن مستويات تعليمية متفاوتة ( 14 من المستوى المتوسط، 09 من المستوى الثانوي، 05 من المستوى الجامعي) تمنحهن الوعي الصحي الكافي لإدراك أهمية الاستشارة الطبية في حل هذا المشكل. يمثل هذا العدد ( 28 حالة) نسبة كبيرة من المستجوبات في سؤال أسباب عدم طلب الاستشارة الطبية، حيث بلغت المستوى 22.4% من مجموع المعنيات بالسؤال (125 معنية)، التي قد تؤثر في نوعية المعطيات.

#### جدول رقم 220: التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة للاعتقاد أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي

التكرار	ربط المتغيرات <sup>22</sup>
14	<b>2 1</b>
9	<b>3 1</b>
5	<b>4 1</b>

### 23.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (بغية الحمل) لانشغال الزوج أو الزوجة

#### و الحالة المهنية للمبحوثة و لزوجها:

يستهدف هذا الاختبار النسوة اللاتي كان شغلن أو شغل أزواجهن سبباً في عدم الاستشارة الطبية، بحيث ربطنا هذا المتغير ( $1=f531d$ ) بمتغير الحالة المهنية للمبحوثة (لا تعمل:  $2=f112$ ) و بمتغير مهنة الزوج (بطل:  $135=f996$ ). من المفروض أن تكون النساء غير المستشيريات لانشغالهن أو كون أزواجهن مشغولين عاملات أو أن يكون بعولتهن عمالاً.

<sup>22</sup> الخانة 1: عدم الاستشارة الطبية للحصول على حمل بسبب الاعتقاد أن ذلك لا يساعد ( 1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: المستوى التعليمي (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة).

سجلنا حالة واحدة لا تعمل (2=f112) و زوجها بطل (996=f135) و مع ذلك أرجعت عدم طلب الاستشارة إلى انعدام الوقت لذلك (1=f531d). مثل هذا العدد (حالة واحدة) النسبة 0.80% من مجموع المعنيات بالسؤال الجزئي f531d (125 مبحوثة).

جدول رقم 221: التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية بغية الحمل بسبب شغل المرأة أو زوجها و الحالة المهنية لكليهما

التكرار	ربط المتغيرات <sup>23</sup>
1	<b>1 996 2</b>

24.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية عند التعرض لمشاكل الدورة الشهرية بسبب غياب الخدمة و وسط الإقامة:

تعذرت بعض المستجوبات بغياب الخدمة لعدم طلب الاستشارة الطبية ( نزيه الدورة دام أكثر من 7 أيام، كثافة الدورة بشكل غير معتاد ، آلام حادة أو مقعدة، الدورة غير منتظمة ) (1=f537c)، غير أن سبب عدم توفر الخدمة غير واقعي إذا كانت إقامة النساء بالوسط الحضري (1=mstrate).

يشير الجدول رقم 222 لوجود ثمانية نساء يقمن بالوسط الحضري و صرحن بعدم الاستشارة الطبية لغياب الخدمة. مثلن نسبة بلغت المقدار 1.91% من مجموع المستجوبات (418 معنية بالسؤال الجزئي f537c).

جدول رقم 222: التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) بسبب غياب الخدمة و وسط الإقامة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>24</sup>
8	<b>1 1</b>

<sup>23</sup> الخانة 1: الحالة المهنية للمرأة ( 1: تعمل، 2: لا تعمل، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: مهنة الزوج (111-933، 996: بطل، 998: لا تعرف، 999: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: عدم الاستشارة بسبب أنها مشغولة/ الزوج مشغول (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة).

<sup>24</sup> الخانة 1: عدم الاستشارة الطبية لمشاكل الدورة الشهرية بسبب غياب الخدمة ( 1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: وسط الإقامة (1: حضري، 2: ريفي).

### 25.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) بسبب شغل

المرأة أو زوجها و الحالة المهنية للمبحوثة و مهنة الزوج:

ربطنا متغير عدم الاستشارة لانشغال المرأة أو زوجها (  $f_{537d} = 1$  ) بمتغيري الحالة المهنية للمرأة (  $f_{112} = 2$  ) و مهنة الزوج (  $f_{135} = 996$  ) لكشف التناقض في التصريحات. يفترض أن تكون المتسببات بشغلها أو شغل زوجها في عدم الاستشارة الطبية لحل مشاكل الدورة الشهرية عاملات أو أزواجهن عمال.

سجلنا بعد إجراء الاختبار حالتين قدمتا انشغالهما أو انشغال أزواجهما كسبب لعدم الاستشارة الطبية رغم أنهما من غير العاملات و أزواجهما بطلان. مثل هذا العدد البسيط نسبة قدرها 0.48% من مجموع المعنيات (418 امرأة).

جدول رقم 223: التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) بسبب الشغل

(المرأة/ زوجها) و الحالة المهنية للمبحوثة و مهنة الزوج

التكرار	ربط المتغيرات <sup>25</sup>
2	<b>996 2 1</b>

### 26.3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) بسبب الاعتقاد

أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي:

يفرض المستوى التعليمي على أي شخص درجة من الوعي الصحي. يربط الجدول رقم 225 متغير عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) للاعتقاد أن ذلك لا يساعد (  $f_{537a} = 1$  ) بمتغير المستوى التعليمي (  $f_{105} < 1$  ).

بعد إجراء الاختبار (الجدول رقم 224) صرحت 47 حالة من مستويات تعليمية متفاوتة ( 23

حالة من المستوى المتوسط، 22 حالة من المستوى الثانوي، حالتين من المستوى الجامعي) بعدم

<sup>25</sup> الخانة 1: عدم الاستشارة الطبية لمشاكل الدورة الشهرية بسبب الشغل (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: الحالة المهنية للمرأة (1: تعمل، 2: لا تعمل، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: مهنة الزوج (111-933، 996: بطلان، 998: الإجابات غير المحددة، 999: الإجابات الناقصة).

الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) لا اعتقادهم أن ذلك لا يساعد. مثلت هذه الحالات نسبة قدرها 11.24% من مجموع المعنيات بالسؤال الجزئي f537a (418 امرأة)، قد تسيء لنوعية المعطيات.

جدول رقم 224: التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية) بسبب الاعتقاد أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي للمبحوثة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>26</sup>
23	<b>2 1</b>
22	<b>3 1</b>
2	<b>4 1</b>

27.3. التوافق الداخلي بين عائق عدم معرفة المرأة مكان تلقي الرعاية الطبية و المستوى

التعليمي:

استجوبت النسوة ( 7399 امرأة) عن العوامل التي تشكل إعاقة في تلقي الرعاية الطبية أو العلاج عندما تكون هناك مشكلة صحية (مرض). كان عائق عدم معرفة أين تذهب من بين هذه العوامل، حيث اقترحت ثلاث إمكانيات للإجابة: 1: تشكل عائقاً كبيراً، 2: لا تشكل عائقاً كبيراً، 3: لا تشكل عائقاً. ربطنا هذا العامل ( f539a=1: تشكل عائقاً كبيراً) بمتغير مستوى المرأة التعليمي (f105>1).

يفترض أن تكون للمتعلقات درجة من المعرفة تمكنهن من تجاوز الإعاقة المذكورة (عدم معرفة وجهة الذهاب).

بعد المعالجة، تم تسجيل 132 حالة من ذوات المستوى التعليمي المقبول (85 حالة من المستوى المتوسط و 45 من المستوى الثانوي و اثنتان من المستوى الجامعي) شكل عدم معرفتهن مكان تلقي الرعاية الطبية عائقاً كبيراً. وافق هذا العدد (132 حالة) النسبة 1.78% من المجموع، قد لا تؤثر في مصداقية البيانات.

<sup>26</sup> الخانة 1: عدم الاستشارة الطبية لمشاكل الدورة الشهرية بسبب أنها لا تعتقد أن ذلك يساعد ( 1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: المستوى التعليمي للمبحوثة (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة).

جدول رقم 225: التوافق الداخلي بين عائق عدم معرفة المرأة مكان تلقي الرعاية الطبية و المستوى

التعليمي

التكرار	ربط المتغيرات <sup>27</sup>
85	<b>2 1</b>
45	<b>3 1</b>
2	<b>4 1</b>

28.3. التوافق الداخلي بين عائق الحصول على المال لتلقي الرعاية الطبية و حالة

الاستقرار المهني للمرأة:

شملت عوامل الإعاقة في تلقي الرعاية الطبية الحصول على المال للكشف و العلاج، حيث اقترحت إمكانيات الإجابة على النحو التالي: 1: تشكل عائقاً كبيراً، 2: لا تشكل عائقاً كبيراً، 3: لا تشكل عائقاً. ربطنا هذا المتغير في الحالة  $1=f539c$  (تشكل عائقاً كبيراً) مع متغير حالة الاستقرار المهني للمبحوثة (  $1=f118$ : عمل مستقر). يفترض أن لا يشكل الحصول على المال للكشف و العلاج عائقاً لتلقي الرعاية الطبية لدى المستقرات مهنياً.

سجلنا 190 مبحوثة مستقرة مهنياً شكل لديها الحصول على المال للكشف و العلاج عائقاً كبيراً في تلقي الرعاية الطبية. يمثل هذا العدد (190 حالة) نسبة قدرها 2.57% من المجموع، إلا أنها قد لا تؤثر على نوعية المعطيات.

جدول رقم 226: التوافق الداخلي بين عائق الحصول على المال لتلقي الرعاية الطبية و حالة الاستقرار

المهني للمرأة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>28</sup>
190	<b>1 1</b>

<sup>27</sup> الخانة 1: عائق معرفة أين تذهب ( 1: تشكل عائقاً كبيراً، 2: لا تشكل عائق كبير، 3: لا تشكل عائق، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: مستوى المرأة التعليمي (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة).

<sup>28</sup> الخانة 1: عائق الحصول على المال ( 1: تشكل عائقاً كبيراً، 2: لا تشكل عائق كبير، 3: لا تشكل عائق، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: حالة الاستقرار المهني للمرأة (1: طوال السنة، 2: موسميًا، 3: أحيانًا، 9: الإجابات الناقصة).



### 29.3. التوافق الداخلي بين عائق المسافة و تلقي الرعاية الطبية و وسط الإقامة:

وظفنا هذا الاختبار لكشف الأخطاء المتعلقة بالتناقض في التصريحات بين عائق المسافة عن المركز الصحي (  $f=539d=1$  ) و متغير وسط الإقامة (  $mstrate=1$  ). إذ من المفروض أن تكون النسوة المقيمات بالوسط الحضري غير معنيات بهذا العائق.

بعد المعالجة، سجلنا 585 حالة مقيمة بالوسط الحضري شكل لديها بعد المسافة عن المركز الصحي عائقا كبيرا في تلقي الرعاية الطبية. وافق هذا العدد النسبة 7.90% من المجموع، مما قد يسيء لجودة المعطيات المتعلقة بالمتغير f539 و المعطيات عموماً.

جدول رقم 227: التوافق الداخلي بين بعد المسافة عن المركز الصحي لتلقي الرعاية الطبية و وسط

الإقامة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>29</sup>
585	1 1

### 30.3. التوافق الداخلي بين تعرف المبحوثة على الإيدز (السيدا) و مستواها التعليمي:

استجوبت النساء في القسم السادس من الاستمارة عن مرض الإيدز (السيدا) والأمراض الأخرى المنقولة جنسياً. اخترنا مرض الإيدز من بين الأمراض المنقولة جنسياً لأنه الأكثر مهابة و معرفة. أجرينا هذا الاختبار لكشف التناقض في التصريحات بين متغير معرفة مرض الإيدز (  $f602d=1$  : نعم بتلقائية، 2: نعم بعد تفصي، 3: لا تعرفه) و متغير المستوى التعليمي للمبحوثات (  $f105=1$  : ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي).

يشير الجدول رقم 228 إلى وجود ستة نساء لم يعرفن مرض الإيدز رغم مستواهن التعليمي (04 حالات من المستوى المتوسط و حالتان من المستوى الثانوي). أما العارفات بالمرض لكن بعد تفصي فبلغ عددهن 103 حالات من الطور المتوسط و 50 حالة من المستوى الثانوي و 05 جامعيات.

<sup>29</sup> الخانة 1: عائق بعد المسافة لتلقي الرعاية الطبية ( 1: تشكل عائقاً كبيراً، 2: لا تشكل عائق كبير، 3: لا تشكل عائق، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: وسط الإقامة (1: حضري، 2: ريفي).

بلغت نسبة غير العارفات بالمرض من المستويين المتوسط و الثانوي المقدار 0.12% فقط بين مجموع المعنيات (5009 مستجوبة).

جدول رقم 228: التوافق الداخلي بين تعرف المبحوثة على الإيدز (السيدا) و مستواها التعليمي

التكرار	ربط المتغيرات <sup>30</sup>
103	2 2
4	2 3
50	3 2
2	3 3
5	4 2

31.3. التوافق الداخلي بين متغير المصادر الإعلامية التي تلقت منها أكبر قدر من

المعلومات عن مرض الإيدز (التلفزيون، الراديو) و متغير مشاهدة التلفزيون و متغير

الاستماع للراديو:

حدد المتغيران f613a و f613b على التوالي المتغيرين الجزئيين المتعلقين بتلقي أكبر قدر من

المعلومات عن مرض الإيدز (من الراديو و من التلفزيون). في كلي المتغيرين الجزئيين تم اعتماد

الترميز التالي: 1=نعم، 2=لا، 9: الإجابات الناقصة.

مثل المتغيران f111 و f110 على التوالي الاستماع للراديو و مشاهدة التلفزيون. كما اعتمد

في كليهما الترميز التالي: 1: يوميا تقريبا، 2: مرة في الأسبوع على الأقل، 3: أقل من مرة في

الأسبوع، 4: لا، على الإطلاق، 9: المعطيات الناقصة.

يحدد الاحتمال (1 4 1 1) فئة النسوة اللاتي تلقين أكبر قدر من المعلومات عن مرض

الإيدز من الراديو و من التلفزيون رغم أنهم لا يستمعن للراديو على الإطلاق و يشاهدن التلفزيون

(f111=4)، بلغ عدد نسوة هذه الفئة 308 مبحوثة، مثلت نسبة قدرها 6.20% من مجموع المعنيات

<sup>30</sup> الخانة 1: التعرف على مرض الإيدز (1: نعم بتلقائية، 2: نعم بعد التقصي، 3: لا تعرفه، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: المستوى التعليمي (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة).

بالسؤال f613 (4965 معنية). بلغ عدد الحالات غير المتوافقة داخليا 553 حالة و شكلت نسبة مقدارها 11.13% بين مجموع المستجوبات.

جدول رقم 229: التوافق الداخلي بين متغير المصادر الإعلامية التي تلقت منها المعلومات عن مرض الإيدز (التلفزيون، الراديو) و متغير مشاهدة التلفزيون و متغير الاستماع للراديو

التكرار	ربط المتغيرات <sup>31</sup>
17	<b>4 1 1 1</b>
6	<b>4 2 1 1</b>
3	<b>4 3 1 1</b>
308	<b>1 4 1 1</b>
44	<b>2 4 1 1</b>
10	<b>3 4 1 1</b>
29	<b>4 4 1 1</b>
2	<b>9 4 1 1</b>
27	<b>1 4 2 1</b>
4	<b>2 4 2 1</b>
1	<b>3 4 2 1</b>
8	<b>4 4 2 1</b>
14	<b>4 1 1 2</b>
5	<b>4 2 1 2</b>
2	<b>4 3 1 2</b>
73	<b>4 4 1 2</b>

<sup>31</sup> الخانة 1: الراديو مصدر تلقي المعلومات عن الإيدز (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: التلفزيون مصدر تلقي المعلومات عن الإيدز (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: الاستماع للراديو (1: يومياً تقريباً، 2: مرة في الأسبوع على الأقل، 3: أقل من مرة في الأسبوع، 4: لا على الإطلاق، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 4: مشاهدة التلفزيون (1: يومياً تقريباً، 2: مرة في الأسبوع على الأقل، 3: أقل من مرة في الأسبوع، 4: لا على الإطلاق، 9: الإجابات الناقصة).

### 32.3. التوافق الداخلي بين مصادر تلقي المعلومات عن مرض الإيدز (من

الصحف/المجلات، الكتيبات/ الملصقات) و القدرة على القراءة:

يهدف هذا الاختبار إلى كشف الأخطاء المتعلقة بالتناقض في الإجابات على سؤالي تلقي المعلومات عن مرض الإيدز من خلال الصحف و الكتيبات (f613d، f613c) من جهة و سؤال القدرة على القراءة (f108) من جهة أخرى. يفترض أن تكون النسوة اللاتي تلقين أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز من الصحف و المجلات أو الكتيبات و الملصقات قادرات على القراءة.

جدول رقم 230: التوافق الداخلي بين مصادر تلقي المعلومات عن مرض الإيدز (الصحف/المجلات،

الكتيبات/ الملصقات) و القدرة على القراءة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>32</sup>
30	<b>2 1 1</b>
38	<b>2 2 1</b>
5	<b>2 1 2</b>

نلاحظ من خلال الجدول رقم 230 وجود 73 حالة تلقت أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز عن طريق الصحف و المجلات أو الكتيبات و الملصقات ( 1=f613c، 1=f613d) رغم تصريحهن سابقا بعدم قدرتهن على القراءة ( 2=f108). بلغت نسبة الإجابات غير المتوافقة القيمة 1.47% من مجموع المستجوبات في السؤال f613 (4965 مبحوثة).

<sup>32</sup> الخانة 1: تلقي المعلومات من الصحف و المجلات ( 1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: تلقي المعلومات من الكتيبات و الملصقات (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: القدرة على القراءة ( 1: تستطيع القراءة، 2: لا تستطيع القراءة، 9: الإجابات الناقصة).

### 33.3. التوافق الداخلي بين مصادر تلقي المعلومات عن مرض الإيدز (المدارس/

الأساتذة) و حالة التمدرس:

ربطنا في هذا الاختبار بين المتغير الجزئي المتعلق بتلقي أكبر قدر من المعلومات حول مرض الإيدز عن طريق المدارس/ الأساتذة ( $f613g=1$ ) و متغير حالة تمدرس المبحوثة ( $f104=3$ ).

يفترض أن تكون النسوة اللاتي تلقت أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز من المدارس ممن سبق لهن التمدرس.

يحدد الاحتمال (1 3) فئة النسوة اللاتي تلقت أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز من المدارس و الأساتذة و لم يسبق لهن التمدرس. بلغ عدد حالات هذه الفئة 13 امرأة، مثلت 0.26% من مجموع المعنيات بالسؤال.

جدول رقم 231: التوافق الداخلي بين مصادر تلقي المعلومات عن مرض الإيدز (المدارس/ الأساتذة)

و حالة التمدرس

التكرار	ربط المتغيرات <sup>33</sup>
13	<b>3 1</b>

### 34.3. التوافق الداخلي بين مصادر تلقي أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز

(من مكان العمل) و الحالة المهنية في الماضي:

يستهدف هذا الاختبار النساء اللواتي صرحن بتلقيهن أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز بمكان العمل ( $f613j=1$ ) غير أنهن في ذات الوقت لم يسبق لهن العمل ( $f114=2$ )، بحيث يفترض أن تكون النسوة اللاتي تلقين أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز بمكان العمل ضمن فئة النساء اللواتي سبق لهن العمل.

<sup>33</sup> الخانة 1: تلقي المعلومات عن السيدا من المدارس/ الأساتذة (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: حالة التمدرس (1: نعم حالياً، 2: نعم في الماضي، 3: لا، 9: الإجابات الناقصة).

بعد المعالجة، تم تسجيل 12 حالة لم يسبق لها العمل و تلقت أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز بمكان العمل، مثلت نسبة بسيطة قدرها 0.24% من مجموع المعنيات بالسؤال.

جدول رقم 232: التوافق الداخلي بين مصادر تلقي المعلومات عن مرض الإيدز (مكان العمل) و الحالة المهنية في الماضي

التكرار	رابط المتغيرات <sup>34</sup>
12	2 1

### 35.3. التوافق الداخلي بين معرفة وسائل انتقال الإيدز و المستوى التعليمي:

سئلت النسوة عن معرفة وسائل انتقال مرض الإيدز f614a,b,c,d (الاتصال الجنسي، عدم استخدام الواقي الذكري، نقل الدم، الحقن). حدد الدليل 1: حالة معرفة المرأة لوسائل انتقال الإيدز و وظف الدليل 2: في حالة عدم معرفتها. أما الإجابات غير المحددة فعرفت بالدليل 8. ربطنا هذا المتغير مع متغير المستوى الدراسي ( f105 ) حيث اخترنا المستوى الثانوي ( 3 ) و المستوى الجامعي (4).

بلغ عدد اللاتي نفين أن تكون الوسائل المقترحة (الاتصال الجنسي، عدم استخدام الواقي الذكري، نقل الدم، الحقن) مؤدية للإصابة بالإيدز رغم مستواهن التعليمي المقبول (ثانوي، جامعي) 912 مبحوثة، ما يقابل النسبة 18.37% من مجموع المستجوبات في السؤال f614 (4965 امرأة). كما وصل عدد غير العارفات من ذوات المستوى الثانوي و الجامعي 13 حالة، وافقت النسبة 0.26%. (الجدول رقم 233).

<sup>34</sup> الخانة 1: تلقي المعلومات عن الإيدز بمكان العمل (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: حالة العمل في الماضي (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة).

## جدول رقم 233: التوافق الداخلي بين معرفة وسائل انتقال الإيدز و المستوى التعليمي

التكرار الصاعد	التكرار	ربط المتغيرات <sup>35</sup>
33	33	<b>3 2 1 1 1</b>
44	11	<b>4 2 1 1 1</b>
55	11	<b>3 1 2 1 1</b>
57	2	<b>4 1 2 1 1</b>
104	47	<b>3 2 2 1 1</b>
116	12	<b>4 2 2 1 1</b>
348	232	<b>3 1 1 2 1</b>
407	59	<b>4 1 1 2 1</b>
514	107	<b>3 2 1 2 1</b>
545	31	<b>4 2 1 2 1</b>
658	113	<b>3 1 2 2 1</b>
674	16	<b>4 1 2 2 1</b>
866	192	<b>3 2 2 2 1</b>
883	17	<b>4 2 2 2 1</b>
889	6	<b>3 1 1 1 2</b>
890	1	<b>4 1 1 1 2</b>
892	2	<b>3 2 1 1 2</b>
893	1	<b>3 1 2 1 2</b>
894	1	<b>4 2 2 1 2</b>
903	9	<b>3 1 1 2 2</b>
905	2	<b>4 1 1 2 2</b>
908	3	<b>3 2 1 2 2</b>
910	2	<b>3 1 2 2 2</b>
912	2	<b>4 1 2 2 2</b>
12	12	<b>3 8 8 8 8</b>
13	1	<b>4 8 8 8 8</b>

<sup>35</sup> الخانة 1: الإصابة عن طريق الاتصال الجنسي المباشر ( 1: نعم، 2: لا، 8: لا تعرف، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: الإصابة عن طريق عدم استعمال الواقي ( 1: نعم، 2: لا، 8: لا تعرف، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: الإصابة عن طريق نقل الدم ( 1: نعم، 2: لا، 8: لا تعرف، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 4: الإصابة عن طريق الحقن ( 1: نعم، 2: لا، 8: لا تعرف، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 5: المستوى التعليمي ( 1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة).

### 36.3. التوافق الداخلي بين معرفة كيفية تجنب الإيدز (الممارسة الجنسية الآمنة)

#### و المستوى التعليمي:

قمنا بربط متغير معرفة تجنب الإيدز عن طريق الممارسة الجنسية الآمنة (2: لا، 8: لا تعرف) و متغير المستوى التعليمي (3: المستوى الثانوي، 4: المستوى الجامعي).

بعد معالجة المعطيات، تبين وجود 89 حالة نفت أن تكون الممارسة الجنسية الآمنة وسيلة لتجنب الإصابة بمرض الإيدز (  $f_{616a}=2$  ) رغم تأهيلها العلمي ( 67 من ذوات المستوى الثانوي و 22 حالة من المستوى الجامعي) (  $f_{105}>2$  )، وافقت هذه الحالات النسبة 2.15% بين مجموع المعنيات بالسؤال  $f_{616a}$  (4145 امرأة). كما سجلنا حالة واحدة من المستوى الثانوي ضمن الإجابات غير المحددة (لا تعرف) (  $f_{616a}=8$  ). (الجدول رقم 234).

جدول رقم 234: التوافق الداخلي بين معرفة كيفية تجنب الإيدز (الممارسة الجنسية الآمنة) و المستوى

#### التعليمي

التكرار	ربط المتغيرات <sup>36</sup>
67	3 2
22	4 2
1	3 8

### 37.3. التوافق الداخلي بين معرفة النساء لوسائل تنظيم الأسرة (الحبوب، اللولب،

#### الرضاعة الطبيعية) و المستوى الدراسي:

ربطنا متغير وسائل تنظيم الأسرة التي سبق واستعملتها المرأة (الحبوب، اللولب، الحقن، الغرز، العازل الواقي للرجل، العازل الواقي للمرأة، الحاجز المهيلي، المرهم الموضعي، ربط الأنابيب الرحمية، التعقيم، إطالة فترة الرضاعة الطبيعية، فترة الأمان، العزل، و الوسائل الأخرى) و متغير المستوى التعليمي.

<sup>36</sup> الخانة 1: تجنب الإصابة بالإيدز بالممارسة الجنسية الآمنة ( 1: نعم، 2: لا، 8: لا تعرف، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: المستوى التعليمي (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة).



حدد الدليل 1: الإجابة بنعم عن الأسئلة المتعلقة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، الدليل 2: لا، 8: لا تعرف الوسيلة (لم يسبق لها أن سمعت بالوسيلة). اخترنا ثلاث وسائل الأكثر شيوعاً لتنظيم الأسرة: الحبوب (f702a)، اللولب (f702b)، إطالة فترة الرضاعة الطبيعية (f702k) قصد ربطها بالمستوى التعليمي للمرأة (f105).

جدول رقم 235: التوافق الداخلي بين معرفة النساء لوسائل تنظيم الأسرة (الحبوب، اللولب، الرضاعة الطبيعية) و المستوى الدراسي

التكرار	ربط المتغيرات <sup>37</sup>
8	<b>4 8 2 1</b>
3	<b>4 2 8 1</b>
1	<b>4 8 1 2</b>
1	<b>4 8 2 2</b>

يشير الجدول رقم 235 إلى وجود 10 حالات لا يعرفن وسيلة إطالة فترة الرضاعة الطبيعية و 3 نسوة لم يسبق لهن و أن سمعن عن وسيلة اللولب رغم أنهن من ذوات المستوى الجامعي. عموماً بلغت نسبة هذه الحالات بين مجموع المستجوبات في السؤال f702 (5659 امرأة) المقدار 0.23%.

38.3. التوافق الداخلي بين عدد سنوات استعمال وسيلة منع الحمل (بها هرمونات)

(f704c) و عمر المرأة عند أول زواج (f127) و عمرها الحالي بالسنوات (f103):

يهدف هذا الاختبار لكشف الأخطاء في التصريحات المتعلقة بعدد سنوات استعمال وسائل منع الحمل بها هرمونات (f704c) و ذلك بمقارنة هذا العدد بحاصل طرح العمر عند أول زواج (f127) من العمر الحالي للمبحوثة (f103).

من المفروض أن يكون عدد سنوات استعمال وسائل منع الحمل أصغر من فارق العمر عند أول زواج و العمر الحالي بالسنوات (استعمال وسائل منع الحمل بعد الزواج).

<sup>37</sup> الخانة 1: استخدام الحبوب (1: نعم، 2: لا، 8: لا تعرف، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: استخدام اللولب (1: نعم، 2: لا، 8: لا تعرف، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: استخدام الرضاعة الطبيعية (1: نعم، 2: لا، 8: لا تعرف، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 4: المستوى التعليمي (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة).

بعد المعالجة، سجلنا 18 حالة كان عدد سنوات استعمالها لوسائل منع الحمل (الحبوب، الغرز، الحقن) أكبر من الفرق بين العمر عند أول زواج و العمر الحالي للمبحوثة بالسنوات (استعمال الوسيلة قبل الزواج). مثل هذا العدد نسبة بسيطة قيمتها 0.33% فقط بين مجموع المعنيات بالسؤال f704c (5423 امرأة). لا تؤثر هذه النسبة على نوعية البيانات.

جدول رقم 236: التوافق الداخلي بين عدد سنوات استعمال وسائل منع الحمل (بها هرمونات) و عمر

المرأة عند أول زواج و عمرها الحالي بالسنوات

التكرار	ربط المتغيرات <sup>38</sup>
1	<b>21 19 4</b>
1	<b>22 20 3</b>
1	<b>24 18 10</b>
1	<b>25 17 13</b>
1	<b>25 18 9</b>
1	<b>25 24 2</b>
1	<b>26 16 12</b>
1	<b>26 22 5</b>
1	<b>26 24 6</b>
1	<b>28 24 18</b>
1	<b>28 25 18</b>
1	<b>29 20 12</b>
1	<b>32 25 8</b>
1	<b>32 28 5</b>
1	<b>33 26 8</b>
1	<b>34 23 14</b>
1	<b>38 27 14</b>
1	<b>40 25 20</b>

<sup>38</sup> الخانة 1: عدد سنوات استعمال وسيلة منع الحمل ( 1 - 28 سنة، 0: أقل من سنة، 40: 40 سنة أو أكثر، 98: لا تتذكر، 99: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: العمر عند أول زواج (10 - 48 سنة، 99: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: العمر الحالي (15 - 49 سنة).

### 39.3. التوافق الداخلي بين عدم استعمال المرأة للولب بسبب عدم معرفتها له و استعمال

#### اللولب في السابق:

استجوبت النسوة في السؤال f708c عن سبب عدم استعمال اللولب و كان من بين الأسباب عدم معرفة الوسيلة (4=f708c). سئلت النساء في السؤال الجزئي f702b عن استعمالهن للولب في السابق حيث لخصت الإجابات كالتالي: 1: نعم، 2: لا (مع معرفة الوسيلة)، 3: لا تعرف الوسيلة.

استهدف هذا الاختبار النسوة اللاتي صرحن بعدم معرفة اللولب (4 =f708c) مع التصريح باستعماله في الماضي (1 =f702b) أو مع التصريح بعدم استخدامه مع معرفته (2 =f702b).

يشير الجدول 237 إلى وجود 151 مبحوثة صرحت بعدم معرفتها للولب في السؤال الجزئي f708c و بمعرفتها له في السؤال الجزئي f702b. مثل هذا العدد من الحالات نسبة مقدارها 4.62% من مجموع المستجوبات في السؤال f708 (3270 مبحوثة).

جدول رقم 237: التوافق الداخلي بين عدم استعمال المرأة للولب بسبب عدم معرفتها له و استعمال

#### اللولب في السابق

التكرار	ربط المتغيرات <sup>39</sup>
151	2 4

### 40.3. التوافق الداخلي بين السبب الرئيسي للتوقف عن استعمال وسائل منع الحمل (حالة

#### الوصول لسن اليأس) و العمر الحالي للمبحوثة:

قمنا بربط متغير التوقف عن استعمال وسائل تنظيم الأسرة بسبب الوصول لسن اليأس (f713=12) و متغير العمر الحالي للمبحوثة (f103 > 40 سنة). عادة ما يبدأ سن اليأس على الأرجح عند العمر 45 سنة و قد يصل إلى 54 سنة حسب المناخ و نمط المعيشة.

<sup>39</sup> الخانة 1: أسباب عدم استعمال اللولب ( 1: عدم الارتياح للوسيلة، 2: الخوف من الأعراض الجانبية، 3: اعتراض الزوج، 4: لا تعرف الوسيلة، 5: ترى أن الوسيلة معقدة، 6: أخرى، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: استعمال اللولب في الماضي (1: نعم، 2: لا، 8: لا تعرف، 9: الإجابات الناقصة).

جدول رقم 238: التوافق الداخلي بين السبب الرئيسي للتوقف عن استعمال وسائل منع الحمل (الوصول لسن اليأس) و العمر الحالي

التكرار	ربط المتغيرات <sup>40</sup>
1	<b>12 25</b>
1	<b>12 32</b>
1	<b>12 35</b>
1	<b>12 36</b>
2	<b>12 37</b>
1	<b>12 38</b>

بعد المعالجة، سجلنا سبعة نساء كان وصولهن لسن اليأس السبب الرئيسي للتوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة (f713 = 12) لكن بالمقابل صرحن في السؤال المتعلق بالعمر بالسنوات (f103) بالأعمار التالية: 25 سنة، 32 سنة، 35 سنة، 37 سنة، 38 سنة. يمثل عدد الملاحظات نسبة قدرها 0.42% بين مجموع المعنيات بالسؤال f713 (1665مبحوثة)، لا تؤثر على مصداقية المعطيات.

41.3. التوافق الداخلي بين الوسيلة المفضل استعمالها في المستقبل و الوسائل التي سبق

استعمالها:

يهدف هذا الاختبار إلى كشف عدم التوافق في الإجابات على السؤالين f718 و f702. استجوبت النساء في السؤال f718 عن وسائل تنظيم الأسرة المفضل استخدامها مستقبلاً و حدد الدليل 2 استعمال اللولب و الدليل 12 استخدام فترة الأمان. و سئلت النسوة في المتغير الجزئي f702b عن استعمال اللولب في السابق حيث حدد الدليل 1 الإجابة نعم و الدليل 2 الإجابة لا و عرف الدليل 8 اللاتي لا يعرفن الوسيلة. كما استجوبت النسوة في المتغير الجزئي f702a عن استعمال وسيلة فترة الأمان في الماضي.

<sup>40</sup> الخانة 1: العمر الحالي للمرأة (15-49 سنة)، الخانة 2: السبب الرئيسي للتوقف عن استعمال وسائل منع الحمل (1: عدم نجاح الوسيلة، 2: نقص بالتمتع بالعلاقة، 3: أثر على الدورة الشهرية، 4: أثارت مشاكل صحية، 5: صعوبة في الاستعمال، 6: صعوبة الحصول عليها، 7: زيادة في الوزن، 8: عدم الارتياح للوسيلة، 9: الرغبة في إنجاب طفل آخر، 10: تريد تعويض طفل متوفى، 11: عدم وجود خصوصية في الاستعمال، 12: سن اليأس، 96: أخرى، 99: الإجابات الناقصة).

نسجل من الجدول رقم 239 وجود أربعة سيدات (حالتان عن اللولب و حالتان عن فترة الأمان) يعرفن الوسيطتين في السؤال f718 و لا يعرفانها في السؤال f702. مثلت نسبة قدرها 0.33% بين مجموع المستجوبات (1216 امرأة).

جدول رقم 239: التوافق الداخلي بين الوسيلة المفضل استعمالها في المستقبل و الوسائل التي سبق

استعمالها

التكرار	ربط المتغيرات <sup>41</sup>
<b>F702b=8 و f718=2</b>	
2	<b>8 2</b>
<b>F702l=8 و f718=12</b>	
2	<b>8 12</b>

42.3. التوافق الداخلي بين عدم تلقي كشف نسائي خلال الإثني عشرة شهرا الأخيرة

و المستوى التعليمي و وسط الإقامة:

استخدمنا هذا الاختبار لكشف التناقض في التصريحات بين متغير سبب عدم تلقي الكشف النسائي خلال 12 شهرا الماضية (جهلا لأهمية الكشف: 1=f907a) و متغير المستوى التعليمي (2<f105). نفس الشيء بالنسبة لمتغير عدم تلقي الكشف النسائي بسبب غياب الخدمة (1=f907d) و متغير وسط الإقامة (mstrate=1: الإقامة بالوسط الحضري).

يشير الجدول رقم 240 إلى التناقض في بعض الإجابات ( 52 حالة)، حيث نجد نسوة من المستوى الجامعي صرحن بعدم الكشف النسائي لسبب جهلن بأهميته. كما أجابت بعض النساء أن سبب عدم تلقيهن الكشف النسائي مرده غياب الخدمة، رغم إقامتهن بالوسط الحضري. عموماً نسجل وفق هذه الحالات نسبة مقدارها 2.39% بين مجموع المعنيات بالسؤال f907 (2177 مبحوثة).

<sup>41</sup> الخانة 1: الوسيلة المفضل استخدامها مستقبلاً ( 1: الحبوب، 2: اللولب، 3: الحقن، 4: الغرس، 5: العازل الواقي للرجل، 6: العازل الواقي للمرأة، 7: الحاجز المهبللي للمرأة، 8: المرهم، 9: ربط الأنابيب الرحمية، 10: التعقيم للرجال، 11: إطالة فترة الرضاعة الطبيعية، 12: فترة الأمان، 13: العزل، 96: وسائل أخرى، 98: غير متأكدة/ لا تعرف، 99: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: استخدام الوسيلة في السابق (1: نعم، 2: لا، 8: لا تعرف، 9: الإجابات الناقصة).

جدول رقم 240: التوافق الداخلي بين عدم تلقي كشف نسائي خلال الإثني عشرة شهراً الأخيرة  
و المستوى التعليمي و وسط الإقامة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>42</sup>
3	1 1 . 1
1	1 1 2 1
12	1 2 3 1
2	2 2 3 1
4	1 2 4 1
17	1 1 . 2
8	1 1 1 2
3	1 1 2 2
2	1 1 3 2

43.3. التوافق الداخلي بين أسباب عدم تلقي الفحص الطبي للتدبير خلال الإثني عشرة

شهرًا الأخيرة (بسبب غياب الخدمة) و ولاية الإقامة:

سئلت النسوة في المتغير f917 عن أسباب عدم تلقي الفحص الطبي للتدبير خلال 12 شهراً الماضية (الخدمة غير متوفرة :f917d=1). قمنا بربط هذا المتغير الجزئي بمتغير ولاية الإقامة (mwilaya) لكشف الإجابات غير الواقعية.

بعد إجراء الاختبار، سجلنا 07 نسوة أرجعن عدم تلقي الفحص الطبي للتدبير خلال 12 شهراً الأخيرة إلى عدم توفر الخدمة رغم إقامتهن بولايات بها مدن كبرى (الجزائر العاصمة، وهران، سطيف، سيدي بلعباس، باتنة، تلمسان). مثلت هذه الحالات نسبة قدرها 0.28% بين مجموع المستجوبات في السؤال f917d (2526 امرأة). (الجدول رقم 241).

<sup>42</sup> الخانة 1: عدم تلقي الكشف النسائي بسبب جهل أهميته ( 1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: المستوى التعليمي (1: ابتدائي، 2: متوسط، 3: ثانوي، 4: جامعي، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 3: عدم تلقي الكشف النسائي بسبب غياب الخدمة ( 1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 4: وسط الإقامة (1: حضري، 2: ريفي).

جدول رقم 241: التوافق الداخلي بين عدم الذهاب لتلقي الفحص الطبي للتدبير خلال الإثني عشر شهرا  
الماضية بسبب غياب الخدمة و ولاية الإقامة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>43</sup>
1	<b>5 1</b>
1	<b>13 1</b>
1	<b>16 1</b>
1	<b>19 1</b>
2	<b>22 1</b>
1	<b>31 1</b>

44.3. التوافق الداخلي بين أسباب عدم تلقي الأشعة (على التدبير بسبب غياب الخدمة)

و ولاية الإقامة:

استجوبت السيدات في السؤال f922 عن أسباب عدم تلقي الأشعة، بحيث كان من بين الأسباب المقترحة عدم توفر الخدمة ( f922e=1). ربطنا هذا المتغير الجزئي (f922e) بمتغير ولاية الإقامة (mwilaya).

يفترض أن تكون المراكز الصحية المختصة في الأشعة على التدبير متوفرة بالولايات التي تحوي مدناً كبرى.

جدول رقم 242: التوافق الداخلي بين أسباب عدم تلقي الأشعة على التدبير (بسبب غياب الخدمة)

و ولاية الإقامة

التكرار	ربط المتغيرات <sup>44</sup>
1	<b>16 1</b>
1	<b>22 1</b>
1	<b>31 1</b>

<sup>43</sup> الخانة 1: عدم تلقي الفحص الطبي للتدبير بسبب غياب الخدمة (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: رقم الولاية (1-48).

<sup>44</sup> الخانة 1: عدم الذهاب لتلقي الأشعة على التدبير بسبب غياب الخدمة (1: نعم، 2: لا، 9: الإجابات الناقصة)، الخانة 2: رقم الولاية (1-48).

نستنتج من الجدول رقم 242 وجود 03 نسوة صرحن بعدم إجراء الأشعة على الثديين بسبب عدم توفر الخدمة رغم إقامتهن بولايات كبرى مثل الجزائر العاصمة، وهران، سيدي بلعباس، وافق عدد هذه الحالات النسبة 0.12% فقط بين المعنيات بالسؤال f922 (2559 امرأة).



## الاستنتاج العام

يبقى توفر قاعدة بيانات عالية الدقة حلم بعيد المنال لدى الباحثين في المجالات الديموغرافية و الاقتصادية و الاجتماعية، بحيث تضمن النوعية الجيدة للمعطيات ثقة كبيرة في استخراج المؤشرات و المعدلات و النسب الممثلة للمجتمع المدروس.

عموماً شمل ملف الخصوبة في المسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة لسنة 2002 معطيات ذات نوعية جيدة، استناداً إلى الاختبارات التي أجريناها:

### 1. القيم الدنيا و القصوى:

لم نسجل على مختلف المتغيرات التي تضمنها ملف الخصوبة أي قيم غير موافقة لمجال الإجابات المقترحة في استمارة المسح، فيما سجلنا معطيات ناقصة بسيطة في معظم المتغيرات، لا تؤثر عموماً على جودة معطيات هذا المسح مما يجعل نوعية معطياته جيدة، إلا أننا سجلنا على بعض المتغيرات (16 متغيراً) نسباً كبيرة من المعطيات الناقصة تراوحت بين 10% و 50%، قد تؤثر على مصداقية هذه المعطيات نلخصها على النحو التالي:

1. شهر ميلاد المرأة (f102a): 19.87%، قد تطرح إشكالا عند حساب الأعمار الفعلية خاصة.

2. شهر أول زواج (f126a): 22.66%.

3. شهر حدوث آخر حالة حمل انتهى بمولود ميت أو إجهاض أو سقط (f225a): 39.51%.
4. نوع السرطان الذي تعاني (أو عانت) منه المبحوثات (f508): 50.00% مما يصعب تحديد معدلات الإصابة بالسرطان حسب نوع السرطان.
5. عمر المرأة عند إخبارها أو اكتشافها الإصابة بالسرطان (f509): 28.57%.
6. تلقي أي علاج (الآن / في الماضي) للسرطان (f510): 28.57%.
7. السبب الرئيسي من وراء فشل الحمل حسب رأي المبحوثة (f529): 42.62%، قد تعيق معرفة أهم أسباب فشل الحمل.
8. إصابة النساء بالأمراض المنقولة جنسيا خلال الإثني عشرة شهرا الماضية (f603): f603d: 10.93%.
9. أسباب عدم المتابعة الطبية للأمراض المنقولة جنسيا (f606): 10.34%.
10. تلقي المرأة أي نصيحة أو علاج لنفس المرض عند إصابة الزوج (f611): 11.76%.
11. معرفة النساء لإمكانية قيام المرء بشيء يجنبه الإصابة بالإيدز (f615): 12.41%.
12. المشاكل التي صادفت النساء عند استعمال اللولب (f708d): 22.90%.
13. النية في استعمال أي وسيلة لتنظيم الولادات مستقبلاً (f715): 10.55%.
14. وقت بدء استعمال وسيلة تنظيم الولادات (f717): 31.00%.
15. مقارنة عدد الأطفال الذين يرغب فيهم الزوج بالنسبة للعدد المرغوب من طرف المرأة (f729): 27.36%.
16. تكلفة الأشعة آخر خدمة (f921): 13.10% (الجدول رقم 2، الملحق).

## 2. التوافق الداخلي بين المتغيرات:

بعد معالجة معطيات ملف الخصوبة، لم نسجل أي حالة عدم توافق داخلي بين المتغيرات بالنظر للإحالات المعتمدة في استمارة المسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة لسنة 2002، هذا ما يعطي قيمة للمعطيات و يزيد من مصداقيتها.

من خلال إجرائنا لعدة اختبارات لكشف عدم التوافق الداخلي بين المتغيرات أو التناقض في التصريحات بين متغيرين أو عدة متغيرات تربطها علاقة منطقية، بحيث سجلنا عدة حالات عدم توافق داخلي بين المتغيرات، لكن نسب هذه الحالات كانت ضئيلة لم تتجاوز في معظمها المقدار 3.00%، لا تؤثر على جودة المعطيات، إلا أننا سجلنا بعض حالات عدم التوافق الداخلي بين المتغيرات رغم قلتها (05 حالات)، بحيث فاقت فيها نسب التصريحات المتناقضة فيما بينها القيمة 11.00% و هي كالتالي:

1. التوافق الداخلي بين حالة الدورة الشهرية و عمر المرأة بالسنوات ( f245 ) و ( f103 ): سجلنا نسبة عدم توافق بين المتغيرين عند المستوى 21.48% (الجدول رقم 211).

2. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة بغية الحمل للاعتقاد أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي ( f105 > 1 ) و ( 1 = f531a ): بلغت نسبة الحالات غير المتوافقة المقدار 22.4% (الجدول رقم 220).

3. التوافق الداخلي بين عدم الاستشارة الطبية (مشاكل الدورة الشهرية)، بسبب الاعتقاد أن ذلك لا يساعد و المستوى التعليمي ( 1 = f537a ) و ( 1 < f105 ): بلغ عدد الحالات غير المتوافقة النسبة 11.24% (الجدول رقم 224).

4. التوافق الداخلي بين متغير المصادر الإعلامية التي تلقت منها أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز (التلفزيون، الراديو) و متغير مشاهدة التلفزيون و متغير الاستماع للراديو ( f613a و f613b و f111 و f110 ): بلغ عدد الحالات غير المتوافقة داخليا بين هذه المتغيرات 553 حالة. شكلت نسبة مقدارها 11.13% بين مجموع المستجوبات (الجدول رقم 229).

5. التوافق الداخلي بين معرفة وسائل انتقال الإيدز و المستوى التعليمي: f614a,b,c,d (الاتصال الجنسي، عدم استخدام الواقي الذكري، نقل الدم، الحقن) ربطنا هذا المتغير مع متغير المستوى التعليمي (f105): وصلت نسبة الإجابات غير المتوافقة داخليا بين المتغيرين المقدار 18.87% بين مجموع المعنيات بالسؤال f614 (4965 امرأة) (الجدول رقم 233).

## الملحق

جدول رقم 1: أهم مؤشرات المسح الجزائري لصحة الأسرة ( PAPFAM 2002 ) (حضر، ريف،  
المجموع):

1- خصائص أسر العينة			
19233	7697	11536	- إجمالي عدد الأسر بالعينة الذين تمت مقابلتهم
93.5	94.5	92.8	- نسبة الإستيفاء
121153	51143	70009	- عدد الأفراد في الأسر
6.3	6.6	6.1	- متوسط حجم الأسرة
76.2	77.1	75.6	- نسبة الأسر المكونة من عائلة نووية
2- خصائص الأفراد			
نسبة الأفراد المتزوجين 15 سنة فأكثر من العمر			
7.6	7.3	7.8	- ذكور
7.4	6.7	7.9	- إناث
7.5	7.0	7.9	- المجموع
نسبة الافراد المتزوجين 15 سنة فأكثر من العمر			
45.2	45.9	44.8	- ذكور
46.1	47.1	45.3	- إناث
45.6	46.5	45.1	- المجموع
متوسط سن الزواج الأول			
33.0	31.9	33.7	- ذكور
29.7	29.1	30.0	- إناث
نسبة التمدرس عند الافراد من 6 إلى 14 سنة من العمر			
95.0	92.8	96.8	- ذكور

92.1	87.5	96.0	- إناث
93.6	90.2	96.4	- المجموع
نسبة الامية عند الافراد من 10 سنوات فأكثر من العمر			
18.2	24.6	13.5	- ذكور
35.0	47.0	26.6	- إناث
26.5	35.7	20.1	- المجموع
نسبة الناشطين* بين الافراد 15 سنة فأكثر من العمر			
76.1	78.2	74.6	- ذكور
14.5	9.7	17.7	- إناث
45.4	44.2	46.2	- المجموع
نسبة الأفراد المصابين بمرض مزمن واحد على الأقل			
9.7	9.0	10.3	- ذكور
13.1	11.9	14.0	- إناث
11.4	10.4	12.1	- المجموع
نسبة الأفراد المصابين بإعاقة			
3.6	3.7	3.5	- ذكور
1.1	0.9	1.2	- إناث
2.3	2.3	2.4	- المجموع
نسبة الافراد 10 سنوات أو أكثر من العمر والمستهلكين للتبغ			
33.3	32.9	33.6	- ذكور
0.8	0.8	0.8	- إناث
17.1	17.0	17.2	- المجموع
3- خصائص المسكن			
1-3 رفاهية المسكن			
5.1	7.3	3.8	- نسبة الأسر القاطنة في بناية قصديرية
3.0	2.8	3.1	- متوسط عدد الغرف في المسكن
2.1	2.3	2.0	- متوسط عدد الأشخاص في الغرفة
89.5	84.0	93.2	- نسبة المساكن التي تحتوي على مطبخ
84.7	70.5	94.3	- نسبة المساكن التي تحتوي على مرحاض بسيفون
97.8	96.2	98.9	- نسبة إرتباط المساكن بشبكة الكهرباء
71.7	53.4	83.9	- نسبة إرتباط المساكن بشبكة المياه الصالحة للشرب
76.6	55.4	90.8	- نسبة إرتباط المساكن بشبكة تصريف المياه المستعملة
32.4	2.2	52.6	- نسبة إرتباط المساكن بشبكة الغاز
81.8	77.7	84.6	- نسبة الأسر القاطنة بمناطق نظيفة
2-3 التجهيزات			
91.9	87.5	94.8	- نسبة الأسر التي تملك تليفزيون
13.7	2.7	21.0	- نسبة الأسر التي تملك آلة غسيل
28.5	7.2	42.6	- نسبة الأسر التي تملك خط هاتفي

49.7	33.3	60.7	- نسبة الأسر التي تملك جهاز إستقبال القنوات الفضائية
4- خصائص سيدات العينة (النساء اللواتي سبق لهن الزواج وسنهن يتراوح بين 15-49 سنة)			
7399	3096	4303	- عدد النساء في العينة الرئيسية (15-49 سنة)
97.4	97.6	97.2	- نسبة الإستيفاء الإجمالية
45.5	64.1	32.2	- نسبة السيدات الأميات
11.2	6.0	15.0	- نسبة السيدات العاملات في وقت المسح
5- الزواج			
93.1	94.9	91.8	- نسبة السيدات المتزوجات
3.1	3.2	3.0	- نسبة السيدات المتزوجات حاليا من أزواج متعددي الزوجات
33.3	36.7	30.8	- نسبة السيدات المتزوجات من أزواج أقارب
6- الخصوبة			
2.4	2.7	2.1	- معدل الخصوبة الكلي للخصوبة خلال الخمس سنوات السابقة للمسح
6.2	7.1	5.5	- متوسط عدد المواليد أحياء للنساء في فئة السن 45-49 سنة
8.1	8.1	8.1	- نسبة السيدات المتزوجات اللواتي فقدن حملا خلال الخمس سنوات السابقة للمسح
7- رعاية الأمومة لآخر ولادة حدثت خلال الخمس سنوات السابقة للمسح			
7-1 الرعاية الصحية قبل الولادة			
19.3	27.6	12.4	- نسبة السيدات اللواتي لم يتابعن الحمل
43.9	35.8	50.6	- نسبة السيدات اللواتي تلقين على الأقل جرعة واحدة من التطعيم ضد التيتانوس
36.5	36.4	36.6	- نسبة السيدات اللواتي عانين على الأقل من صعوبة واحدة أثناء الحمل
18.1	23.4	13.8	- نسبة السيدات اللواتي لم يستشرن أحدا من أجل الصعوبات أثناء الحمل
7-2 الرعاية الصحية عند الوضع			
86.6	82.5	89.9	- نسبة السيدات اللواتي وضعن في هياكل صحية عمومية
3.6	1.5	5.3	- نسبة السيدات اللواتي وضعن في هياكل صحية خاصة
8.8	14.6	4.1	- نسبة السيدات اللواتي وضعن في المنزل
7-3 الرعاية الصحية بعد الوضع			
69.9	74.3	66.3	- نسبة السيدات اللواتي لم تستقدن من رعاية بعد الوضع
23.5	23.6	23.4	- نسبة السيدات اللواتي عانين من صعوبة واحدة على الأقل خلال فترة النفاس
50.0	44.4	54.6	- نسبة السيدات اللواتي عانين من صعوبة وقمن بإستشارة طبيب
8- تغذية وصحة آخر ولادة حية حدثت في الثلاث سنوات السابقة للمسح			
8-1 الرضاعة الطبيعية			
91.1	91.0	92.2	- نسبة السيدات اللواتي أرضعن من الثدي خلال الثلاث سنوات

			قبل المسح
55.6	55.3	55.9	- نسبة السيدات اللاتي أرضعن أطفالهن بعد الولادة مباشرة من مجموع من أرضعن
12.8	12.7	13.3	- الفترة الوسيطة للرضاعة من الثدي
2-8 التغذية			
- نسبة الأطفال الذين يعانون من قصر القامة			
20.8	21.5	20.2	- ذكور
17.5	19.0	16.2	- إناث
19.1	20.2	18.2	- المجموع
- نسبة الأطفال الذين يعانون من النحافة			
8.0	7.7	8.2	- ذكور
7.0	7.1	7.0	- إناث
7.5	7.4	7.6	- المجموع
- نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص في الوزن			
11.9	11.7	12.0	- ذكور
8.9	9.4	8.5	- إناث
10.4	10.6	10.3	- المجموع
3-8 التطعيم			
88.9	86.1	91.2	- نسبة الاطفال (12-23 شهرا) من العمر ومتمين تطعيمهن**
4-8 أمراض الأطفال خلال الأسبوعين السابقين للمسح			
25.5	26.6	24.5	- نسبة الأطفال الذين عانوا من حمى
25.3	24.4	26.0	- نسبة الأطفال الذين عانوا من السعال
62.2	51.2	71.6	- نسبة الأطفال الذين عانوا من سعال أو حمى وتلقوا علاجاً طبياً
15.0	16.0	14.2	- نسبة الأطفال الذين عانوا من إسهال
41.8	38.2	45.1	- نسبة الأطفال الذين عانوا من إسهال وتلقوا استشارة طبية
61.3	57.9	64.2	- نسبة السيدات اللواتي حصل أن قمن بإعداد محلول بأملاح إعادة التئمة
5-8 وفيات الأطفال والرضع			
32.1	33.5	20.9	- معدلات وفيات الرضع خلال الخمس سنوات السابقة على المسح
37.5	41.2	34.3	- معدل وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على المسح
9- الأمراض المزمنة			
44.2	39.9	47.3	- نسبة السيدات اللواتي سبق لهن الزواج ويرون أن صحتهم جيدة
4.9	4.4	5.3	- نسبة السيدات اللاتي يعانين من ارتفاع في ضغط الدم
3.1	2.9	3.2	- نسبة السيدات اللاتي يعانين من أمراض في المفاصل
10- المعرفة بالسيدا (الإيدز)			



68.1	55.7	77.0	- نسبة السيدات اللواتي يعرفن السيدا (الايذز)
88.8	84.7	90.9	- نسبة السيدات اللواتي صرحن أنهن تعرفن أن السيدا ينتقل عن طريق العلاقة الجنسية
11- تنظيم الأسرة			
77.9	75.1	80.0	- نسبة السيدات اللواتي سبق لهن إستعمال أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة
76.0	73.6	77.7	- نسبة السيدات اللواتي سبق لهن إستعمال وسيلة حديثة
57.0	54.4	59.0	- نسبة السيدات المتزوجات حاليا ويستعملن أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة وقت المسح
51.8	50.3	52.9	- نسبة السيدات اللواتي تستعملن أو أزواجهن وسيلة حديثة من وسائل تنظيم الأسرة
40.2	40.3	40.1	- نسبة السيدات اللواتي يعتزمن إستعمال وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة في المستقبل
12- السيدات في سن مابعد الانجاب (السابق لهن الزواج والبالغات 49-50 سنة)			
3.5	1.6	4.7	- نسبة السيدات اللواتي تلقين علاجا هرمونيا
11.8	8.0	14.1	- نسبة السيدات اللواتي قمن بفحص نسائي خلال السنة التي سبقت المسح
4.9	1.4	6.9	- نسبة السيدات اللواتي قمن بفحص المسحة المهبلية خلال السنة التي سبقت المسح
4.7	1.7	6.5	- نسبة السيدات اللواتي تلقين فحص الثدي خلال السنة التي سبقت المسح
68.3	70.8	66.9	- نسبة السيدات اللاتي عانين من عرض واحد على الأقل مرتبط بمرحلة ما بعد الإنجاب
51.7	43.1	57.1	- نسبة السيدات اللواتي تعانين على الأقل من عرض واحد واستشرن طبيب
13- رعاية المسنين			
- نسبة المسنين الأرامل			
6.2	5.3	6.8	- ذكور
46.1	42.7	48.2	- إناث
26.3	23.4	28.2	- المجموع
- نسبة المسنين المطلقين			
0.3	0.3	0.3	- ذكور
2.1	1.1	2.6	- إناث
1.2	0.7	1.5	- المجموع
- نسبة المسنين الأميين			
72.5	85.6	63.3	- ذكور
94.2	98.6	91.5	- إناث
83.4	91.9	77.9	- المجموع
- نسبة المسنين الذين يعملون			

13.9	18.4	10.7	- ذكور
1.9	1.6	2.1	- إناث
7.9	10.3	6.3	- المجموع
- نسبة المسنين الذين مصدر رزقهم مساعدة الأبناء			
21.1	21.3	21.0	- ذكور
34.4	34.0	34.6	- إناث
27.8	27.4	28.0	- المجموع
- نسبة المسنين محدودي الحركة			
9.7	11.0	8.8	- ذكور
9.7	10.3	9.4	- إناث
9.7	10.7	9.1	- المجموع
14- الشباب			
- نسبة الشباب الذين يبحثون عن عمل دون جدوى			
77.2	81.0	74.4	- ذكور
26.0	15.4	36.2	- إناث
45.3	38.1	51.7	- المجموع
- نسبة الشباب الذين يلجأون عند الحاجة إلى الأب			
43.4	47.3	40.8	- ذكور
17.8	21.0	15.6	- إناث
31.7	35.0	29.3	- المجموع
- نسبة الشباب الذين يلجأون عند الحاجة إلى الأم			
44.3	39.4	47.7	- ذكور
64.6	69.7	60.9	- إناث
53.6	53.5	53.7	- المجموع
- نسبة الشباب الذين لا يوافقون على زواج الأقارب			
65.7	57.2	71.4	- ذكور
67.7	57.9	74.6	- إناث
66.6	57.5	72.9	- المجموع
- نسبة الشباب الذين يمارسون الرياضة			
39.8	37.6	41.3	- ذكور
6.6	4.0	8.5	- إناث
24.6	21.9	26.4	- المجموع
- نسبة الشباب الذين يعرفون أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة			
73.8	70.7	75.9	- ذكور
88.0	83.9	90.9	- إناث
80.3	76.8	82.7	- المجموع
- نسبة الشباب الذين يعرفون مرض السيدا (الإيدز)			
96.8	94.9	98.0	- ذكور

94.0	90.5	96.6	- إناث
95.5	92.8	97.4	- المجموع
* تضم فئة النشطين العاملين والعاطلين والموجودين في الخدمة المدنية			
** تضم الاطفال الذين تم تطعيمهم ضد الدرن والجرعات الثلاث للثلاثي والشلل وجرعة الحصبة			

جدول رقم 2: نسب المعطيات الناقصة حسب المتغيرات المتعلقة بملف الخصوبة:

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
0.00	الرقم الترتيبي للمرأة fligne
19.87	شهر ميلاد المرأة (f102a)
0.00	سنة ميلاد المرأة (f102b)
0.00	أعمار النساء بالسنوات الماضية (f103)
0.00	الأعمار الحالية للنساء (f103c)
0.00	وضعية النساء بالنسبة للتدريس (f104)
0.07	مستوى التعليم المحصل (f105)
0.34	آخر سنة دراسية أكملت بنجاح (f106)
0.00	الحصول على الشهادة الابتدائية (f107)
0.27	القدرة على القراءة (f108)
6.81	القدرة على الكتابة (f108b)
1.05	مداومة قراءة الجرائد والمجلات (f109)
0.16	مداومة مشاهدة التلفزيون (f110)
0.12	مداومة الاستماع للراديو (f111)
0.00	الحالة المهنية للمبحوثة (f112)
0.27	ممارسة الأعمال و النشاطات التجارية و الفلاحية و مساعدة الأسرة (f113)
0.14	ممارسة أي عمل في الماضي (f114)
6.35	ممارسة أي عمل في الاثنى عشر شهرا الأخيرة (f115)
1.42	العمل الرئيسي (f116)
0.95	مكان مزاولة النشاط (f117)
1.42	وتيرة ممارسة النشاط (f118)
1.90	نوع الأجر أو المقابل (f119)
0.00	الحالة الزوجية للمرأة ((f124)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
5.88	عدد الزيجات (f125)
22.66	شهر أول زواج (f126a)
1.50	سنة أول زواج (f126b)
0.16	العمر عند الزفاف الأول (f127)
0.09	صلة قرابة المرأة بالزوج الأخير (f128)
0.94	حالة تدرس الزوج الحالي (الأخير) (f129)
0.52	أعلى مستوى تعليمي وصله الزوج (f130)
0.81	آخر سنة دراسية أكملها الزوج بنجاح (f131)
0.00	حصول الأزواج على الشهادة الابتدائية (ذوي المستوى الابتدائي و الذين أكملوا السنة السادسة بنجاح) (f132)
2.64	قدرة الأزواج على القراءة ((f133)
8.17	قدرة الأزواج على الكتابة (f134)
1.50	المهنة الرئيسية للأزواج (f135)
0.08	الوضعية في المهنة (الأزواج) (f136)
0.00	الحالة الزوجية الحالية للنساء (f140)
0.13	العمر الحالي للزوج (f141)
0.58	عدد الزوجات (f142)
0.00	انتماء النساء للفئتين العمريتين 15-54 سنة و 55-59 سنة (f143)
0.00	الولادات الحية (f201)
0.00	وجود أبناء أحياء (ذكورا أو إناث) يعيشون مع المبحوثة (f202)
0.00	عدد الأبناء الذكور الذين يعيشون مع المبحوثة (f203a)
0.00	عدد الأبناء الإناث اللاتي يعشن مع المبحوثة (f203b)
0.00	وجود أبناء أحياء (ذكورا أو إناث) لا يعيشون في البيت حاليا (f204)
0.00	عدد الأبناء (الذكور) الذين يعيشون في أماكن أخرى (f205a)
0.00	عدد البنات اللاتي يعشن في أماكن أخرى (f205b)
0.00	عدد الأبناء المولودين أحياء ثم توفوا (f206)
0.00	عدد الأبناء (الذكور) الذين ولدوا أحياء ثم توفوا (f207a)
0.00	عدد البنات اللاتي ولدن أحياء ثم توفين (f207b)
0.00	مجموع الولادات الحية (f208)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
0.01	حالات الحمل التي لم تنتهي بمولود حي (السقط، الإجهاض، الولادات الميتة) (f222)
0.48	عدد حالات الحمل التي انتهت بسقط (f223)
1.07	عدد حالات الحمل التي أعقبت بإجهاض (f223b)
0.77	عدد حالات الحمل التي انتهت بمولود ميت (f224)
1.01	مآل آخر حمل لم ينتج بولادة حية (سقط، إجهاض أو مولود ميت) (f224b)
39.51	شهر حدوث آخر حالة حمل انتهى بمولود ميت أو إجهاض أو سقط (f225a)
1.67	سنة تسجيل آخر حالة حمل انتهى بمولود ميت أو إجهاض أو سقط (f225b)
0.00	آخر حالة حمل انتهت بمولود ميت أو إجهاض أو سقط (قبل أو بعد يناير 1997) (للتحقق من f225a و f225b و f226)
2.61	عدد شهور آخر حمل انتهى بمولود غير حي (f227)
1.47	الدخول إلى المستشفى عقب انتهاء الحمل غير المتوج بولادة حية (f228)
0.52	عدد ليالي الاستشفاء (f229)
1.63	الكشف عن الحمل المنتهي بولادة غير حية (f230)
4.99	شهر أول كشف عن الحمل الذي لم ينتج بولادة حية (f231)
0.28	دافع أو سبب الكشف عن الحمل (f232)
2.50	عدد مرات الكشف خلال هذا الحمل (f233)
2.55	مكان إجراء آخر كشف عن الحمل (f234)
4.35	سبب عدم إجراء الكشف عن هذا الحمل (f235)
2.61	تناول أقراص أو شراب الحديد (f236a)
2.77	تناول فيتامينات أو كالسيوم أو مغنزيوم (f236b)
2.77	تناول أي دواء آخر (f236c)
4.56	أخذ الحقن لتحصين الجنين من التيتانوس (f237)
1.96	التعرض لنزيف مهبل حاد (f238a)
6.03	ارتفاع في ضغط الدم (f238b)
3.42	تورم في الوجه أو الجسم (f238c)
3.42	صداع حاد (f238d)
2.60	ألم أسفل البطن (f238e)
2.93	ارتفاع شديد في درجة الحرارة (f238f)
3.42	تشنجات غير ناجمة عن حمى (f238g)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
2.93	ألم عند التبول (f238h)
3.74	الصفرة (f238i)
3.26	صعوبة شديدة في التنفس (f238j)
7.17	التعرض لأعراض أخرى مع التحديد (f238k)
0.00	التحقق من السؤال f238 (f239)
0.22	تلقي النصيحة أو علاج الأعراض عند طبيب (f240a)
0.22	تلقي النصيحة أو علاج الأعراض عند ممرضة/ قابلة مؤهلة (f240b)
0.22	تلقي النصيحة أو علاج الأعراض عند صيدلي (f240c)
0.22	تلقي النصيحة أو علاج الأعراض عند قابلة تقليدية (f240d)
0.22	تلقي النصيحة أو علاج الأعراض عند عطار (عشاب) (f240e)
0.22	تلقي النصيحة أو علاج الأعراض عند أقارب (f240f)
0.22	تلقي النصيحة أو علاج الأعراض عند جهات أخرى (f240g)
0.22	عدم تلقي النصيحة أو علاج الأعراض (f240h)
2.90	أسباب عدم تلقي علاج الأعراض (f241)
0.70	تصنيف النسوة بالنظر إلى الحمل عند تاريخ الملاحظة (f242)
4.61	عدد شهور الحمل (f243)
1.11	الرغبة في الحمل الحالي (f244)
0.03	استمرار الدورة الشهرية (f245)
0.97	المدة منذ بداية آخر دورة شهرية (f246)
5.71	عمر المرأة عند أول دورة شهرية (f247)
0.00	تاريخ ميلاد آخر ولادة تمت بالنسبة ليناير 1997 (f248)
0.16	حالة المرأة الصحية بصفة عامة (f501)
0.49	تغير صحة المرأة مقارنة بالعام الماضي (f502)
0.05	الإصابة بداء السل (f503a)
0.08	الإصابة بداء السكري (f503b)
0.09	الإصابة بداء ضغط الدم (f503c)
0.08	الإصابة بداء الربو (f503d)
0.08	الإصابة بأمراض القلب (f503e)
0.08	الإصابة بأمراض المفاصل (f503f)
0.07	الإصابة بأمراض الكبد (f503g)
0.09	الإصابة بأمراض الكلى (f503h)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
0.08	الإصابة بالتهاب أو قرحة المعدة (f503i)
0.11	الإصابة بالأنيميا (f503j)
0.07	الإصابة بتضخم في الغدة الدرقية (f503k)
0.23	الإصابة بأمراض مزمنة أخرى (f503l)
0.00	كشف الطبيب عن داء السل و إخبار المصابات به (f504a)
0.00	كشف الطبيب عن داء السكري و إخبار المصابات به (f504b)
0.00	كشف الطبيب عن داء ضغط الدم و إخبار المصابات به (f504c)
0.00	كشف الطبيب عن داء الربو و إخبار المصابات به (f504d)
0.00	كشف الطبيب عن أمراض القلب و إخبار المصابات به (f504e)
0.00	كشف الطبيب عن أمراض المفاصل و إخبار المصابات به (f504f)
3.03	كشف الطبيب عن أمراض الكبد و إخبار المصابات به (f504g)
0.00	كشف الطبيب عن أمراض الكلى و إخبار المصابات به (f504h)
0.00	كشف الطبيب عن التهاب المعدة و إخبار المصابات به (f504i)
0.00	كشف الطبيب عن الأنيميا و إخبار المصابات به (f504j)
1.03	كشف الطبيب عن تضخم في الغدة الدرقية و إخبار المصابات به (f504k)
0.57	كشف الطبيب عن أمراض مزمنة أخرى و إخبار المصابات به (f504l)
4.00	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بداء السل (f505a)
2.48	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بداء السكري (f505b)
3.25	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بداء ضغط الدم (f505c)
5.00	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بداء الربو (f505d)
2.63	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بأمراض القلب (f505e)
7.55	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بأمراض المفاصل (f505f)
9.09	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بأمراض الكبد (f505g)
5.31	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بأمراض الكلى (f505h)
8.14	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بالتهاب المعدة (f505i)
3.38	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بالأنيميا (f505j)
4.12	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بتضخم في الغدة الدرقية (f505k)
6.68	أعمار النسوة عند اكتشافهن الإصابة بأمراض مزمنة أخرى (f505l)
4.00	تناول علاج داء السل بصفة مستمرة (f506a)
0.83	تناول علاج داء السكري بصفة مستمرة (f506b)
2.17	تناول علاج داء ضغط الدم بصفة مستمرة (f506c)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
1.43	تناول علاج داء الربو بصفة مستمرة (f506d)
3.51	تناول علاج أمراض القلب بصفة مستمرة (f506e)
3.40	تناول علاج أمراض المفاصل بصفة مستمرة (f506f)
6.06	تناول علاج أمراض الكبد بصفة مستمرة (f506g)
1.77	تناول علاج أمراض الكلى بصفة مستمرة (f506h)
2.71	تناول علاج التهاب المعدة بصفة مستمرة (f506i)
0.00	تناول علاج الأنيميا بصفة مستمرة (f506j)
1.03	تناول علاج تضخم الغدة الدرقية بصفة مستمرة (f506k)
0.57	تناول علاج الأمراض المزمنة الأخرى بصفة مستمرة (f506l)
0.05	المعاناة الآن أو سابقا من احد أنواع السرطان (f507)
50.00	نوع السرطان الذي تعاني (أو عانت) منه المبحوثات (f508)
28.57	عمر المرأة عند إخبارها أو اكتشافها بالإصابة بالسرطان (f509)
28.57	تلقي أي علاج (الآن / في الماضي) للسرطان (f510)
0.00	التحقق من السؤالين f208 و f222 (f510a)
1.34	الشعور بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل (f511)
8.56	مدة المعاناة من مشكلة الإحساس بثقل أسفل البطن نتيجة الحمل (f512)
0.84	تغير حالة الإحساس بثقل أسفل البطن عند السعال أو العطاس أو رفع شيء ثقيل (f513)
0.42	تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن عند طبيب (f514a)
0.42	تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن عند ممرضة/ قابلة مدربة (f514b)
0.42	تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن عند صيدلي (f514c)
0.42	تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن عند قابلة تقليدية (f514d)
0.42	تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن عند معالج تقليدي (f514e)
0.42	تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن عند عطار (عشاب) (f514f)
0.42	علاج الإحساس بثقل أسفل البطن ذاتيا (f514g)
0.42	تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن عند أقارب (f514h)
0.42	تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن عند شخص آخر (f514i)
0.42	عدم الاستشارة (f514j)



نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
5.14	عدم تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن للاعتقاد بأن ذلك لا يساعد (f515a)
5.14	عدم تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن بسبب التكلفة مرتفعة (f515b)
5.14	عدم تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن بسبب غياب الخدمة (f515c)
5.14	عدم تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن بسبب شغل المبحوثة أو زوجها (f515d)
5.14	عدم تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن لاعتبار أن المشكل لا يستدعي (f515e)
5.14	عدم تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن بسبب الإحراج (f515f)
5.14	عدم تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن بسبب الخوف (f515g)
5.14	عدم تلقي الاستشارة لعلاج الإحساس بثقل أسفل البطن لظروف أخرى (f515h)
1.23	مشكلة عدم التحكم في البول لدى المرأة عند السعال أو العطاس أو رفع شيء ثقيل (f516)
0.70	الاستشارة للعلاج أو تلقي النصيحة عن مشكلة عدم التحكم في البول لدى طبيب (f517a)
0.70	الاستشارة للعلاج أو تلقي النصيحة عن مشكلة عدم التحكم في البول لدى ممرضة/ قابلة مدربة (f517b)
0.70	الاستشارة للعلاج أو تلقي النصيحة عن مشكلة عدم التحكم في البول لدى صيدلي (f517c)
0.70	الاستشارة للعلاج أو تلقي النصيحة عن مشكلة عدم التحكم في البول لدى قابلة تقليدية (f517d)
0.70	الاستشارة للعلاج أو تلقي النصيحة عن مشكلة عدم التحكم في البول لدى معالج تقليدي (f517e)
0.70	الاستشارة للعلاج أو تلقي النصيحة عن مشكلة عدم التحكم في البول لدى عطار/ عشاب (f517f)
0.70	علاج مشكلة عدم التحكم في البول ذاتيا (f517g)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
0.70	الاستشارة للعلاج أو تلقي النصيحة عن مشكلة عدم التحكم في البول لدى أقارب (f517h)
0.70	الاستشارة للعلاج أو تلقي النصيحة عن مشكلة عدم التحكم في البول لدى شخص آخر (f517i)
0.70	عدم تلقي الاستشارة (f517j)
2.94	عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول نتيجة الحمل كونها لا تعتقد أن ذلك يساعد (f518a)
2.94	عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول نتيجة الحمل بسبب ارتفاع التكلفة (f518b)
2.94	عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول نتيجة الحمل بسبب غياب الخدمة (f518c)
2.94	عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول نتيجة الحمل كونها مشغولة/ الزوج مشغول (f518d)
2.94	عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول نتيجة الحمل بسبب اعتبار أن المشكل لا يستدعي (f518e)
2.94	عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول نتيجة الحمل كونها محرجة (f518f)
2.94	عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول نتيجة الحمل كونها خائفة (f518g)
2.94	عدم الاستشارة عن مشكلة عدم التحكم في البول نتيجة الحمل لأسباب أخرى (f518h)
0.08	المعاناة من آلام و حروق عند التبول خلال الثلاث أشهر التي سبقت المسح (f519a)
0.07	المعاناة من إفرازات مهبلية حادة أو غير مألوفة في الثلاث أشهر الماضية (f519b)
1.15	التعرض لهرش أو حساسية حول الجهاز التناسلي (f520a)
1.92	التعرض لإفرازات ذات رائحة كريهة (f520b)
5.11	التعرض لآلم حاد أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية (f520c)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
0.00	f519 ظهور مشكل واحد على الأقل أو لا وجود لأي مشكل بالنظر للسؤال (f521)
1.56	استشارة طبيب للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (f522a)
1.56	استشارة ممرضة أو قابلة مدربة للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (f522b)
1.56	استشارة صيدلي للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (f522c)
1.56	استشارة داية للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (f522d)
1.56	استشارة معالج تقليدي للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (f522e)
1.56	استشارة عطار للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (f522f)
1.56	علاج المشكلة ذاتيا (f522g)
1.56	استشارة أقارب للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (f522h)
1.56	استشارة شخص آخر للعلاج أو لتلقي النصيحة عن المشكلة (f522i)
1.56	عدم تلقي الاستشارة عن المشكلة (f522j)
7.97	عدم تلقي الاستشارة كونها لا تعتقد أن ذلك يساعد (f523a)
7.97	عدم تلقي الاستشارة بسبب ارتفاع التكلفة (f523b)
7.97	عدم تلقي الاستشارة بسبب غياب الخدمة (f523c)
7.97	عدم تلقي الاستشارة كونها مشغولة/ الزوج مشغول (f523d)
7.97	عدم تلقي الاستشارة بسبب أن المشكل لا يستدعي (f523e)
7.97	عدم تلقي الاستشارة كونها محرجة (f523f)
7.97	عدم تلقي الاستشارة كونها خائفة (f523g)
7.97	عدم تلقي الاستشارة لأسباب أخرى (f523h)
0.00	حالة الحمل حاليا بالنظر للسؤال f242 (f524)
0.00	حالة الحيض بالنظر للسؤال f245 (f525)
0.00	وضعية النساء اللاتي مازلن يحضن الزوجية بالنظر للسؤال f124 (f526)
0.66	رغبة الحمل دون جدوى (f527)
7.59	عدد أشهر محاولة الحمل دون جدوى (f528)
42.62	السبب الرئيسي من وراء فشل الحمل حسب رأي المبحوثة (f529)
0.63	استشارة طبيب لإنجاح الحمل (f530a)
0.63	استشارة ممرضة أو قابلة مدربة لإنجاح الحمل (f530b)
0.63	استشارة صيدلي لإنجاح الحمل (f530c)
0.63	استشارة قابلة تقليدية لإنجاح الحمل (f530d)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
0.63	استشارة معالج تقليدي لإنجاح الحمل (f530e)
0.63	استشارة عطار لإنجاح الحمل (f530f)
0.63	علاج ذاتي لإنجاح الحمل (f530g)
0.63	استشارة أقارب لإنجاح الحمل (f530h)
0.63	استشارة شخص آخر لإنجاح الحمل (f530i)
0.63	عدم تلقي الاستشارة لإنجاح الحمل (f530j)
7.20	عدم تلقي الاستشارة لإنجاح الحمل كونها لا تعتقد أن ذلك يساعد (f531a)
7.20	عدم تلقي الاستشارة لإنجاح الحمل بسبب ارتفاع التكلفة (f531b)
7.20	عدم تلقي الاستشارة لإنجاح الحمل بسبب غياب الخدمة (f531c)
7.20	عدم تلقي الاستشارة لإنجاح الحمل كونها مشغولة/ الزوج مشغول (f531d)
7.20	عدم تلقي الاستشارة لإنجاح الحمل بسبب أن المشكل لا يستدعي (f531e)
7.20	عدم تلقي الاستشارة لإنجاح الحمل كونها محرجة (f531f)
7.20	عدم تلقي الاستشارة لإنجاح الحمل كونها خائفة (f531g)
7.20	عدم تلقي الاستشارة لإنجاح الحمل لأسباب أخرى (f531h)
2.74	قيام الأزواج بالاستشارة لإنجاح الحمل (f532)
2.19	استشارة الأزواج طبيب قصد إنجاز الحمل (f533a)
2.19	استشارة الأزواج ممرضة قصد إنجاز الحمل (f533b)
2.19	استشارة الأزواج صيدلي قصد إنجاز الحمل (f533c)
2.19	استشارة الأزواج معالج تقليدي قصد إنجاز الحمل (f533d)
2.19	استشارة الأزواج عشاب قصد إنجاز الحمل (f533e)
2.19	استشارة الأزواج آخرين (مع التحديد) قصد إنجاز الحمل (f533f)
1.22	المعاناة من استمرار نزيف الدورة الشهرية أكثر من 7 أيام (f534a)
1.29	كثافة نزيف الدورة الشهرية بشكل غير معتاد (f534b)
1.47	صاحبب الدورة الشهرية آلام حادة (f534c)
1.40	المعاناة من عدم انتظام الدورة الشهرية (f534d)
0.00	وجود مشكل واحد على الأقل بالنظر للسؤال f534 (f535)
0.82	استشارة طبيب لمشاكل السؤال f534 (f536a)
0.82	استشارة ممرضة أو قابلة مدربة لمشاكل السؤال f534 (f536b)
0.82	استشارة صيدلي لمشاكل السؤال f534 (f536c)
0.82	استشارة قابلة تقليدية لمشاكل السؤال f534 (f536d)
0.82	استشارة معالج تقليدي لمشاكل السؤال f534 (f536e)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
0.82	استشارة عطار لمشاكل السؤال f534 (f536f)
0.82	معالجة ذاتية لمشاكل السؤال f534 (f536g)
0.82	استشارة أقارب لمشاكل السؤال f534 (f536h)
0.82	استشارة شخص آخر لمشاكل السؤال f534 (f536i)
0.82	عدم تلقي الاستشارة لمشاكل السؤال f534 (f536j)
5.50	عدم تلقي الاستشارة بسبب الاعتقاد أن ذلك لا يساعد (f537a)
5.50	عدم تلقي الاستشارة بسبب ارتفاع التكلفة (f537b)
5.50	عدم تلقي الاستشارة بسبب غياب الخدمة (f537c)
5.50	عدم تلقي الاستشارة كونها مشغولة/ الزوج مشغول (f537d)
5.50	عدم تلقي الاستشارة بسبب اعتبار أن المشكل لا يستدعي (f537e)
5.50	عدم تلقي الاستشارة بسبب الإحراج (f537f)
5.50	عدم تلقي الاستشارة بسبب الخوف (f537g)
5.50	عدم تلقي الاستشارة بسبب سن اليأس (f537h)
5.50	عدم تلقي الاستشارة بسبب أن هذه الحالة دائما (f537i)
5.50	عدم تلقي الاستشارة لأسباب أخرى (f537j)
1.23	المكان المعتاد لتلقي الرعاية الصحية (f538)
0.07	إعاقة عامل معرفة وجهة الذهاب لتلقي الرعاية الطبية (f539a)
0.12	إعاقة عامل الحصول على الإذن للذهاب لتلقي الرعاية الطبية (f539b)
0.11	إعاقة عامل الحصول على المال لتلقي الرعاية الطبية (f539c)
0.12	إعاقة عامل بعد المسافة إلى مركز الصحة لتلقي الرعاية الطبية (f539d)
0.11	إعاقة عامل ضرورة ركوب المواصلات لتلقي الرعاية الطبية (f539e)
0.08	إعاقة عامل عدم الرغبة في الذهاب بمفردك لتلقي الرعاية الطبية (f539f)
0.08	إعاقة عامل عدم وجود نسوة تقدمن الرعاية (f539g)
0.04	المعرفة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (f601)
0.52	المعرفة بمرض السفلي/ الزهري (f602a)
0.58	المعرفة بمرض السيلان (f602b)
0.68	المعرفة بمرض الفطار (f602c)
0.06	المعرفة بمرض الإيدز/ السيدا (f602d)
5.27	المعرفة بمرض أخرى مع التحديد (f602e)
9.34	إصابة النسوة بمرض السفلي/ الزهري خلال 12 شهرا الماضية (f603a)
9.80	إصابة النسوة بمرض السيلان خلال 12 شهرا الماضية (f603b)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
9.80	إصابة النسوة بمرض الفطار خلال 12 شهرا الماضية (f603c)
10.93	إصابة النسوة بأمراض أخرى منقولة جنسيا خلال 12 شهرا الماضية (f603d)
0.00	الإصابة بمرض أو أكثر حسب الحالة الزوجية بالنظر للسؤالين f124 و f603 (f604)
2.54	استشارة طبيب لعلاج الأمراض المنقولة جنسيا (f605a)
2.54	استشارة ممرضة/ قابلة مدربة لعلاج الأمراض المنقولة جنسيا (f605b)
2.54	استشارة صيدلي لعلاج الأمراض المنقولة جنسيا (f605c)
2.54	استشارة قابلة تقليدية لعلاج الأمراض المنقولة جنسيا (f605d)
2.54	استشارة معالج تقليدي لعلاج الأمراض المنقولة جنسيا (f605e)
2.54	استشارة عطار/ عشاب لعلاج الأمراض المنقولة جنسيا (f605f)
2.54	المعالجة الذاتية للأمراض المنقولة جنسيا (f605g)
2.54	استشارة أقارب لعلاج الأمراض المنقولة جنسيا (f605h)
2.54	استشارة آخرين (مع التحديد) لعلاج الأمراض المنقولة جنسيا (f605i)
2.54	عدم تلقي الاستشارة (f605j)
10.34	عدم تلقي الاستشارة بسبب أنها لا تعتقد أن ذلك يساعد (f606a)
10.34	عدم تلقي الاستشارة بسبب ارتفاع التكلفة (f606b)
10.34	عدم تلقي الاستشارة بسبب غياب الخدمة (f606c)
10.34	عدم تلقي الاستشارة بسبب أنها مشغولة أو الزوج مشغول (f606d)
10.34	عدم تلقي الاستشارة بسبب أن المشكل لا يستدعي (f606e)
10.34	عدم تلقي الاستشارة بسبب أنها محرجة (f606f)
10.34	عدم تلقي الاستشارة بسبب أنها خائفة (f606g)
10.34	عدم تلقي الاستشارة لأسباب أخرى (f606h)
0.00	الحالة الزوجية الحالية للنساء المصابات (بمرض أو أكثر) بالنظر للسؤال f124 (f607)
3.48	ذهاب الأزواج للاستشارة أو لعلاج نفس المرض (f608)
2.85	إصابة الزوج بأي من الأمراض المنقولة جنسيا خلال 12 شهرا الأخيرة (f609)
5.88	ذهاب الزوج للاستشارة أو العلاج (f610)
11.76	تلقي المرأة أي نصيحة أو علاج لنفس المرض عند إصابة الزوج (f611)
0.00	معرفة النساء لمرض الإيدز بالنظر للسؤال f602d (f612)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
0.26	تلقي أكبر قدر من المعلومات عن الايدز من الراديو (f613a)
0.26	تلقي أكبر قدر من المعلومات عن الايدز من التلفزيون (f613b)
0.26	تلقي أكبر قدر من المعلومات عن الايدز من الصحف/ المجلات (f613c)
0.26	تلقي أكبر قدر من المعلومات عن الايدز من الكتيبات/ الملصقات (f613d)
0.26	تلقي أكبر قدر من المعلومات عن الايدز من مرشدين صحيين (f613e)
0.26	تلقي أكبر قدر من المعلومات عن الايدز من المساجد/ الكنائس (f613f)
0.26	تلقي أكبر قدر من المعلومات عن الايدز من المدارس/ الأساتذة (f613g)
0.26	تلقي أكبر قدر من المعلومات عن الايدز من اجتماعات المنطقة (f613h)
0.26	تلقي أكبر قدر من المعلومات عن الايدز من أصدقاء/ أقارب (f613i)
0.26	تلقي أكبر قدر من المعلومات عن الايدز من مكان العمل (f613j)
0.26	تلقي أكبر قدر من المعلومات عن الايدز من مصادر أخرى (f613k)
9.06	معرفة النسوة لتنتقل الايدز عن طريق الاتصال الجنسي (f614a)
9.06	معرفة النسوة لتنتقل الايدز عن طريق عدم استخدام الواقي الذكري (f614b)
9.06	معرفة النسوة لتنتقل الايدز عن طريق نقل الدم (f614c)
9.06	معرفة النسوة لتنتقل الايدز عن طريق الحقن (f614d)
9.06	معرفة النسوة لتنتقل الايدز عن طريق لسعات البعوض (f614e)
9.06	معرفة النسوة لتنتقل الايدز بطرق أخرى (f614f)
12.41	معرفة النساء لإمكانية قيام المرء بشيء يجنبه الإصابة بالإيدز (f615)
0.65	معرفة تجنب الإصابة بالإيدز عن طريق الممارسة الجنسية الآمنة (f616a)
0.65	معرفة تجنب الإصابة بالإيدز باستخدام الواقي الذكري (f616b)
0.65	معرفة تجنب الإصابة بالإيدز بتجنب نقل الدم (f616c)
0.65	معرفة تجنب الإصابة بالإيدز بتجنب الحقن (f616d)
0.65	معرفة وسائل أخرى تجنب الإصابة بالإيدز (f616e)
0.00	تصنيف النساء بالنظر إلى أسباب عدم تنويع الحمل (f700)
0.34	استعمال وسائل تأخير أو منع الحمل في السابق (f701)
0.02	استعمال حبوب منع الحمل (f702a)
0.48	استعمال اللولب (f702b)
0.60	استعمال الحقن (f702c)
0.95	استعمال الغرز (f702d)
0.69	استعمال العازل الواقي للرجل (f702e)
0.62	استعمال العازل الواقي للمرأة (f702f)
0.67	استعمال الحاجز المهبلي (f702g)
0.76	استعمال المرهم أو الكريم الموضعي (f702h)
0.64	استعمال ربط الأنابيب الرحمية (f702i)
0.85	استعمال التعقيم (f702j)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
0.88	استعمال إطالة فترة الرضاعة الطبيعية (f702k)
0.69	استعمال فترة الأمان (f702l)
0.81	استعمال العزل (f702m)
2.33	استعمال وسائل أخرى مع التحديد (f702n)
0.39	عدد الأبناء الأحياء إن وجدوا حين استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أول مرة (f703)
1.61	غاية استخدام وسيلة تنظيم الأسرة لأول مرة (f704a)
0.00	استعمال الحبوب، الحقن، الغرس بالنظر للسؤال f702 (f704b)
3.56	عدد سنوات استعمال وسائل منع حمل المشتملة على هرمونات (الحبوب، الحقن، الغرس) (f704c)
0.00	الحالة الزوجية الحالية بالنظر للسؤال f124 (f705)
0.00	الحالة الحالية للحمل بالنظر للسؤال f242 (f706)
0.00	استعمال المرأة أو الزوج لأي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة لتجنب الحمل (f707)
0.13	وسيلة منع الحمل المستعملة (f708a)
0.00	استعمال اللولب في الماضي بالنظر للسؤالين f702 و f708a (f708b)
1.41	سبب عدم استعمال اللولب على الإطلاق (f708c)
22.90	مصادفة النزيف الدموي عند استعمال اللولب (f708da)
22.90	مصادفة التهاب/تقل اللولب عند استعمال اللولب (f708db)
22.90	تطلب متابعة طبية مستمرة عند استعمال اللولب (f708dc)
22.90	مصادفة مشكل ارتفاع التكلفة عند استعمال اللولب (f708dd)
22.90	صعوبة الحصول على الوسيلة (اللولب) (f708de)
22.90	عدم الارتياح للوسيلة (f708df)
22.90	اعتراض الزوج استعمال اللولب (f708dg)
22.90	مصادفة مشاكل أخرى عند استعمال اللولب (f708dh)
0.00	تصنيف النساء حسب نوع الوسيلة المستعملة بالنظر للسؤال f708a (f709a)
1.90	مصدر الحصول على (اسم الوسيلة الحالية) آخر مرة (f709b)
6.90	مكان إجراء عملية التعقيم (للرأة أو للزوج) (f709c)
0.40	السبب الرئيسي لاختيار عملية التعقيم (للرأة أو للزوج) (f709d)
1.21	معيار المدد (أشهر/سنوات) (f710a)
1.21	مدد استعمال الوسيلة دون انقطاع (f710b)
0.19	مصادفة مشاكل عند استعمال الوسيلة الحالية (f711)
0.72	مصادفة مشاكل صحية عند استعمال الوسيلة الحالية (f712a)



نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
0.72	مصادفة مشكل عدم فعالة الوسيلة الحالية (f712b)
0.72	اعتراض الزوج عند استعمال الوسيلة الحالية (f712c)
0.72	صعوبة الحصول على الوسيلة الحالية (f712d)
0.72	مصادفة مشكل ارتفاع الكلفة عند استعمال الوسيلة الحالية (f712e)
0.72	عدم الارتياح لاستعمال الوسيلة الحالية (f712f)
0.72	مصادفة مشاكل أخرى عند استعمال الوسيلة الحالية (f712g)
0.36	السبب الرئيسي لتوقف النساء عن استعمال وسائل تنظيم الأسرة (f713)
0.00	توزيع النساء حسب الحالة الزوجية الحالية بالنظر للسؤال f124 (f714)
10.55	النية في استعمال أي وسيلة لتنظيم الولادات مستقبلاً (f715)
2.03	السبب الرئيسي لعدم الرغبة في استعمال وسيلة لتنظيم الولادات في المستقبل (f716)
31.00	وقت بدء استعمال وسيلة تنظيم الولادات (f717)
3.87	الوسيلة المفضل استعمالها مستقبلاً (f718)
3.69	الموافقة على استعمال الأزواج لوسائل تنظيم الأسرة (f719)
0.00	الحالة الزوجية للنساء بالنظر للسؤال f124 (f720)
7.68	موافقة الزوج على استعمال الأزواج لوسائل تنظيم الولادات (f721)
5.54	عدد مرات التحدث مع الزوج عن تنظيم الولادات خلال السنة الماضية (f722)
0.00	الوسيلة المستعملة حالياً بالنظر للمتغير f708a (f724)
2.90	رغبة النساء الحوامل و غير الحوامل حالياً في إنجاب الأطفال مستقبلاً (f725)
1.87	جنس المولود القادم (f726)
0.00	مدة الانتظار المفضلة لدى النساء اللاتي يرغبن في إنجاب الطفل القادم (بالنظر للسؤال f242) (f727a)
8.44	الزمن الفاصل بين ولادتين (الحوامل) أو بعد تاريخ الملاحظة و الولادة المستقبلية (بالنظر للسؤال f242) (f727b)
0.82	حديث النساء مع أزواجهن حول عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم طوال حياتهن الإنجابية (f728)
27.36	مقارنة عدد الأطفال الذين يرغب فيهم الزوج بالنسبة للعدد المرغوب من طرف المرأة (f729)
0.64	عدد الأطفال المفضل من قبل المرأة (f730)
0.11	عدد الذكور بين عدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابهم طوال حياتهن (f731a)
0.00	عدد الإناث بين عدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابهم طوال حياتهن (f731b)
0.00	عدد الأطفال مهما كان جنس المولود (f731c)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
2.35	معيار المدد المفضلة بين ولادتين (f732a)
0.83	الفترة المفضلة بين ولادتين متتاليتين (f732b)
0.22	آراء النساء في مجال الأعمار الأنسب لزواج البنات (f733)
0.30	عدد الأطفال المفضلين من طرف النساء لبناتهن (f734)
0.66	الموافقة على دخول البنات لعالم الشغل (f735)
2.38	تلقي كشف نسائي خلال 12 شهراً الماضية (f904)
3.90	عدد مرات تلقي الكشف النسائي خلال 12 شهراً الماضية (f905)
0.43	مكان تلقي آخر كشف نسائي (f906)
3.12	عدم تلقي الاستشارة كونها ليست على علم بأهمية الكشف (f907a)
3.12	عدم تلقي الاستشارة كونها لم تشعر بالحاجة (f907b)
3.12	عدم تلقي الاستشارة بسبب التكلفة مرتفعة (f907c)
3.12	عدم تلقي الاستشارة بسبب غياب الخدمة (f907d)
3.12	عدم تلقي الاستشارة كونها مشغولة/ الزوج مشغول (f907e)
3.12	عدم تلقي الاستشارة كونها محرجة (f907f)
3.12	عدم تلقي الاستشارة كونها خائفة (f907g)
3.12	عدم تلقي الاستشارة لأسباب أخرى (مع التحدي) (f907h)
2.38	قيام النساء بعمليات المسحة (التطهر) خلال 12 شهراً الماضية (f908)
1.98	مكان عمل آخر مسحة (f909)
6.86	تكلفة المسحة آخر مرة (f910)
2.64	عدم تلقي المسحة كونها ليست على علم بالأهمية (f911a)
2.64	عدم تلقي المسحة كونها لم تشعر بالحاجة (f911b)
2.64	عدم تلقي المسحة بسبب ارتفاع التكلفة (f911c)
2.64	عدم تلقي المسحة بسبب الخدمة غير متوفرة (f911d)
2.64	عدم تلقي المسحة كونها مشغولة/ الزوج مشغول (f911e)
2.64	عدم تلقي المسحة كونها محرجة (f911f)
2.64	عدم تلقي المسحة كونها خائفة (f911g)
2.64	عدم تلقي المسحة لأسباب أخرى مع التحدي (f911h)
2.38	معرفة النساء بالفحص الذاتي للثدي لاكتشاف أورام الثدي مبكراً (f912)
1.18	الفحص الذاتي المنتظم للصدر (f913)
2.53	إجراء فحص الثدي لاكتشاف الأورام مبكراً خلال 12 شهراً الماضية (f914)
0.00	مكان تلقي آخر فحص طبي للثدي (f915)
3.42	تكلفة الفحص الطبي للثدي آخر مرة (f916)
2.69	عدم تلقي الفحص الطبي للثدي كونها ليست على علم بأهمية الفحص (f117a)
2.69	عدم تلقي الفحص الطبي للثدي كونها لم تشعر بالحاجة (f117b)
2.69	عدم تلقي الفحص الطبي للثدي بسبب ارتفاع التكلفة (f117c)

نسبة المعطيات الناقصة %	المتغير
2.69	عدم تلقي الفحص الطبي للثدي بسبب الخدمة غير متوفرة (f117d)
2.69	عدم تلقي الفحص الطبي للثدي كونها مشغولة/ الزوج (f117e)
2.69	عدم تلقي الفحص الطبي للثدي كونها محرجة (f117f)
2.69	عدم تلقي الفحص الطبي للثدي كونها خائفة (f117g)
2.69	عدم تلقي الفحص الطبي للثدي لأسباب أخرى (f117h)
2.35	تعريض الثديين للأشعة (f918)
1.19	تاريخ آخر تعرض للأشعة على مستوى الثديين (المدة) (f919)
0.00	مكان تلقي أشعة الثديين (آخر مرة) (f920)
13.10	تكلفة الأشعة (آخر خدمة) (f921)
2.54	أسباب عدم إجراء الأشعة على الثديين (f922)

## استمارة المسح الجزائري الخاص بصحة الأهل (تلف الخصوبة):

## A. FEUILLES DE MENAGE

## أ. قائمة أفراد الأسرة

IDENTIFICATION		البيانات التعريفية	
Wilaya:	_____	الولاية:	_____
Commune:	_____	البلدية:	_____
Strate :	_____	التشنت:	_____
Numéro du district :	_____	رقم المقاطعة:	_____
Numéro du ménage :	_____	رقم الأسرة المعيشية:	_____
Nom du chef de ménage : إسم رب الأسرة : _____			
Adresse du ménage : _____			
العنوان:			

Eligibilité		الأهلية	
Encercler le numéro de ligne de		للباحثة ضعي دائرة حول رقم سطر كل	
سيدة سبق لها الزواج و عمرها بين 15-59 سنة.	شباب/إطبلية لم يسبق له/لها الزواج و عمرها بين 15-29 سنة	اطفل عمره أقل من 6 سنوات	المسنين البالغين 60 سنة من العمر فأكثر
Toutes les femmes non-célibat-aires âgées 15-59 ans	Tous les jeunes célibat-aires âgés de 15-29 ans	Tous les enfants âgés de moins de 6 ans	Tous les vieux âgés de 60 ans et plus
107	108-A	108-B	108-C
رقم السطر			
Numéro de ligne			
01	01	01	01
02	02	02	02
03	03	03	03
04	04	04	04
05	05	05	05
06	06	06	06
07	07	07	07
08	08	08	08
09	09	09	09
10	10	10	10

## SECTION 1: CARACTERISTIQUES, RESSOURCES ET MARIAGE

القسم الأول : خلفية المبحوثة ومواردها والزواج

No.	QUESTIONS	الأسئلة	CODIFICATION		فئات الترميز	PASSER A
101	ENQUETRICE: INSCRIRE L'HEURE		Heure	الساعة		
	سجلي الوقت		Minutes	الدقائق		
102	Je voudrais tout d'abord vous poser quelques questions vous concernant. En quel mois et en quelle année êtes-vous née?		Mois	الشهر		
			Ne sait pas le mois	لا تعرف الشهر	98	
	أود أن أسألك بعض الأسئلة عن نفسك. في أي شهر وسنة ولدت؟		Année	السنة		
Ne sait pas l'année			لا تعرف السنة	9998		
103	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire? <b>Comparez et corrigez Q102 et/ou Q103 si incohérents</b>		Age en années révolues	العمر بالسنوات		
	كم عمرك الآن؟ قارني وصححي 102 و/أو 103 إذا اقتضى الأمر					
104	Avez-vous été à l'école? هل ذهبت أو تذهبن حالياً إلى مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية؟		Oui: actuellement	نعم: حالياً	1	
			Oui: dans le passé	نعم: في الماضي	2	
			Non	لا	3	108
105	Quel est le niveau d'éducation le plus élevé que vous avez atteint? ما هو أعلى مستوى دراسي التحقت به؟		Primaire	ابتدائي	1	
			Moyen	متوسط	2	
			Secondaire	ثانوي	3	
			Supérieur	جامعي	4	
106	Dans ce niveau, quelle est la dernière classe dans laquelle vous avez réussi? ما هي آخر سنة أكملتها بنجاح في هذا المستوى؟		Niveau d'instruction	السنة الدراسية		
107	VERIFIEZ Q105 & Q106 : Si 'Primaire' dans Q105 et '6' dans Q106, insistez : Avez-vous obtenu votre certificat primaire?		N'a pas achevé le cycle primaire	لم تكمل الابتدائية	1	
			A achevé au moins le cycle primaire	أكملت الابتدائي أو أعلى	2	109
	انظري إلى 105 و 106: إذا ابتدائي في 105 و "6" في 106 تفصي: هل تحصلت على الشهادة الابتدائية؟					
108	Pourriez-vous lire un journal ou une lettre par exemple ? هل بإمكانك قراءة رسالة أو جريدة مثلاً؟		Oui	نعم	1	
			Non	لا	2	110
108 B	Pourriez-vous écrire une lettre par exemple ? هل بإمكانك كتابة رسالة مثلاً؟		Oui	نعم	1	
			Non	لا	2	
109	Lisez-vous un journal ou une revue presque tous les jours, au moins une fois par semaine, moins qu'une fois par semaine, ou pas du tout ? هل تقرئين جريدة أو مجلة تقريباً يومياً، على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تقرئين على الإطلاق؟		Presque tous les jours	تقريباً يومياً	1	
			Au moins une fois par semaine	على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	2	
			Moins qu'une fois par semaine	أقل من مرة في الأسبوع	3	
			Pas du tout	لا تقرأ على الإطلاق	4	
110	Regardez-vous la télévision presque tous les jours, au moins une fois par semaine, moins qu'une fois par semaine, ou pas du tout ? هل تشاهدين التلفزيون تقريباً يومياً، على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تشاهدين على الإطلاق؟		Presque tous les jours	تقريباً يومياً	1	
			Au moins une fois par semaine	على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	2	
			Moins qu'une fois par semaine	أقل من مرة في الأسبوع	3	
			Pas du tout	لا تشاهد على الإطلاق	4	
111	Ecoutez-vous la radio presque tous les jours, au moins une fois par semaine, moins qu'une fois par semaine, ou pas du tout ? هل تستمعين إلى الراديو تقريباً يومياً، على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، أقل من مرة في الأسبوع أو لا تستمعين على الإطلاق؟		Presque tous les jours	تقريباً يومياً	1	
			Au moins une fois par semaine	على الأقل مرة واحدة في الأسبوع	2	
			Moins qu'une fois par semaine	أقل من مرة في الأسبوع	3	
			Pas du tout	لا تستمع على الإطلاق	4	

## RESSOURCES

## الموارد

112	Exercez-vous actuellement une profession ou un métier ? هل تمارسين حاليا مهنة؟	Oui نعم	1	116
		Non لا	2	
113	Comme vous le savez, quelques femmes exercent des activités pour lesquelles elles sont payées en espèces ou en nature. D'autres aident les membres de la famille dans le commerce ou l'agriculture. Exercez-vous actuellement l'une de ces activités ? كما تعلمين، بعض النساء يقمن ببعض الأعمال مقابل أجر نقدي أو عيني. وأخريات يساعدن أفراد الأسرة في نشاط تجاري أو فلاحي. هل تمارسين الآن إحدى هذه الأنشطة؟	Oui نعم	1	116
		Non لا	2	
114	Avez-vous travaillé dans le passé ? هل سبق لك أن عملت في الماضي؟	Oui نعم	1	124
		Non لا	2	
115	Avez-vous exercé une activité durant les 12 derniers mois ? هل قمت بأي عمل خلال الـ 12 شهرا السابقة؟	Oui نعم	1	
		Non لا	2	
116	Quel est (était) l'activité principale que vous exercez (exerciez) ? <b>DECLIRE LE TRAVAIL DECLARE PAR L'ENQUETEE ET L'INSCRIRE CLAIREMENT</b> ما هو نوع العمل الرئيسي الذي (كنت) تقومين به؟ اكتبي بالتفصيل نوع العمل كما ذكرته المبحوثة			
117	D'habitude, exercez-vous/exerciez-vous cette activité au foyer ou en dehors du foyer ?	Au foyer في المنزل	1	
		En dehors du foyer خارج المنزل	2	
118	Exercez-vous/Exerciez-vous ces activités en permanence, d'une manière saisonnière ou occasionnellement? وعادة هل (كنت) تقومين بهذه الأنشطة طوال السنة، أو موسميا، أم أحيانا؟	En permanence (le long de l'année) طوال السنة	1	
		D'une manière saisonnière موسميا	2	
		Occasionnellement أحيانا	3	
119	Etes-vous/Etiez-vous payée en espèces, en nature ou les deux ensemble pour ces activités ou n'êtes-vous/n'étiez-vous pas rémunérée? وهل (كنت) تعملين مقابل أجر نقدي أو عيني أو الاثنين معا أم (كنت) تعملين بدون مقابل؟	En espèces seulement أجر نقدي فقط	1	
		En espèces et en nature أجر نقدي وعيني معا	2	
		En nature seulement أجر عيني فقط	3	
		Non-rémunérée بدون مقابل	4	

MARIAGE						
124	A présent, êtes-vous mariée, veuve, divorcée ou séparée?		Mariée	متزوجة	1	
			Veuve	أرملة	2	
	هل أنت الآن متزوجة أو أرملة أو مطلقة أو منفصلة؟		Divorcée	مطلقة	3	
			Séparée	منفصلة	4	
125	Etes-vous mariée une seule fois ou plus d'une fois?		Une seule fois	مرة واحدة	1	
	هل تزوجت مرة واحدة أو أكثر من مرة؟		Plus d'une fois	أكثر من مرة	2	
126	<b>VERIFIEZ Q125: mariée</b>		انظري إلى 125: تزوجت	الشهر		
	Une seule fois	Plus d'une fois	Ne sait pas le mois	لا تعرف الشهر	98	
	En quel mois et en quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre mari?	Maintenant je voudrais vous parler de votre premier mariage. En quel mois et en quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre premier mari?	Année	السنة		
	مرة واحدة	أكثر من مرة	Ne sait pas l'année	لا تعرف السنة	9998	
127	Quel âge aviez-vous quand vous aviez commencé à vivre avec votre (premier) mari? <b>COMPAREZ &amp; CORRIGEZ Q126 ET/OU Q127 SI INCOHERENTS</b>		Age en années révolues	العمر عند الزفاف بالسنوات		
	كم كان عمرك عند زفافك إليه؟ قارني وصحي 126 و/أو 127 إذا اقتضى الأمر					
128	Avez-vous (aviez-vous) un lien de parenté avec votre (dernier) mari? <b>SI 'OUI' POSEZ: Quel est (était) ce lien?</b>		Cousin germain paternel	ابن عم/ابن عمة	1	
			Cousin germain maternel	ابن خال/ابن خالة	2	
	هل (كانت) توجد صلة قرابة بينك وبين زوجك الحالي (الآخر)؟ إذا كانت الإجابة "نعم" اسألي: ما هي صلة القرابة؟		Autre lien	علاقة أخرى	3	
			Sans lien de parenté	لا توجد صلة قرابة	4	
129	Votre (dernier) mari, est-il jamais allé à l'école?		Oui	نعم	1	133
			Non	لا	2	
	هل سبق لزوجك الحالي (الآخر) أن التحق في يوماً ما بالمدرسة؟		Ne sait pas	لا تعرف	8	
130	Quel est le niveau d'éducation le plus élevé qu'il a atteint?		Primaire	ابتدائي	1	
			Moyen	متوسط	2	
	ما هو أعلى مستوى دراسي التحق به؟		Secondaire	ثانوي	3	
			Supérieur	جامعي	4	
			Ne sait pas	لا تعرف	8	133
131	Dans ce niveau, quelle est la dernière classe qu'il avait réussi?		Dernière classe réussie	آخر سنة دراسية أكملها بنجاح		
	وما هي آخر سنة أكملها بنجاح في هذا المستوى؟		Ne sait pas	لا تعرف	98	
132	<b>VERIFIEZ Q130 &amp; Q131: Si 'Primaire' dans Q130 et '6' dans Q131 Insistez: A-t-il obtenu son certificat primaire?</b>		N'a pas achevé le cycle primaire ou ne sait pas dernière classe du primaire	لم يكمل الابتدائية أو لا تعرف آخر سنة أكملها في الابتدائي	1	
	انظري إلى 130 و 131: إذا "ابتدائي" في 130 و "6" في 131 تفصي: هل تحصل على الشهادة الابتدائية؟		A achevé au moins le cycle primaire	أكمل الابتدائي أو أعلى	2	135

MARIAGE (Suite)					
133	Peut-il (pouvait-il) lire une lettre ou un journal par exemple?	Oui نعم	1	135	
		Non لا	2		
	هل بإمكانه (كان بإمكانه) أن يقرأ خطاباً أو جريدة مثلاً؟	Ne sait pas لا تعرف	8		
134	Peut-il (pouvait-il) écrire une lettre par exemple?	Oui نعم	1		
		Non لا	2		
	هل بإمكانه (كان بإمكانه) أن يكتب جواب مثلاً؟	Ne sait pas لا تعرف	8		
135	Quel est (était) son occupation, c'est-à-dire, quel genre de travail fait-il (faisait-il) principalement? <b>INSCRIRE EXACTEMENT LA REPONSE DONNEE</b> ما هي (ماذا كانت) مهنته الرئيسية، أعني ما نوع العمل الأساسي الذي يقوم (كان يقوم) به؟ اكتب الإجابة بالضبط كما ذكرتها المبحوثة	_____	_ _ _	140	
		Est (était) chômeur عاطل (كان عاطل) عن العمل	996		
		Ne sait pas لا تعرف	998		
136	Quel est (était) sa situation dans la profession ?	Employeur مستخدم	1		
		Indépendant مهنة حرة	2		
	ما هي (ما كانت) وضعيته في المهنة؟	Salarié permanent أجير دائم	3		
		Salarié permanent non أجير غير دائم	4		
	Apprenti متعمرن	5			
	Aide familial مساعد عائلي	6			
	Ne sait pas لا تعرف	8			
140	VERIFIEZ Q124:	Actuellement mariée متزوجة حالياً (متزوجة) منفصلة)	1	143	
	انتظري إلى 124:	Non-mariée actuellement غير متزوجة حالياً (أرملة) مطلقة)	2		
141	Quel âge a votre mari maintenant?	Age en années révolues العمر بالسنوات	_ _		
	ما هو عمر زوجك الآن؟	Ne sait pas لا تعرف	98		
142	Votre mari a-t-il une autre épouse?	Nombre des autres épouses عدد الزوجات الأخريات	_		
	<b>SI 'OUI' POSEZ:</b> Combien d'autres épouses a-t-il?	هل توجد في عصمة زوجك أي زوجة أخرى؟	Non لا		4
	إذا كانت الإجابة "نعم" اسألي: كم زوجة أخرى في عصمة زوجك حالياً؟	Ne sait pas لا تعرف	8		
143	VERIFIEZ Q103:	Agée de 15-54 ans عمر السيدة 15-54 سنة	1	801	
	انتظري إلى 103:	Agée de 55-59 ans عمر السيدة 55-59 سنة	2		



## SECTION 2: REPRODUCTION ET SURVIE DES ENFANTS

القسم الثاني : الإجابات ووفيات الأطفال

No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A
201	A présent, je voudrais vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eu durant votre vie. Avez-vous jamais mis au monde un enfant vivant?	Oui نعم	1	
	أود الآن أن أسألك عن جميع الأطفال الذين رزقت بهم طوال حياتك. هل رزقت بأي طفل أو طفلة ولد حيا؟	Non لا	2	206
202	Avez-vous donné naissance à des fils ou à des filles qui vivent actuellement avec vous?	Oui نعم	1	
	هل رزقت بأبناء أحياء ذكور أو بنات يعيشون الآن معك؟	Non لا	2	204
203	De vos fils, combien vivent avec vous? Et de vos filles, combien vivent avec vous? <b>SI AUCUN INSCRIVEZ '00'</b>	Nombre de fils à la maison عدد الأولاد الذكور في المنزل		
	كم عدد الأبناء الذكور الذين يعيشون معك؟ وكم عدد البنات اللاتي يعشن معك؟ إذا لم يوجد سجلي "صفر/صفر"	Nombre de filles à la maison عدد البنات في المنزل		
204	Avez-vous donné naissance à des fils ou à des filles qui sont en vie mais qui ne vivent pas actuellement avec vous?	Oui نعم	1	
	هل رزقت بأبناء ذكور أو بنات لا يعيشون معك في البيت حاليا؟	Non لا	2	206
205	De vos fils, combien sont vivants mais n'habitent pas avec vous? Et de vos filles, combien sont vivantes mais n'habitent pas avec vous? <b>SI AUCUN INSCRIVEZ '00'</b>	Nombre de fils vivant ailleurs عدد الأولاد الذكور في مكان آخر		
	كم عدد الأبناء الذكور الذين لا يعيشون معك في البيت الآن؟ وكم عدد البنات اللاتي لا يعشن معك في البيت الآن؟ إذا لم يوجد سجلي "صفر/صفر"	Nombre de filles vivant ailleurs عدد البنات في مكان آخر		
206	Avez-vous déjà mis au monde un garçon ou une fille qui est né(e) vivant(e), mais qui est décédé(e) par la suite? <b>SI 'NON' INSISTEZ :</b> Je veux dire un bébé qui au moment de sa naissance a poussé un cri ou a montré un signe de vie quelconque mais n'a pas vécu que quelques heures ou jours?	Oui نعم	1	
	هل سبق أن أنجبت ولدا أو بنتا توفى أو توفيت فيما بعد حتى ولو أن الطفل لم يعيش سوى فترة قصيرة؟ إذا كانت الإجابة "لا" تقصي أعني أن أقول أي طفل أو طفلة ظهرت عليه أو عليها أي علامة من علامات الحياة مثل البكاء حتى وأن لم يعيش سوى أيام أو ساعات قليلة؟	Non لا	2	208
207	En tout, combien de garçons sont décédés? Et combien de filles sont décédées? <b>SI AUCUN INSCRIVEZ '00'</b>	Garçons décédés عدد الأولاد الذكور الذين توفوا		
	كم عدد الأطفال الذكور الذين توفوا؟ وكم عدد البنات اللاتي توفين؟	Filles décédées عدد البنات اللاتي توفين		
208	<b>ADDITIONNEZ LES REPONSES DE Q203, Q205 &amp; Q207 ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUN INSCRIVEZ '00'</b>	Total des naissances vivantes		
	اجمعي الاجوبة للأسئلة 203 و 205 و 207 وسجلي المجموع. إذا لم يوجد سجلي "صفر/صفر"			

No.	QUESTIONS	الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A
221	<p><b>COMPARER Q208 AVEC LE NOMBRE DE NAISSANCES DANS LE TABLEAU PRECEDANT PUIS COCHEZ LA CASE APPROPRIEE:</b></p> <p><b>MEME NOMBRE</b> الأعداد متطابقة</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><b>VERIFIEZ :</b></p> <p>Pour chaque naissance : l'année de naissance a été enregistrée.</p> <p>Pour chaque enfant vivant : l'âge actuel a été enregistré</p> <p>Pour chaque enfant décédé : l'âge au décès a été enregistré</p> <p>Pour chaque âge au décès égal à 12 mois ou 1 an : insistez pour déterminer le nombre exact de mois</p>	<p><b>NOMBRE DIFFERENT</b> الأعداد مختلفة</p> <p><input type="checkbox"/> →</p> <p>Vérifiez et conciliez les réponses</p> <p>تقسي وصحي</p> <p>تأكد من التالي:</p> <p>لكل ولادة حية: سنة الميلاد مسجلة</p> <p>لكل طفل مازال على قيد الحياة: تم تسجيل العمر الحالي</p> <p>لكل طفل توفي: تم تسجيل العمر عند الوفاة</p> <p>لكل عمر عند الوفاة يساوي 12 شهرا أو سنة: تقصيت لتعرفي العمر بالشهور بالضبط</p>	<p>عدد حالات الإجهاض</p> <p>عدد حالات الإجهاض</p> <p>عدد حالات المواليد المتوتى</p> <p>سقط</p> <p>الشهر</p> <p>السنة</p> <p>عدد شهور الحمل</p> <p>لا تعرف</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>98</p>	<p>242</p> <p>242</p> <p>242</p>
222	<p>Quelques grossesses se terminent avant terme par une fausse couche ou un avortement, tandis que d'autres grossesses se terminent par un mort-né. Avez-vous déjà eu une grossesse qui ne s'est pas terminée en une naissance vivante?</p> <p>بعض حالات الحمل تنتهي قبل موعدها مثل حالات السقط أو الإجهاض، وبعض حالات الحمل الأخرى تنتهي بمولود ميت.</p> <p>هل حدث لك أي حالة حمل لم تنتهي بمولود حي؟</p>	<p>Oui</p> <p>Non</p>	<p>نعم</p> <p>لا</p>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>242</p>
223	<p>En tout, combien de vos grossesses se sont terminées par des fausses couches? في الإجمالي كم عدد حالات الحمل التي انتهت بسقط؟</p>	<p>Nombre de fausses couches</p>	<p>عدد حالات السقط</p>	<p>1</p>	
223 B	<p>En tout, combien de vos grossesses se sont terminées par des avortements volontaires? في الإجمالي كم عدد حالات الحمل التي انتهت بلجهاض؟</p>	<p>Nombre d'avortements</p>	<p>عدد حالات الإجهاض</p>	<p>1</p>	
224	<p>Et combien de vos grossesses se sont terminées par des morts-nés? وفي الإجمالي كم عدد حالات الحمل التي انتهت بمولود ميت؟</p>	<p>Nombre de morts-nées</p>	<p>عدد حالات المواليد المتوتى</p>	<p>1</p>	
224 B	<p>La dernière grossesse perdue s'est terminée par une fausse couche, un avortement volontaire ou un mort-né? آخر حالة حمل لم تنتهي بمولود حي انتهت بسقط أو إجهاض أو مولود ميت؟</p>	<p>Fausse couche</p> <p>Avortement volontaire</p> <p>Mort-né</p>	<p>سقط</p> <p>إجهاض</p> <p>مولود ميت</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	
225	<p>En quel mois et en quelle année s'est terminée cette grossesse de ce type? في أي شهر وسنة انتهت آخر حالة حمل انتهت بمولود ميت أو إجهاض أو سقط؟</p>	<p>Mois</p> <p>Année</p>	<p>الشهر</p> <p>السنة</p>	<p>1</p> <p>2</p>	
226	<p><b>VERIFIEZ Q225: DERNIERE GROSSESSE PERDUE A ETE TERMINEE</b></p> <p>انظري إلى 225: حالة الحمل انتهت</p>	<p>En Jan. 1997 ou plus tard</p> <p>Avant Jan. 1997</p>	<p>في يناير 1997 أو ما بعده</p> <p>قبل يناير 1997</p>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>242</p>
227	<p>A présent, je voudrais vous poser quelques questions sur cette dernière grossesse que vous avez perdue. De combien de mois étiez vous enceinte quand vous avez perdu cette grossesse ?</p> <p>الآن أود أن أسألك بعض الأسئلة عن آخر حالة حمل لم تنتهي بمولود حي. كم كانت عدد شهور الحمل عندما انتهت حالة الحمل هذه؟</p>	<p>Mois de la perte de la grossesse</p> <p>Ne sait pas</p>	<p>عدد شهور الحمل</p> <p>لا تعرف</p>	<p>1</p> <p>98</p>	

228	Suite à la perte de cette grossesse, avez-vous été hospitalisée? عندما انتهى هذا الحمل هل اضطرت للدخول إلى المستشفى؟	Oui نعم	1	230
		Non لا	2	
229	Combien de nuits avez-vous passé à l'hôpital ? لثم من ليلة تعين عليك البقاء في المستشفى؟	Nombre de nuits عدد الليالي	_ _	95
		Sortie le même jour خرجت في نفس اليوم		
230	Durant cette grossesse, avez-vous subi une consultation prénatale? <b>SI 'OUI' POSEZ:</b> Qui avez-vous consulté? Qui d'autre? <b>Inscrire toutes les personnes mentionnées</b> خلال هذا الحمل هل عرضت نفسك على أي شخص للكشف عن الحمل؟ إذا كانت الإجابة "نعم": لمن ذهبت للكشف عنك؟ هل من شخص آخر؟ سجلي كل الأشخاص الذين كشفت عنهم	Médecin طبيب	A	235
		Sage femme diplômée/ infirmière قابلة/ممرضة مؤهلة	B	
		Accoucheuse traditionnelle (Matrone) قابلة تقليدية	C	
		Grossesse non suivie لا أحد	Y	
231	De combien de mois étiez-vous enceinte quand vous avez effectué votre première consultation prénatale? في أي شهر من حملك ذهبت للكشف لأول مرة؟	Mois الشهور	_ _	98
		Ne sait pas لا تعرف		
232	Qu'est-ce qui vous a poussé principalement à effectuer votre première consultation prénatale? <b>INSISTEZ POUR AVOIR LA RAISON PRINCIPALE</b> ما هو الدافع الذي أدى إلى أن تعرضين نفسك للكشف لأول مرة؟ نقصي عن أهم سبب	Vérifier qu'elle est enceinte للتأكد من أنها حامل	01	
		Vérifier que le bébé est en bonne santé للتأكد من سلامة الجنين	02	
		Pour assurer une bonne grossesse لضمان حمل صحي	03	
		Elle a eu des complications كان لديها مشكلة	04	
		Consultation de routine كشف روتيني	05	
		Réserver pour l'accouchement للحجز للولادة	06	
		Autre (spécifier) أخرى (تحدد):	96	
233	Combien d'exams avez-vous eu durant toute la période de cette grossesse? كم كان عدد مرات الكشف خلال حملك هذا؟	Nombre d'exams عدد مرات الكشف	_ _	98
		Ne se rappelle pas لا تتذكر		
234	Où avez-vous eu votre dernier examen sur cette grossesse? أين أجريت آخر كشف عن هذا الحمل؟	Hôpital/ maternité مستشفى/ مركز أمومة	1	236
		Polyclinique/ centre de santé مصحة متعددة الخدمات/ مراكز صحي	2	
		Clinique privée مصحة خاصة	3	
		Médecin privé لدى طبيب خاص	4	
		A domicile في المنزل	5	
		Autre (spécifier) أخرى (تحدد):	6	
235	Quelle était la raison principale pour laquelle vous n'avez pas eu de consultations prénatales durant cette grossesse? <b>INSISTEZ POUR AVOIR LA RAISON PRINCIPALE</b> لماذا لم تتلقى أي كشف عن هذا الحمل؟ نقصي عن السبب الرئيسي	Ne constitue pas un problème عدم وجود متاعب	1	
		Avait une expérience antérieure لديها خبرة سابقة	2	
		Service non disponible الخدمة غير موجودة	3	
		Coût élevé التكلفة مرتفعة	4	
		Elle ou époux très occupé مشغولة/ الزوج مشغول	5	
		Autre (spécifier) أخرى (تحدد):	6	

236	Durant cette grossesse avez-vous pris un des produits suivants?  خلال فترة هذا الحمل هل تناولت أي من الأشياء التالية؟		<b>OUI</b>	<b>NON</b>		
			نعم	لا		
		Comprimés ou sirop de fer أقراص أو شراب حديد	1	2		
	Vitamine, calcium, magnésium فيتامينات، كالسيوم، مغنزيوم	1	2			
	Autres médicaments أي دواء آخر	1	2			
237	Durant cette grossesse, vous a-t-on administré une injection antitétanique, c'est-à-dire une injection dans le bras pour protéger le bébé contre les convulsions post-natales? <b>SI 'OUI' POSEZ:</b> Combien d'injections avez-vous eu?  خلال فترة هذا الحمل، هل أخذت أي حقن لتحصين الجنين من التيتانوس؟ أقصد أي حقنة في الذراع لتحمي الجنين من التشنجات بعد الولادة؟ <b>إذا كانت الإجابة "نعم" اسألني: كم حقنة أعطيت لك؟</b>	Oui: une injection نعم: جرعة واحدة	1			
		Oui: deux injections نعم: جرعتين	2			
		Oui: trois injections نعم: ثلاث جرعات	3			
		Non لا	4			
		Ne sait pas لا تعرف	8			
238	Durant cette grossesse, avez-vous éprouvé l'une des complications suivantes?  <b>LIRE CHAQUE CATEGORIE TOUT HAUT ET ENCERCLEZ LES REPONSES CORRESPONDANTES</b>  في أي وقت خلال هذا الحمل، هل عانيت من أي من المضاعفات التالية؟  <b>أقرني كل واحدة وسجلي الإجابة المناسبة</b>		<b>نعم</b>	<b>لا</b>	<b>لا تعرف</b>	
			<b>OUI</b>	<b>NON</b>	<b>NSP</b>	
		Ecoulement de sang vaginal aigu نزيف مهلي حاد	1	2	8	
		Hypertension ارتفاع في ضغط الدم	1	2	8	
		Œdème du visage ou du corps تورم في الوجه أو الجسم	1	2	8	
		Céphalée صداع حاد	1	2	8	
		Douleurs hypogastriques ألم في أسفل البطن	1	2	8	
		Hyperthermie ارتفاع شديد في درجة الحرارة	1	2	8	
		Convulsion (non dû à la fièvre) تشنجات غير ناجمة عن حمى	1	2	8	
		Brûlures mictionnelles ألم عند التبول	1	2	8	
		Jaunisse/ ictère الصفرة	1	2	8	
Essoufflement (dyspnée) صعوبة شديدة في التنفس	1	2	8			
Autre (préciser) _____ أخرى (تحدد):	1	2	8			
239	<b>VERIFIEZ Q238:</b>  انظري إلى <b>238</b> :	Oui pour au moins une complication نعم لأي من الأعراض	1			
		Non ou NSP pour toutes les complications لا أو لا تعرف لكل الأعراض	2		<b>242</b>	
240	Avez-vous reçu un traitement ou un conseil quelconque concernant cette (ces) complication(s)? <b>SI 'OUI' POSEZ:</b> De la part de qui? Qui d'autre?  هل تلقيت أي نصيحة أو علاج لهذه الأعراض؟ <b>إذا كانت الإجابة "نعم" اسألني: ممن؟ هل من شخص آخر؟</b>	Médecin طبيب	A		<b>242</b>	
		Infirmière/ sage femme qualifiée ممرضة/ قابلة مؤهلة	B			
		Pharmacien صيدلي	C			
		Accoucheuse traditionnelle (Matrone) قابلة تقليدية	D			
		Herboriste عطار (عشاب)	E			
		Parent proche أقارب	F			
		Autre (spécifier) _____ أخرى (تحدد):	X			
Non لا أحد	Y					

241	<p>Pourquoi n'avez-vous pas cherché à recevoir un traitement médical pour cette (ces) complication(s)?</p> <p><b>INSISTEZ POUR AVOIR LA RAISON PRINCIPALE</b></p> <p>لماذا لم تسعى إلى تلقي استشارة طبية لعلاج هذه الأعراض؟ تقصي عن أهم سبب</p>	Ne constitue pas un problème	لا يشكل مشكلة	01	
		Avait une expérience antérieure	لديها تجربة سابقة	02	
		Service non disponible	الخدمة غير متوفرة	03	
		Coût élevé	التكلفة مرتفعة	04	
		Elle ou époux très occupé	مشغولة/ الزوج مشغول	05	
		A utilisé traitement traditionnel	استعملت علاج غير طبي	06	
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد): _____	96	
242	<p>Etes-vous enceinte actuellement?</p> <p>هل أنت حامل حالياً؟</p>	Oui	نعم	1	245
		Non	لا	2	
		N'est pas sûre	غير متأكدة	8	
243	<p>De combien de mois êtes-vous enceinte?</p> <p><b>INSCRIVEZ LE NOMBRE DE MOIS REVOLUS</b></p> <p>منذ كم شهراً بدأ هذا الحمل؟ سجلي عدد الشهور التي تمت</p>	Mois de grossesse révolus	مدة الحمل بالشهور	_  _	
		Ne sait pas	لا تعرف	98	
244	<p>Au moment où vous êtes tombée enceinte, cette grossesse était-elle désirée à ce moment là, désirée pour plus tard ou non désirée du tout?</p> <p>عندما أصبحت حاملاً، هل كنت تريدين أن تصبحي حاملاً وقتها، أو هل كنت تريدين الانتظار لوقت لاحق، أو لم تكوني ترغبين في الحمل على الإطلاق؟</p>	A ce moment là	كانت تريد الحمل وقتها	1	247
		Plus tard	كانت تريد الانتظار	2	
		Non désirée	لم تكن ترغب في الحمل على الإطلاق	3	
245	<p>Est-ce que vous avez toujours vos règles?</p> <p>هل مازالت تأتيك الدورة الشهرية؟</p>	Oui	نعم	1	247
		Non en ménopause	لا: انقطعت (سن اليأس)	2	
		Non en aménorrhée (post partum)	لا: في فترة نفاس	3	
		N'a jamais eu de règles	لم تحيض أبداً	4	
246	<p>Depuis quand avez-vous eu vos dernières règles?</p> <p>متى بدأت آخر دورة شهرية جاءت لك؟</p>	Il y a moins d'un mois	منذ أقل من شهر	1	
		Entre 1 et 3 mois	ما بين شهر و 3 شهور	2	
		Entre 3 et 6 mois	ما بين 3 و 6 شهور	3	
		Entre 6 et 12 mois	ما بين 6 و 12 شهر	4	
		Il y a plus de 12 mois	منذ أكثر من 12 شهر	5	
		Ne se rappelle pas	لا تتذكر	8	
247	<p>A quel âge avez-vous eu vos règles pour la première fois?</p> <p>كم كان عمرك عندما بدأت عندك الدورة الشهرية لأول مرة؟</p>	Age en années	العمر بالسنوات	_  _	
		Ne sait pas/ ne se rappelle pas/ n'est pas sûre	لا تعرف/ لا تتذكر/ غير متأكدة	98	
248	<p><b>VERIFIEZ Q215 POUR LA DATE DE NAISSANCE DU DERNIER ENFANT</b></p> <p>انظري في السؤال 215 إلى تاريخ ميلاد آخر مولود في الجدول</p>	Dernière naissance en Janv.1997 ou plus tard	آخر ولادة تمت في يناير 1997 أو ما بعده	1	501
		Dernière naissance avant Jan. 1997 ou pas de naissances du tout	آخر ولادة تمت قبل يناير 1997 أو ليس لديها مواليد	2	

## SECTION 5: MORBIDITE CHRONIQUE ET MALADIES DE LA REPRODUCTION

القسم الخامس: انتشار الأمراض المزمنة واعتلال الصحة بسبب الإجاب

No.	QUESTIONS	الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A
501	A présent, je voudrais discuter avec vous sur votre santé d'une manière générale et des problèmes de santé spécifiques dont souffrent certaines femmes. En général, jugez-vous que votre santé est bonne, moyenne (satisfaisante) ou mauvaise ? الآن أود أن أتحدث معك عن صحتك بصفة عامة وعن بعض المشاكل الصحية التي تعاني منها النساء بصفة عامة، هل تعتبري أن صحتك جيدة أو متوسطة أو سيئة؟	Bonne جيدة Moyenne متوسطة Mauvaise سيئة		1	
				2	
				3	
502	Comparée à la même période de l'année dernière, jugez-vous que votre santé s'est améliorée, est restée la même ou s'est détériorée par rapport à l'année dernière? مقارنة بالعام الماضي، هل تعتبري أن صحتك تحسنت أو بقيت كما هي أو ساءت؟	S'est améliorée تحسنت La même كما هي S'est détériorée ساءت		1	
				2	
				3	

**ENQUETRIC: Ce tableau contient des questions concernant les maladies chroniques. Posez Q503 en commençant par la première maladie. Si la réponse est affirmative posez Q504-Q506 avant de passer à la maladie suivante.**

**للإحثة: هذا الجدول يحتوي على أسئلة عن الأمراض المزمنة. اسألني 503 ابتداء بالمرض الأول، وإذا كانت الإجابة نعم اسألني الأسئلة من 504 إلى 506 قبل الانتقال للمرض التالي**

		503		504		505		506		
		Souffrez-vous actuellement ou avez-vous souffert dans le passé des maladies suivantes? هل تعانيين الآن أو عانيت في السابق من أي من المشاكل الصحية التالية؟		Est-ce qu'un médecin vous a informé que vous avez (NOM DE MALADIE)? هل قام طبيب بأخبارك أن لديك (اسم المرض)؟		Quel âge aviez-vous lorsqu' on vous a informé pour la première fois, ou lorsque vous avez découvert que vous aviez (NOM DE MALADIE)? كم كان عمرك عندما تم إخبارك أو اكتشفت أن لديك (اسم المرض)؟		Prenez-vous à présent un traitement régulier pour (NOM DE MALADIE)? هل تتناولين الآن علاجاً لهذا المرض بصفة مستمرة؟		
		PASS EZ A		انتقلي إلى		هل قام طبيب بأخبارك أن لديك (اسم المرض)؟		كم كان عمرك عندما تم إخبارك أو اكتشفت أن لديك (اسم المرض)؟		
01	Tuberculose? السل؟	Oui نعم	1	→	Oui نعم	1	Age العمر		Oui نعم	1
		Non لا	2	Suivante التالي	Non لا	2	NSP لا تعرف	98	Non لا	2
02	Diabètes? السكري؟	Oui نعم	1	→	Oui نعم	1	Age العمر		Oui نعم	1
		Non لا	2	Suivante التالي	Non لا	2	NSP لا تعرف	98	Non لا	2
03	Hypertension ? ضغط الدم؟	Oui نعم	1	→	Oui نعم	1	Age العمر		Oui نعم	1
		Non لا	2	Suivante التالي	Non لا	2	NSP لا تعرف	98	Non لا	2
04	Asthme? الربو؟	Oui نعم	1	→	Oui نعم	1	Age العمر		Oui نعم	1
		Non لا	2	Suivante التالي	Non لا	2	NSP لا تعرف	98	Non لا	2
05	Maladie cardio-vasculaire? أمراض القلب؟	Oui نعم	1	→	Oui نعم	1	Age العمر		Oui نعم	1
		Non لا	2	Suivante التالي	Non لا	2	NSP لا تعرف	98	Non لا	2
06	Maladie articulaire? أمراض المفاصل؟	Oui نعم	1	→	Oui نعم	1	Age العمر		Oui نعم	1
		Non لا	2	Suivante التالي	Non لا	2	NSP لا تعرف	98	Non لا	2
07	Maladie du foie? أمراض الكبد؟	Oui نعم	1	→	Oui نعم	1	Age العمر		Oui نعم	1
		Non لا	2	Suivante التالي	Non لا	2	NSP لا تعرف	98	Non لا	2

08	Maladie rénale?	Oui نعم 1	→	Oui نعم 1	Age العمر		Oui نعم 1
	أمراض الكلى؟	Non لا 2	Suivante التالي	Non لا 2	NSP لا تعرف	98	Non لا 2
09	Gastrite?	Oui نعم 1	→	Oui نعم 1	Age العمر		Oui نعم 1
	التهاب أو قرحة في المعدة؟	Non لا 2	Suivante التالي	Non لا 2	NSP لا تعرف	98	Non لا 2
10	Anémie?	Oui نعم 1	→	Oui نعم 1	Age العمر		Oui نعم 1
	أنيميا؟	Non لا 2	Suivante التالي	Non لا 2	NSP لا تعرف	98	Non لا 2
11	Goitre?	Oui نعم 1	→	Oui نعم 1	Age العمر		Oui نعم 1
	تضخم في الغدة الدرقية؟	Non لا 2	Suivante التالي	Non لا 2	NSP لا تعرف	98	Non لا 2
12	Autre maladie?	Oui نعم 1	→	Oui نعم 1	Age العمر		Oui نعم 1
	أي مرض آخر؟ يحدد:	Non لا 2	507	Non لا 2	NSP لا تعرف	98	Non لا 2

No.	QUESTIONS	الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A
507	Souffrez-vous ou avez-vous souffert dans le passé d'un type de cancer quelconque? هل تعانيين الآن أو عانيت في السابق من أي نوع من أنواع السرطان؟		Oui نعم	1	
			Non لا	2	510 A
508	De quel type de cancer souffrez-vous (avez-vous souffert)? ما هو نوع السرطان الذي تعانيين (عانيت) منه؟		Type de cancer نوع السرطان		
			Ne sait pas لا تعرف	98	
509	Quel âge aviez-vous lorsqu'on vous a informé pour la première fois, ou quand vous avez découvert que vous aviez le cancer? كم كان عمرك عندما تم إخبارك أو اكتشفت أنك مصابة بالسرطان؟		Age en années العمر بالسنوات		
			Ne sait pas لا تعرف	98	
510	Avez-vous reçu dans le passé ou recevez-vous à présent un traitement pour le cancer? هل تتلقين الآن أو تلقيت في الماضي أي علاج للسرطان؟		Oui: à présent نعم: حالياً	1	
			Oui: dans le passé نعم: في الماضي	2	
			Non لا	3	
510 A	VERIFIEZ Q210 et Q222: انظري إلى 210 و 222:		Est déjà tombée enceinte (210=1 ou 222=1) سبق لها الحمل	1	
			N'est jamais tombée enceinte (210=2 ET 222=2) لم يسبق لها الحمل	2	519
511	A cause des grossesses, quelques femmes ont la sensation d'une lourdeur en bas de l'abdomen ou sentent que leur matrice va sortir de sa place. Avez-vous éprouvé une sensation pareille? كنتيجة للحمل بعض النساء يشعرن بثقل في أسفل البطن أو يشعرن بأن رحمهن سيخرج. هل حدث أن شعرت بهذا الإحساس؟		Oui نعم	1	
			Non لا	2	516
512	Depuis combien de temps souffrez vous de ce problème ? SI MOINS D'UN AN ENREGISTREZ '00' منذ متى تعانيين من هذه المشكلة؟ إذا المدة أقل من سنة سجلي '00'		Nombre d'années عدد السنوات		
			Ne sait pas لا تعرف	98	

No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A	
513	Lorsque vous tousez, éternuez ou soulevez des objets lourds, avez-vous l'impression que cette sensation reste la même, diminue ou s'accroît d'avantage? هل هذا الإحساس كان يبقى كما هو أم يتحسن أم يسوء عندما كنت تكحين أو تعطسين أو ترفعين شيئاً ثقيلًا؟	Reste le même	يبقى كما هو	1	
		Diminue	ينقص	2	
		S'accroît d'avantage	يسوء	3	
514	Avez-vous consulté quelqu'un pour vous donner un traitement ou un conseil pour ce problème? <b>SI 'OUI' POSEZ:</b> Qui avez-vous consulté? Qui d'autre? هل استشرت أحدا للعلاج أو لتلقي النصيحة عن هذه المشكلة؟ إذا كانت الإجابة "نعم" أسألي: من استشرت؟ هل من شخص آخر؟	Médecin	طبيب	A	5 1 6
		Infirmière/ sage femme diplômée	ممرضة / قابلة مدرية	B	
		Pharmacien	صيدلي	C	
		Accoucheuse traditionnelle (Matrone)	قابلة تقليدية	D	
		Guérisseur traditionnel	معالج تقليدي	E	
		Herboriste	عطار (عشاب)	F	
		Auto médication	معالجة ذاتية	G	
		Parents	أقارب	H	
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	X	
		Non	لا	Y	
515	Pourquoi vous n'avez consulté personne pour vous donner un traitement ou un conseil pour ce problème? <b>INSISTEZ:</b> Quelle autre raison? لماذا لم تستشيري أحدا لمساعدتك في هذه المشكلة؟ <b>نقصي:</b> هل من سبب آخر؟	Juge inutile	لا تعتقد ذلك يساعد	A	
		Coût élevé	التكلفة مرتفعة	B	
		Service non disponible	الخدمة غير متوفرة	C	
		Elle ou époux très occupé	مشغولة/ الزوج مشغول	D	
		Le problème n'est pas très sérieux	المشكلة لا تستدعي	E	
		Gênée	محرجة	F	
		A peur	خائفة	G	
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	X	
516	Un autre problème dont certaines femmes en souffrent est l'incontinence urinaire. Avez-vous des difficultés pour retenir vos urines surtout quand vous tousez, éternuez ou soulevez des objets lourds? هناك مشكلة أخرى تتعرض لها النساء وهي مشكلة عدم التحكم في البول؟ هل تعانيين من هذه المشكلة خاصة عندما تكحين أو تعطسين أو ترفعين شيئاً ثقيلًا؟	Oui	نعم	1	
		Non	لا	2	519
517	Avez-vous consulté quelqu'un pour vous donner un traitement ou un conseil pour ce problème? <b>SI 'OUI' POSEZ:</b> Qui avez-vous consulté? Qui d'autre? هل استشرت أحدا للعلاج أو لتلقي النصيحة عن هذه المشكلة؟ إذا كانت الإجابة "نعم" أسألي: من استشرت؟ هل من شخص آخر؟	Médecin	طبيب	A	519
		Infirmière/ sage femme diplômée	ممرضة / قابلة مدرية	B	
		Pharmacien	صيدلي	C	
		Accoucheuse traditionnelle (matrone)	قابلة تقليدية	D	
		Guérisseur traditionnel	معالج تقليدي	E	
		Herboriste	عطار (عشاب)	F	
		Auto-médication	معالجة ذاتية	G	
		Parents	أقارب	H	
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	X	
		Non	لا	Y	



No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A	
518	Pourquoi vous n'avez consulté personne pour vous donner un traitement ou un conseil pour ce problème? <b>INSISTEZ:</b> Quelle autre raison? لماذا لم تستشيرني أحدا لمساعدتك في هذه المشكلة؟ <b>تفصي:</b> هل من سبب آخر؟	Juge inutile	لا تعتقد ذلك يساعد	A	
		Coût élevé	التكلفة مرتفعة	B	
		Service non disponible	الخدمة غير متوفرة	C	
		Elle ou époux très occupé	مشغولة/ الزوج مشغول	D	
		Le problème n'est pas très sérieux	المشكلة لا تستدعي	E	
		Gênée	محرجة	F	
	A peur	خائفة	G		
	Autre (préciser) _____ : أخرى (تحدد):	X			
519	Durant les trois derniers mois, avez-vous éprouvé un problème de:	خلال الثلاثة شهور الماضية، هل عانيت من:			
A	Douleurs ou brûlures mictionnelles? ألم أو حرقان عند التبول؟	Oui	نعم	1	
		Non	لا	2	
B	Pertes vaginales excessives ou anormales? إفرازات مهبليّة حادة أو غير مألوفة؟	Oui	نعم	1	
		Non	لا	2	521
520	Quand vous aviez ces pertes durant les trois derniers mois, avez-vous aussi éprouvé les problèmes suivants en même temps: عندما تعرضت لهذه الإفرازات هل تعرضت أيضا لأي مما يلي:				
A	Des grattements ou irritation autour du vagin? هرش أو حساسية حول الجهاز التناسلي؟	Oui	نعم	1	
		Non	لا	2	
B	Des pertes malodorantes? إفرازات ذات رائحة كريهة؟	Oui	نعم	1	
		Non	لا	2	
C	Des douleurs abdominales non dues à vos règles? ألم حد في أسفل البطن غير متعلق بالدورة الشهرية؟	Oui	نعم	1	
		Non	لا	2	
521	<b>VERIFIEZ Q519:</b> انظري إلى 519:	Q519A <u>ou</u> Q519B = 1 (au moins un 'oui')	إما 519 أ أو 519 ب = 1	1	
		Q519A <u>et</u> Q519B = 2 (aucun 'oui')	كل من 519 أ و 519 ب = 2	2	524
522	Avez-vous consulté quelqu'un pour vous donner un traitement ou un conseil pour ce (ces) problème(s)? <b>SI 'OUI' POSEZ:</b> Qui avez-vous consulté? Qui d'autre? هل استشرت أحدا للعلاج أو لتلقي النصيحة عن هذه المشكلة (المشاكل)? <b>إذا كانت الإجابة "نعم" امالي:</b> من استشرت؟ هل من شخص آخر؟	Médecin	طبيب	A	5 2 4
		Infirmière/ sage femme diplômée	ممرضة/قابلية مدرية	B	
		Pharmacien	صيدلي	C	
		Accoucheuse traditionnelle (Matrone)	داية	D	
		Guérisseur traditionnel	معالج تقليدي	E	
		Herboriste	عطار (عشاب)	F	
		Auto-médication	معالجة ذاتية	G	
		Parents	أقارب	H	
		Autre (préciser) _____ : أخرى (تحدد):	X		
		Non	لا	Y	
523	Pourquoi vous n'avez consulté personne pour vous donner un traitement ou un conseil pour ce(s) problème(s)? <b>INSISTEZ:</b> Quelle autre raison? لماذا لم تستشيرني أحدا لمساعدتك في هذه المشكلة (المشاكل)? <b>تفصي:</b> هل من سبب آخر؟	Juge inutile	لا تعتقد ذلك يساعد	A	
		Coût élevé	التكلفة مرتفعة	B	
		Service non disponible	الخدمة غير متوفرة	C	
		Elle ou époux très occupé	مشغولة/ الزوج مشغول	D	
		Le problème n'est pas très sérieux	المشكلة لا تستدعي	E	
		Gênée	محرجة	F	
		A peur	خائفة	G	
		Autre (préciser) _____ : أخرى (تحدد):	X		
524	<b>VERIFIEZ Q242:</b> انظري إلى 242:	Pas enceinte/ pas sûre	ليست حامل/غير متأكدة	1	
		Actuellement enceinte	حامل حاليا	2	538

No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A	
525	VERIFIEZ Q245: انظري الى 245:	A encore ses règles	ما زالت تحيض	1	538
		N'a plus ses règles	لم تعد تحيض	2	
526	VERIFIEZ Q124: انظري الى 124:	Actuellement mariée	متزوجة حاليا (متزوجة / منفصلة)	1	534
		Pas actuellement mariée	غير متزوجة حاليا (أرملة/مطلة)	2	
527	Essayez-vous de tomber enceinte mais sans succès? هل حاولت أن تصبحي حاملا ولكن دون جدوى؟	Oui	نعم	1	534
		Non	لا	2	
528	Depuis combien de mois essayez-vous de tomber enceinte? كم مضي من شهر وأنت تحاولين؟	Nombre de mois	عدد شهور المحاولة	_____	
529	D'après vous, quelle est la raison principale qui vous empêche de tomber enceinte ? في رأيك ما هو السبب الرئيسي وراء عدم قدرتك على أن تصبحي حامل؟	En ménopause	الوصول لسن اليأس	1	
		Infertile	العقم	2	
		Malade	المرض	3	
		Epoux stérile	الزوج عقيم	4	
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	6	
		Ne sait pas	لا تعرف	8	
530	Avez-vous consulté quelqu'un pour vous donner un traitement ou un conseil qui vous aidera à tomber enceinte? <b>SI 'OUI' POSEZ:</b> Qui avez-vous consulté? Qui d'autre? هل استشرت أو تلقيت نصيحة من أحد لمساعدتك على أن تصبحي حامل؟ <b>إذا كانت الإجابة "نعم" اسألي:</b> من استشرت؟ هل من شخص آخر؟	Médecin	طبيب	A	532
		Infirmière/ sage femme diplômée	ممرضة/قابله مدربة	B	
		Pharmacien	صيدلي	C	
		Accoucheuse traditionnelle (Matrone)	قابله تقليدية	D	
		Guérisseur traditionnel	معالج تقليدي	E	
		Herboriste	عطار (عشاب)	F	
		Auto-médication	معالجة ذاتية	G	
		Parents	أقارب	H	
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	X	
			Non	لا	
531	Pourquoi n'avez-vous consulté personne pour ce problème? <b>INSISTEZ:</b> Quelle autre raison? لماذا لم تستشيري أحدا لمساعدتك في هذه المشكلة؟ <b>تقصي:</b> هل من سبب آخر؟	Juge inutile	لا تعتقد ذلك يساعد	A	
		Coût élevé	التكلفة مرتفعة	B	
		Service non disponible	الخدمة غير متوفرة	C	
		Elle ou époux très occupé	مشغولة/ الزوج مشغول	D	
		Le problème n'est pas très sérieux	المشكلة لا تستدعي	E	
		Gênée	محرجة	F	
		A peur	خائفة	G	
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	X	
532	Est-ce que votre mari a consulté quelqu'un pour lui donner un traitement ou un conseil pour ce problème? هل قام زوجك باستشارة أحدا للعلاج أو لتلقي النصيحة عن هذه المشكلة؟	Oui	نعم	1	534
		Non	لا	2	
		Ne sait pas	لا تعرف	8	
533	Qui a-t-il consulté? <b>INSISTEZ:</b> Qui d'autre? من استشار زوجك؟ <b>تقصي:</b> هل من شخص آخر؟	Médecin	طبيب	A	
		Infirmière	ممرضة	B	
		Pharmacien	صيدلي	C	
		Guérisseur traditionnel	معالج تقليدي	D	
		Herboriste	عطار (عشاب)	E	
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	X	
			Ne sait pas	لا تعرف	

<b>534</b>	Durant les trois derniers mois, avez-vous souffert des problèmes suivants concernant vos règles:	خلال الثلاثة شهور الماضية، هل عانيت من أي من المشاكل التالية المتعلقة بالدورة الشهرية:		
<b>A</b>	Des règles qui ont duré plus que sept jours? نزيف الدورة دام أكثر من 7 أيام؟	Oui نعم	1	
		Non لا	2	
<b>B</b>	Un écoulement intense (hémorragie) inhabituel ? كثافة الدورة (النزيف) بشكل غير معتاد؟	Oui نعم	1	
		Non لا	2	
<b>C</b>	Des douleurs excessives/ d'invalidités ? آلام حادة أو مقعدة؟	Oui نعم	1	
		Non لا	2	
<b>D</b>	Un cycle irrégulier ? الدورة غير منتظمة؟	Oui نعم	1	
		Non لا	2	
<b>535</b>	<b>VERIFIEZ Q534:</b> انظري إلى 534:	Une ou plusieurs réponses = 1 إجابة أو أكثر = 1	1	
		Toutes les réponses = 2 كل الإجابات = 2	2	<b>538</b>

536	<p>Avez-vous consulté quelqu'un pour vous donner un traitement ou un conseil pour ce (ces) problème(s)?</p> <p><b>SI 'OUI' POSEZ:</b> Qui avez-vous consulté?</p> <p>Qui d'autre?</p> <p>هل استشرت أحدا للعلاج أو لتلقي النصيحة عن هذه المشكلة (المشاكل)؟</p> <p>إذا كانت الإجابة "نعم" اسألي: من استشرت؟ هل من شخص آخر؟</p>	Médecin	طبيب	A	538	
		Infirmière/ sage femme diplômée	مرضة/قابلية مدربة	B		
		Pharmacien	صيدلي	C		
		Accoucheuse traditionnelle (Matrone)	قابلية تقليدية	D		
		Guérisseur traditionnel	معالج تقليدي	E		
		Herboriste	عطار (عشاب)	F		
		Auto-médication	معالجة ذاتية	G		
		Parents	أقارب	H		
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	X		
		Non	لا	Y		
537	<p>Pourquoi n'avez-vous consulté personne pour ce (ces) problème(s)?</p> <p><b>INSISTEZ:</b> Quelle autre raison?</p> <p>لماذا لم تستشيري أحدا لمساعدتك في هذه المشكلة؟</p> <p><b>تفصي:</b> هل من سبب آخر؟</p>	Juge inutile	لا تعتقد ذلك يساعد	A		
		Coût élevé	التكلفة مرتفعة	B		
		Service non disponible	الخدمة غير متوفرة	C		
		Elle ou époux très occupé	مشغولة/ الزوج مشغول	D		
		Le problème n'est pas très sérieux	المشكلة لا تستدعي	E		
		Gêne	محرجة	F		
		A peur	خائفة	G		
		Ménopausée	سن اليأس	H		
		A toujours été comme ça	هذه الحالة دائما	I		
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	X		
538	<p>A présent, je voudrais vous poser quelques questions concernant vos soins médicaux. Lorsque vous avez des problèmes de santé et que vous avez besoin de soins médicaux, où allez-vous généralement pour recevoir ces soins?</p> <p>الآن أود أن أسألك بعض الأسئلة عن تلقي الرعاية الصحية لنفسك.</p> <p>عندما تكون لديك مشكلة صحية وتحتاجين إلى تلقي رعاية صحية أين تذهبين عادة لتلقي هذه الرعاية؟</p>	Hôpital/ maternité	مستشفى/ مركز أمومة	1		
		Polyclinique/ centre de santé	مصحة متعددة الخدمات/مركز صحي	2		
		Clinique privée	مصحة خاصة	3		
		Médecin privé	طبيب خاص	4		
		A domicile	في المنزل	5		
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	6		
		Ne sait pas/ n'est pas sûre	لا تعرف/ غير متأكدة	8		
539	<p>Beaucoup de facteurs peuvent empêcher les femmes de recevoir des conseils ou des soins médicaux. Lorsque vous tombez malade et que vous voulez recevoir un conseil ou un soin médical, est-ce que l'un des facteurs suivants vous pose un grand problème?</p> <p>هنالك عوامل كثيرة تعوق النساء من تلقي الرعاية الطبية أو العلاج لأنفسهن. عندما تكونين مريضة وتريدين أن تتلقى رعاية طبية أو علاج، هل أي من الأشياء التالية تشكل لك عائق كبير أم لا؟</p>		Grand problème	Pas un grand problème	Pas de problème	
			تشكل عائق كبير	لا تشكل عائق كبير	لا تشكل عائق	
		Connaître le lieu où aller?	معرفة أين تذهبين؟	1	2	3
		Avoir la permission d'y aller?	الحصول على الإذن للذهاب؟	1	2	3
		Avoir l'argent pour la visite et le traitement?	الحصول على المال للكشف والعلاج؟	1	2	3
		La distance au service de santé?	بعد المسافة إلى مركز الصحة؟	1	2	3
		Avoir à prendre un moyen de transport?	الاضطرار لركوب المواصلات؟	1	2	3
		Ne pas vouloir aller toute seule?	عدم الرغبة في الذهاب بمفردك؟	1	2	3
		Ne pas trouver un agent de santé féminin?	عدم وجود امرأة لتلقي الرعاية؟	1	2	3

## SECTION 6: LE SIDA ET LES AUTRES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

القسم السادس: مرض الإيدز (السيدا) والأمراض المنقولة جنسيا الأخرى

No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز			PASSER A	
601	A présent, je voudrais vous parler d'un autre type de maladies. Avez-vous entendue parler de maladies qui peuvent être transmises sexuellement?  الآن أود أن أتكلّم عن نوع آخر من الأمراض. هل سبق أن سمعت عن أمراض يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؟	Oui	نعم	1		603	
		Non	لا	2			
602	Quelles maladies connaissez-vous? <b>POUR CHAQUE MALADIE MENTIONNEE SPONTANEMENT ENCERCLEZ LE CODE '1'. POUR CHACUNE NON MENTIONNEE POSEZ:</b>  Connaissez-vous (nom de la maladie non mentionnée)? <b>APRES QUOI ENCERCLEZ LE CODE '2' POUR CELLES QU'ELLE A RECONNUES SINON ENCERCLEZ CODE '3'</b>  ما هي الأمراض التي تعرفونها؟ لكل مرض تعرفت عليه المبحوثة تلقائيا ضعي دائرة حول الرمز "1". لبقية الأمراض التي لم تتعرف عليها اسألني:  هل تعرفين كذلك (اسم المرض الذي لم يتم ذكره)؟ إذا تعرفت المبحوثة عن المرض ضعي دائرة حول الرمز "2" ومن غير ذلك ضعي دائرة حول الرمز "3"		Oui: spontané نعم تلقائياً	Oui: non-spontané نعم بعد تفصي	Non لا		
		Syphilis	السفلس (الزهري)	1	2	3	
		Gonorrhée (écoulement)	السيلان	1	2	3	
		Mycose	الفطار	1	2	3	
		SIDA	الإيدز (السيدا)	1	2	3	
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	1		3	
603	Durant les 12 derniers mois, avez-vous été atteinte de l'une des maladies suivantes? <b>LISEZ LA LISTE DES MALADIES</b>  خلال فترة الـ12 شهرا الماضية، هل أصبت بأي من الأمراض التالية؟ أقرني جميع الأمراض على المبحوثة		OUI نعم	NON لا	NSP لا تعرف		
		Syphilis	السفلس (الزهري)	1	2	8	
		Gonorrhée (écoulement)	السيلان	1	2	8	
		Mycose	الفطار	1	2	8	
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	1	2	8	
604	<b>VERIFIEZ Q603 &amp; Q124:</b>  انتظري إلى 603 و 124:	A eu au moins l'une des maladies	أصيبت بمرض أو أكثر	1			
		Aucune maladie et actuellement mariée	لم تصب بأي مرض ومتزوجة حالي (متزوجة/منفصلة)	2		609	
		Aucune maladie et pas actuellement mariée	لم تصب بأي مرض وليست متزوجة حالياً (مطلقة/أرملة)	3		612	
605	Avez-vous consulté quelqu'un pour vous donner un traitement ou un conseil pour ce (ces) problème(s)?  <b>SI 'OUI' POSEZ:</b> Qui avez-vous consulté?  Qui d'autre?  هل استشرت أحدا للعلاج أو لتلقي النصيحة عن هذا المرض (هذه الأمراض)؟  إذا كانت الإجابة "نعم" اسألني: من استشرت؟ هل من شخص آخر؟	Médecin	طبيب	A		607	
		Infirmière/ sage femme diplômée	ممرضة/قابلية مدرية	B			
		Pharmacien	صيدلي	C			
		Accoucheuse traditionnelle (Matrone)	قابلية تقليدية	D			
		Guérisseur traditionnel	معالج تقليدي	E			
		Herboriste	عطار (عشاب)	F			
		Auto-médication	معالجة ذاتية	G			
		Parents	أقارب	H			
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	X			
Non	لا	Y					

No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A
606	Pourquoi n'avez-vous consulté personne pour ce (ces) problème(s)? <b>INSISTEZ:</b> Quelle autre raison?	Juge inutile	لا تعتقد ذلك يساعد	A
		Coût élevé	التكلفة مرتفعة	B
		Service non disponible	الخدمة غير متوفرة	C
	لماذا لم تستشير أي أحد عن هذا المرض (هذه الأمراض)؟ <b>تفصي:</b> هل من سبب آخر؟	Elle ou époux très occupé	مشغولة/ الزوج مشغول	D
		Le problème n'est pas très sérieux	المشكلة لا تستدعي	E
		Gênée	محرجة	F
		A peur	خائفة	G
Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد): _____	X		
607	<b>VERIFIEZ Q124:</b> انظري إلى 124:	Actuellement mariée	متزوجة حاليا (متزوجة/منفصلة)	1
		Actuellement non mariée	غير متزوجة حاليا (مطلقة/أرملة)	2
608	Quand vous étiez atteinte de (nom de la maladie à partir Q603), votre mari a-t-il consulté quelqu'un pour recevoir un traitement médical ou un conseil pour la (les) même(s) maladie(s)? عندما كنت مصابة بـ (اسم المرض في 603) هل ذهب زوجك للاستشارة أو للعلاج لنفس المرض؟	Oui	نعم	1
		Non	لا	2
		Epoux n'a pas été informé	لم يعلم الزوج	3
		Ne sait pas	لا تعرف	8
7	Durant les 12 derniers mois, votre mari a-t-il été atteint d'une des maladies sexuellement transmissibles? خلال الـ 12 شهرا الماضية، هل أصيب زوجك بأي مرض من الأمراض المنقولة جنسيا؟	Oui	نعم	1
		Non	لا	2
		Ne sait pas	لا تعرف	8
610	A-t-il consulté quelqu'un pour un traitement ou un conseil? هل ذهب للاستشارة أو للعلاج؟	Oui	نعم	1
		Non	لا	2
		Ne sait pas	لا تعرف	8
611	Quand votre mari était atteint de cette maladie avez-vous reçu un traitement ou un conseil médical pour cette même maladie? عندما أصيب زوجك بهذا المرض، هل تلقيت أي نصيحة أو علاج لنفس المرض؟	Oui	نعم	1
		Non	لا	2
612	<b>VERIFIEZ Q602:</b> انظري إلى 602:	Connait le SIDA	تعرف الإيدز (السيدا)	1
		Ne connaît pas le SIDA	لا تعرف الإيدز (السيدا)	2
613	De quelle source d'informations avez-vous le plus appris sur le SIDA? <b>INSISTEZ:</b> Quelle autre source? ما هي المصادر الإعلامية التي تلقيت منها أكبر قدر من المعلومات عن مرض الإيدز (السيدا)؟ <b>تفصي:</b> هل من مصادر أخرى؟	Radio	الراديو	A
		Télévision	التلفزيون	B
		Journaux/ revues	الصحف/المجلات	C
		Brochures/ posters	الكتيبات/الملصقات	D
		Personnel de santé	مرشدين صحيين	E
		Mosquées/ églises	المساجد/الكنائس	F
		Ecoles/ enseignants	المدارس/ الأساتذة	G
		Réunions	اجتماعات المنطقة	H
		Amis/ parents	أصدقاء/ أقارب	I
		Lieu de travail	مكان العمل	J
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد): _____	X
		614	Comment une personne peut être atteinte par le SIDA? <b>INSISTEZ:</b> Y-a-t-il une autre façon? كيف يمكن للمرأة أن يصاب بالإيدز (السيدا)؟ <b>تفصي:</b> هل من طريقة أخرى؟	Rapport sexuel
Non-utilisation du condom	عدم استخدام الواقي الذكري			B
Transfusion sanguine	نقل الدم			C
Injections	الحقن			D
Piqûres d'insectes	لسعات البعوض			E
Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد): _____			X
Ne sait pas	لا تعرف			Y

No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A	
615	Y-a-t-il une façon d'éviter d'être atteint par le SIDA? هل يمكن للمرء القيام بشيء لتجنب الإصابة بالإيدز (بالسيداء)؟	Oui	نعم	1	700
		Non	لا	2	
		Ne sait pas	لا تعرف	8	
616	Comment une personne peut-elle éviter d'être atteinte par le SIDA? <b>INSISTEZ:</b> Y-a-t-il une autre façon? ماذا يجب على المرء القيام به لتجنب الإصابة بالإيدز (بالسيداء)؟ <b>تفصي:</b> هل من طريقة أخرى؟	Rapport sexuel sans risque	الممارسة الجنسية الآمنة	A	
		Utilisation du condom	استخدام الواقي الذكري	B	
		Eviter la transfusion sanguine	تجنب نقل الدم	C	
		Eviter les injections	تجنب الحقن	D	
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد): _____	X	
		Ne sait pas	لا تعرف	Y	

## SECTION 7: PLANNING FAMILIAL ET ATTITUDES VIS AVIS DE LA PROCREATION

القسم السابع : تنظيم الأسرة واتجاهات الإنجاب

No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A	
<b>PLANNING FAMILIAL</b> تنظيم الأسرة					
700	VERIFIEZ Q 529 انظري الي 529	Q 529 = 1, 2 ou 4 السؤال 529 = 1 ، 2 أو 4	1	733	
		Q 529 = 3, 6, 8 ou السؤال 529 = 3 ، 6 ، 8 أو Pas de réponse لا توجد إجابة	2		
701	A présent je voudrais discuter avec vous du planning familial, c'est à dire les différentes méthodes qu'un couple put utiliser pour retarder ou éviter une grossesse. Avez-vous déjà utilisé une méthode ou essayé par n'importe quel moyen de retarder ou d'éviter de tomber enceinte? الآن أود أن أتحدث معك عن تنظيم الأسرة، أعني الوسائل والطرق المختلفة التي يمكن استخدامها لتأخير أو منع الحمل. هل سبق أن استعملت أي شيء أو حاولت بأي طريقة أن تأخري أو تمنعي نفسك عن الحمل؟	Oui نعم	1		
		Non لا	2	714	
702	Quelles méthodes avez-vous déjà utilisé? <b>INSISTEZ:</b> Quelle autre méthode? <b>POUR CHAQUE METHODE MENTIONNEE SPONTANEMENT ENCERCLEZ LE CODE '1'. POUR CHACUNE DES METHODES NON MENTIONNEES DEMANDEZ:</b> Avez-vous jamais utilisé (NOM DE LA METHODE NON MENTIONNEE)? <b>SI 'NON' POSEZ:</b> Avez-vous jamais entendu parler de (NOM DE LA METHODE)? <b>APRES QUOI ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIE</b> ما هي الوسائل التي سبق لك استعمالها لمنع الحمل؟ <b>تفصي:</b> هل من وسيلة أخرى؟ لكل وسيلة ذكرت تلقتان من قبل المبحوثة ضعي دائرة حول الرمز "1". لكل وسيلة لم يتم ذكرها اسألني: هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة التي لم يتم ذكرها) ؟ إذا كانت الإجابة "لا" اسألني: هل سبق أن سمعت عن هذه الوسيلة؟ ثم سجلي الإجابة المناسبة لكل واحدة		OUI نعم NON لا NSP لا تعرف		
		Pilule الحبوب	1	2	8
		Stérilet اللولب	1	2	8
		Injectables الحقن	1	2	8
		Implants الغرز	1	2	8
		Condom العازل الواقي للرجل	1	2	8
		Condom féminin العازل الواقي للمرأة	1	2	8
		Diaphragme الحاجز المهبلي للمرأة	1	2	8
		Crèmes ou gelées المرهم أو الكريم الموضعي	1	2	8
		Ligature des ربط الأنابيب الرحمية	1	2	8
		Stérilisation masculine التعقيم	1	2	8
		Allaitement prolongé إطالة فترة الرضاعة الطبيعية	1	2	8
		Méthode du فترة الأمان	1	2	8
		Retrait العزل	1	2	8
		Autre (préciser) _____ أخرى (تحدد):	1	2	8
703	Combien d'enfants vivants, s'ils existaient, aviez-vous quand vous avez commencé à utiliser la contraception pour la première fois? <b>SI AUCUN ENREGISTREZ '00'</b> كم كان عدد أطفالك الموجودون على قيد الحياة، إن وجدوا، عندما استخدمت وسيلة لتنظيم الأسرة لأول مرة؟	Nombre d'enfants vivants à la première utilisation عدد الأطفال على قيد الحياة عند أول استخدام	_____		
		Ne se rappelle pas/ ne sait pas لا تتذكر/ لا تعرف	98		
704 A	Quand vous avez commencé à utiliser la contraception, vous vouliez avoir un autre enfant mais pour plus tard ou est ce que vous vouliez arrêter d'avoir des enfants? عندما استعملت وسيلة لتنظيم الأسرة لأول مرة، هل كنت ترغبين في إنجاب طفل آخر ولكن بعد فترة، أو كنت ترغبين في التوقف عن الإنجاب كلية؟	Voulait un enfant plus tard كانت ترغب في طفل آخر بعد فترة	1		
		Voulait arrêter d'avoir des enfants كانت ترغب في التوقف	2		
		Autre (préciser) _____ أخرى (تحدد):	6		



No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز تنظيم الأسرة	PASSER A
<b>PLANNING FAMILIAL</b>				
704B	VERIFIER 702 : انظري إلى 702:	'Oui' pour pilule, injectables ou implants	"نعم" لأي من الحبوب أو الحقن أو الغرس	1
		'Non' ou 'NSP' pour pilule, injectables ou implants	"لا" أو "لا تعرف" لكل من الحبوب والحقن و الغرس	2
				705
704C	Pour combien d'années avez-vous utilisé la contraception hormonale (pilule/ injectables/ implants)? كم عدد السنوات التي استعملت فيها وسائل منع حمل بها هرمونات أعني الحبوب أو الحقن أو الغرس؟	Nombre d'années	عدد السنوات	_
		Ne se rappelle pas/ ne sait pas	لا تتذكر/لا تعرف	98
705	VERIFIEZ Q124: انظري إلى 124:	Actuellement mariée	متزوجة حاليا (متزوجة/منفصلة)	1
		Actuellement <u>non</u> mariée	غير متزوجة حاليا (مطلقة/أرملة)	2
				719
706	VERIFIEZ Q242: انظري إلى 242:	Pas enceinte ou pas sûre	ليست حامل/ غير متأكدة	1
		Actuellement enceinte	حامل حاليا	2
				713
707	Utilisez-vous <u>actuellement</u> , vous ou votre mari, une méthode pour retarder ou éviter une grossesse? هل تستعملين حاليا أنت أو زوجك أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة لتجنب الحمل؟	Oui	نعم	1
		Non	لا	2
				713
708A	Quelle méthode utilisez-vous actuellement, vous ou votre mari? ما هي الوسيلة التي تستعملانها، أنت أو زوجك، الآن؟	Pilule	الحبوب	01
		Stérilet	اللولب	02
		Injectables	الحقن	03
		Implants	الغرز	04
		Condom	العازل الواقي للرجل	05
		Condom féminin	العازل الواقي للمرأة	06
		Diaphragme	الحاجز المهبل للمرأة	07
		Crèmes ou gelées	المرهم أو الكريم الموضعي	08
		Ligature des trompes	ربط الأنايبب الرحمية	09
		Stérilisation masculine (vasectomie)	التعقيم للرجال	10
		Allaitement prolongé	إطالة فترة الرضاعة الطبيعية	11
		Méthode du calendrier	فترة الأمان	12
		Retrait	العزل	13
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	96
708B	VERIFIEZ Q702 et Q708A: انظري إلى 702 و 708A:	N'a jamais utilise le stérilet	لم تستعمل اللولب على الإطلاق	1
		A utilisé le stérilet dans le passé mais pas actuellement	استعملت اللولب في الماضي ولكن ليس حاليا	2
				708-D
708C	Pourquoi n'utilisez-vous pas le DIU (stérilet)? لماذا لا تستعلمي اللولب؟	N'apprécie pas le DIU	عدم الارتياح للوسيلة	1
		Peur des effets	خوف من الأعراض	2
		Non approuvé par conjoint	اعتراض الزوج	3
		Ne connaît pas DIU	لا تعرف الوسيلة	4
		Trouve DIU compliqué	ترى أن الوسيلة معقدة	5
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	6
				709-A

No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A
<b>PLANNING FAMILIAL</b>				
<b>تنظيم الأسرة</b>				
708D	<p>Quels sont les problèmes que vous avez rencontré suite à l'utilisation du stérilet (DIU) ?</p> <p><b>INSISTEZ:</b> Y-a-t-il un autre problème?</p> <p>ما هي المشاكل التي صادفتك عند استعمال اللولب؟</p> <p><b>تقصي:</b> هل من مشكل آخر؟</p>	Saignements نزيف دموي	A	
		Infection/ migration التهاب/ تنقل اللولب	B	
		Exige suivi médical régulier يتطلب متابعة طبية مستمرة	C	
		Coût élevé التكلفة مرتفعة	D	
		Accès / disponibilité صعوبة الحصول على الوسيلة	E	
		Inconfort de la méthode عدم الارتياح في الاستخدام	F	
		Désaccord du mari اعتراض الزوج	G	
		Autre (préciser) _____ أخرى (تحدد):	X	
709A	<p><b>VERIFIEZ Q708A:</b></p> <p>انظري إلى <b>A708:</b></p>	Utilise l'une des méthodes 01 à 08 تستعمل احدى الوسائل من 01 إلى 08	1	
		Utilise la stérilisation (09 ou 10) تستعمل التعقيم (09 أو 10)	2	709-C
		Utilise l'une des méthodes 11 à 96 تستعمل احدى الوسائل من 11 إلى 96	3	709-D
709B	<p>Où avez-vous obtenu, vous ou votre mari, (NOM DE LA METHODE ACTUELLE) la dernière fois?</p> <p>من أين تحصلت على (اسم الوسيلة الحالية) آخر مرة؟</p>	Hôpital public مستشفى حكومي	01	709-D
		Centre de santé maternelle et infantile مركز رعاية الأمومة و الطفولة	02	
		Clinique privée مصحة خاصة	03	
		Pharmacie صيدلية	04	
		Médecin privé طبيب خاص	05	
		Epoux الزوج	06	
		Amis ou parents أصدقاء/أقارب	07	
		Autre (préciser) _____ أخرى (تحدد):	96	
		Ne sait pas لا تعرف	98	
709C	<p>A quel endroit a eu lieu la stérilisation?</p> <p>أين أجريت لك (لزوجك) عملية التعقيم؟</p>	Hôpital/ maternité مستشفى/ مركز أمومة	1	
		Polyclinique/ centre de santé مصحة متعددة الخدمات/مركز صحي	2	
		Médecin/clinique privée طبيب خاص/مصحة	3	
		Autre (préciser) _____ أخرى (تحدد):	6	
		Ne sait pas لا تعرف	8	
709D	<p>Quelle est la raison principale qui vous a poussé à utiliser cette méthode contraceptive?</p> <p>ما هو السبب الرئيسي الذي جعلك تختارين استعمال هذه الوسيلة؟</p>	Fiable مضمونة	01	
		Facile à utiliser سهولة الاستعمال	02	
		Prix abordable/gratuit تكلفة منخفضة/مجانية	03	
		Conseillé par médecin/ sage femme نصيحة طبيب/قابلة	04	
		Sans effets secondaires بدون أعراض جانبية	05	
		Effet durable تأثير دائم	06	
		Autre (préciser) _____ أخرى (تحدد):	96	
710	<p>Depuis combien de temps utilisez-vous (NOM DE LA METHODE ACTUELLE) de façon continue? <b>INSISTEZ POUR AVOIR UNE PERIODE APPROXIMATIVE. SI MOINS D'UN AN ENREGISTREZ EN MOIS</b></p> <p>منذ كم شهرا وأنت تستعملين (اسم الوسيلة الحالية) بدون انقطاع؟</p> <p>تقصي عن المدة بالتقريب إذا أقل من سنة سجلي بالشهور</p>	Nombre de mois عدد الشهور	1	_
		Nombre d'années عدد السنوات	2	_
		Ne sait pas لا تعرف	98	
711	<p>Avez-vous rencontré un problème quelconque dû à l'utilisation de (NOM DE LA METHODE ACTUELLE)?</p> <p>هل صادفتك أية مشاكل من استعمال (اسم الوسيلة الحالية)؟</p>	Oui نعم	1	
		Non لا	2	719

No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION فئات الترميز	PASSER A	
<b>PLANNING FAMILIAL</b>		<b>تنظيم الأسرة</b>		
712	<p>Quels sont les problèmes que vous avez rencontré ?</p> <p><b>INSISTEZ:</b> Quel autre problème? ما هي المشاكل التي صادفتك؟ <b>نقصى:</b> هل من مشاكل أخرى؟</p>	Problèmes de santé مشاكل صحية	A	719
		Echec de la méthode الوسيلة غير فعالة	B	
		Désaccord du mari اعتراض الزوج	C	
		Accès/ disponibilité صعوبة الحصول عليها	D	
		Coût élevé التكلفة مرتفعة	E	
		Difficile à utiliser عدم الارتياح لاستخدامها	F	
		Autre (préciser) _____ أخرى (تحدد):	X	
		Ne sait pas لا تعرف	Y	
713	<p>Quelle est la raison principale qui vous a poussé à arrêter l'utilisation de la contraception?</p> <p>ما هو السبب الرئيسي الذي جعلك تتوقفي عن استعمال وسائل تنظيم الأسرة؟</p>	Echec de la méthode/ elle est tombée enceinte عدم نجاح الوسيلة/حصل حمل	01	
		Manque de satisfaction sexuelle نقص في التمتع بالعلاقة الجنسية	02	
		A eu des problèmes de règles أثرت على الدورة الشهرية	03	
		A eu des problèmes de santé أثارت مشاكل صحية	04	
		Difficile à utiliser صعوبة في الاستعمال	05	
		Difficile à obtenir صعوبة الحصول عليها	06	
		Gain de poids زيادة في الوزن	07	
		N'a pas apprécié la méthode عدم الارتياح للوسيلة	08	
		Pour avoir un enfant الرغبة في إنجاب طفل آخر	09	
		Pour remplacer un enfant décédé تريد تعويض طفل متوفى	10	
		Manque d'intimité à l'utilisation عدم وجود خصوصية في الاستعمال	11	
		La ménopause سن اليأس	12	
		Autre (préciser) _____ أخرى (تحدد):	96	
714	<p><b>VERIFIEZ Q124:</b> انظري إلى 124:</p>	Actuellement mariée متزوجة حالياً (متزوجة/منفصلة)	1	719
		Pas actuellement mariée غير متزوجة حالياً (مطلقة/أرملة)	2	
715	<p>Comptez-vous utiliser une méthode pour retarder ou éviter une grossesse dans le futur?</p> <p>هل تنوين أن تستعملي أي وسيلة لتنظيم الأسرة في أي وقت في المستقبل؟</p>	Oui نعم	1	717
		Non لا	2	
		Ne sait pas/ n'est pas sûre لا تعرف / غير متأكدة	8	719

No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A
<b>PLANNING FAMILIAL</b>		<b>تنظيم الأسرة</b>		
716	Quelle est la raison principale qui vous pousse à ne pas vouloir utiliser une méthode contraceptive dans le futur?  ما هو السبب الأساسي لعدم رغبتك في استعمال وسيلة لتنظيم الأسرة في المستقبل؟	Désire un autre enfant أخر	ترغب في إنجاب طفل آخر	01
		Interdits religieux	يتعارض مع المعتقدات الدينية	02
		Opposition au planning familial	تعارض تنظيم الأسرة	03
		Désaccord du mari	الزوج غير موافق	04
		Peur des effets secondaires	الخوف من الآثار الجانبية	05
		Manque d'information	عدم المعرفة	06
		Difficile à obtenir	صعوبة الحصول عليها	07
		Coût élevé	التكلفة مرتفعة	08
		Difficile à utiliser	صعوبة في الاستعمال	09
		Fataliste/ selon la volonté de Dieu	القضاء والقدر/بإيد الله	10
		Ménopausée/ non féconde	سن اليأس/العقم	11
		N'apprécie pas les méthodes existantes	عدم الارتياح للوسائل المتاحة	12
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	96
N'est pas sûre / ne sait pas	غير متأكدة/ لا تعرف	98		
717	Quand comptez-vous commencer à utiliser une méthode pour retarder ou éviter une grossesse?  متى تنوين أن تبدأ في استعمال وسيلة لتنظيم الأسرة؟	Dans les 12 mois à venir	في خلال 12 شهرا	1
		Dans un à deux ans	ما بين سنة وستين	2
		Dans trois ans ou plus	ثلاث سنوات أو أكثر	3
		Indécise/ ne sait pas	لم تقرر بعد/ لا تعرف	8
718	Quand vous utiliserez une méthode, quelle méthode préféreriez-vous utiliser?  وما هي الوسيلة التي ستفضلين استعمالها؟	Pilule	الحبوب	01
		Stérilet	اللؤلؤ	02
		Injectables	الحقن	03
		Implants	الغرز	04
		Condom	العازل الواقي للرجل	05
		Condom féminin	العازل الواقي للمرأة	06
		Diaphragme	الحاجز المهبطي للمرأة	07
		Crèmes ou gelées	المرهم أو الكريم الموضعي	08
		Ligature des trompes	ربط الأنابيب الرحمية	09
		Stérilisation masculine (vasectomie)	التعقيم للرجال	10
		Allaitement prolongé	إطالة فترة الرضاعة الطبيعية	11
		Méthode du calendrier	فترة الأمان	12
		Retrait	العزل	13
		Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد):	96
N'est pas sûre / ne sait pas	غير متأكدة / لا تعرف	98		
719	Généralement, approuvez-vous ou désapprouvez-vous que les couples utilisent une méthode pour retarder ou éviter une grossesse?  بصفة عامة، هل توافقين أو لا توافقين على أن الأزواج يستعملوا وسائل تنظيم الأسرة؟	Approuve	توافق	1
		Approbation conditionnelle	توافق بشروط	2
		Désapprouve	لا توافق	3
		Ne sait pas/ n'est pas sûre	لا تعرف/ غير متأكدة	8

No.	QUESTIONS	الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A	
<b>PLANNING FAMILIAL</b>						
<b>تنظيم الأسرة</b>						
720	<b>VERIFIEZ Q124:</b> انتظري إلى 124:		Actuellement mariée	متزوجة حاليا (متزوجة/منفصلة)	1	
			Actuellement non mariée	غير متزوجة حاليا (مطلقة/أرملة)	2	
721	A votre avis, généralement votre mari approuve-t-il ou désapprouve-t-il les couples qui utilisent une méthode pour retarder ou éviter une grossesse? في رأيك، هل زوجك يوافق بصفة عامة أو لا يوافق على أن الأزواج يستعملوا وسائل تنظيم الأسرة؟		Approuve	موافق	1	
			Approbation conditionnelle	موافق بشروط	2	
			Désapprouve	غير موافق	3	
			Ne sait pas	لا تعرف	8	
722	Combien de fois avez-vous discuté de planning familial avec votre mari durant la dernière année? كم من مرة تحدثت مع زوجك عن تنظيم الأسرة خلال السنة الماضية؟		Jamais	ولا مرة/ أبدا	1	
			Une ou deux fois	مرة أو مرتين	2	
			Plus souvent	أكثر من ذلك	3	
<b>ATTITUDES VIS -A -VIS DE LA PROCREATION</b>						
<b>اتجاهات الإنجاب</b>						
724	<b>VERIFIEZ Q708A: La méthode utilisée actuellement</b> انتظري إلى 708 أ : الوسيلة المستعملة حاليا		Ligature des trompes/ Vasectomie	ربط الأديبب الرحمية / التعقيم للرجال	1	
			Autre méthode/N'utilise pas	أي وسيلة أخرى أو لا تستعمل	2	
725	<b>VERIFIEZ Q242:</b> انتظري إلى 242: <b>Pas enceinte/pas sûre</b>	<b>Enceinte</b>				
						A présent j'ai quelques questions sur le futur. Mis à part l'enfant que vous attendez, aimeriez-vous avoir un autre enfant ou bien préféreriez-vous ne (pas/ plus) en avoir? ليست حامل/غير متأكدة
	A présent j'ai quelques questions sur le futur. Mis à part l'enfant que vous attendez, aimeriez-vous avoir un autre enfant ou bien préféreriez-vous ne (pas/ plus) en avoir? الآن لدي بعض الأسئلة عن المستقبل. هل ترغبين في إنجاب طفل (آخر) أم تفضلين عدم إنجاب (المزيد من) الأطفال؟	A présent j'ai quelques questions sur le futur. Mis à part l'enfant que vous attendez, aimeriez-vous avoir un autre enfant ou bien préféreriez-vous ne plus en avoir? الآن لدي بعض الأسئلة عن المستقبل. بعد أن تضعين طفلك بالسلامة، هل سترغبين في إنجاب طفل آخر أم ستفضلين التوقف عن الإنجاب؟		Avoir un (autre) enfant	إنجاب طفل آخر	1
				Pas d'autres/ plus d'enfants	التوقف عن الإنجاب	2
				Ne peut pas être enceinte	لا تستطيع أن تحمل	3
				Selon la volonté de Dieu	بإيد الله	4
Indécise ou ne sait pas	غير متأكدة/ لا تعرف	8				
726	Préfériez-vous que votre prochain enfant soit un garçon ou une fille ou cela n'a-t-il pas d'importance? هل تفضلين أن يكون طفلك القادم ولدا أو بنتا أو سيات؟		Garçon	ولد	1	
			Fille	بنت	2	
			Pas d'importance	سيان	3	
			Selon la volonté de Dieu	بإيد الله	4	
			Autre (préciser)	_____	أخرى (تحدد):	6

No.	QUESTIONS	الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A
<b>PLANNING FAMILIAL</b>					
تنظيم الأسرة					
727	VERIFIEZ Q242: انظري إلى 242:				
	Pas enceinte/pas sûre	Enceinte	Nombre de mois	شهور	1
	Combien de temps aimeriez-vous attendre à partir de maintenant, avant la naissance d'un/ un autre) enfant?	Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps aimeriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant?	Nombre d'années	سنوات	2
			Bientôt/ tout de suite	قريبا/حالا	9 94
			Ne peut pas tomber enceinte	لا تستطيع أن تحمل	9 95
	ليست حامل/غير متأكدة	حامل حاليا			
كم من الوقت تفضلين الانتظار من الآن إلى حين ولادة الطفل التالي الذي ترغبين فيه؟	كم من الوقت تفضلين الانتظار بعد ولادة طفلك القادم إلى حين ولادة الطفل التالي الذي ترغبين فيه؟	Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد): _____	9 96	
		Ne sait pas	لا تعرف	9 98	
728	Avez-vous jamais discuté avec votre mari le nombre d'enfants que vous voudriez avoir? هل سبق أن تحدثت مع زوجك عن عدد الأطفال الذين ترغبين في إنجابهم طول حياتك؟		Oui	نعم	1
			Non	لا	2
729	A votre avis, votre mari veut avoir le même nombre d'enfants que vous voulez, ou bien il veut plus ou moins d'enfants que vous ne voulez? هل تظنين أن زوجك يرغب في نفس عدد الأطفال الذي ترغبين فيه، أو يرغب في عدد أكبر أو عدد أصغر من العدد الذي ترغبين فيه؟		Même nombre d'enfants	نفس العدد	1
			Plus d'enfants qu'elle	أكثر أطفال	2
			Moins d'enfants qu'elle	أقل أطفال	3
			Ne sait pas	لا تعرف	8
730	VERIFIEZ Q208: انظري إلى 208:				
	A des enfants vivants	Pas d'enfants vivants			
	Si vous pouviez revenir en arrière au temps où vous n'aviez pas encore d'enfants et choisir le nombre exact d'enfants que vous voudriez avoir durant toute votre vie, quel serait ce nombre?	Si vous pouviez décider du nombre exact d'enfants à avoir durant toute votre vie, quel serait ce nombre?	Nombre	العدد	
	لديها أطفال على قيد الحياة	ليس لديها أطفال على قيد الحياة			
لو تخيلنا أن بإمكانك أن تعودى إلى الوقت الذي لم يكن لديك فيه أي أطفال وكان من الممكن أن تختاري عدد الأطفال الذي ترغبين في إنجابهم، فكم يكون عدد هؤلاء الأطفال؟	إذا كان بإمكانك أن تختاري بالضبط عدد الأطفال الذي ترغبين في إنجابهم طول حياتك، فكم يكون عدد هؤلاء الأطفال؟	Autre (préciser) _____	أخرى (تحدد): _____	96	
				732	
731	Parmi ce nombre, quel est le nombre de garçons que vous souhaiteriez avoir, quel est le nombre de filles et quel est le nombre d'enfants pour lesquels le sexe n'aurait pas d'importance? من هذا العدد الذي ترغبين فيه، كم تفضلين أن يكونوا ذكور وكم تفضلين أن يكونوا إناث وكم منهم سيان بالنسبة لك؟		Garçons	عدد الذكور	
			Filles	عدد الإناث	
			N'importe quel sexe	سيان	

No.	QUESTIONS الاسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A
<b>PLANNING FAMILIAL</b>		<b>تنظيم الأسرة</b>		
732	A votre avis, quel est l'intervalle idéal entre la naissance d'un enfant et la naissance de l'enfant qui le suit? في رأيك ما هي أنسب فترة التي يجب أن تكون بين ولادة طفل وولادة الطفل الذي يليه؟	Nombre de mois	شهور	1
		Nombre d'années	سنوات	2
		Autre (préciser) —	أخرى (تحدد):	9 96
733	A votre avis, quel est l'âge le plus convenable pour (votre fille/ une fille) de se marier ? في رأيك ما هو أنسب سن للزواج لابنتك (للبنات)؟	Age	السن	
		Autre (préciser) —	أخرى (تحدد):	96
734	A votre avis, combien d'enfants devrait avoir (votre fille/ une femme) ? في رأيك ما هو عدد الأطفال الذي ترغب في أن تنجبهم ابنتك (البنات) في المستقبل؟	Nombre d'enfants	العدد	
		Autre (préciser) —	أخرى (تحدد):	96
735	Approuveriez-vous que (votre fille/ une fille) travaille au cas où une opportunité de travail lui soit offerte? هل توافقين أم لا توافقين على أن ابنتك تعمل (ببناتك/ البنات تعملن) إذا أتاحت فرصة جيدة للعمل مقابل أجر نقدي؟	Approuve	توافق	1
		Approbation conditionnelle	توافق بشروط	2
		Désapprouve	لا توافق	3

## SECTION 9: SANTE SUR LE PLAN GYNECOLOGIQUE

## القسم التاسع: الصحة الإيجابية

No.	QUESTIONS	الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A
<b>SUIVI GYNECOLOGIQUE</b>					
متابعة الصحة الإيجابية					
901	Prenez-vous actuellement une contraception hormonale tel que la pilule, les injections ou les implants?		Oui	نعم	1
	هل تستعملين الآن أي وسيلة من وسائل منع الحمل التي بها هرمونات، أعني كالحبوب أو الحقن أو الغرس؟		Non	لا	2
902	Prenez-vous actuellement un traitement hormonal pour la ménopause?		Oui	نعم	1
	هل تتناولين الآن أي علاج به هرمونات متعلق بانتهاء الحيض؟		Non	لا	2
903	Quand avez-vous commencé à prendre ce traitement hormonal?		Il y a moins d'un an	منذ أقل من سنة	1
			Entre 1 et 5 ans	ما بين سنة و 5 سنوات	2
			Il y a plus de 5 ans	منذ أكثر من خمس سنوات	3
904	Durant les 12 derniers mois, avez-vous fait un examen gynécologique?		Oui	نعم	1
	خلال الـ 12 شهر الماضية هل تلقيت أي كشف نسائي؟		Non	لا	2
905	Combien d'examens gynécologiques avez-vous fait durant les 12 derniers mois?		Nombre d'examens	عدد مرات الكشف	
	كم من كشف نسائي تلقيت خلال الـ 12 شهر الماضية؟				
906	Où avez-vous effectué votre dernier examen gynécologique?		Hôpital/ maternité	مستشفى/ مركز أمومة	1
			Polyclinique/ centre de santé	مصحة متعددة الخدمات/ مركز صحي	2
			Clinique privée	مصحة خاصة	3
			Médecin privé	لدى طبيب خاص	4
			Autre (préciser): _____	أخرى (تحدد):	6
907	Pourquoi n'avez-vous pas fait d' examen gynécologique durant les 12 derniers mois ? <b>INSISTEZ:</b> Quelle autre raison?		Pas consciente de la nécessité	ليست على علم بالأهمية	A
			N'a pas senti le besoin/ pas de problèmes ou symptômes	لم تشعر بالحاجة/ لا تشكو من مشاكل أو أعراض	B
	لماذا لم تذهبي لتلقي كشف نسائي خلال الـ 12 شهر الماضية؟ <b>تقصي:</b> هل من سبب آخر؟		Coût élevé	التكلفة مرتفعة	C
			Service non disponible	الخدمة غير متوفرة	D
			Elle ou époux très occupé	مشغولة/ الزوج مشغول	E
			Gênée	محرجة	F
			A peur	خائفة	G
			Autre (préciser): _____	أخرى (تحدد):	X
908	Durant les 12 derniers mois, avez-vous fait un frottis?		Oui	نعم	1
	خلال الـ 12 شهر الماضية، هل قمت بعمل مسحة		Non	لا	2
909	Où avez-vous fait votre dernier frottis? أين ذهبت لتلقي المسحة المهبالية آخر مرة؟		Hôpital/ maternité	مستشفى/ مركز أمومة	1
			Polyclinique/ centre de santé	مصحة متعددة الخدمات/ مركز صحي	2
			Clinique privée	مصحة خاصة	3
			Médecin privé	لدى طبيب خاص	4
			Autre (préciser): _____	أخرى (تحدد):	6



No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A	
<b>SUIVI GYNECOLOGIQUE</b> متابعة الصحة الإنجابية					
910	Combien vous a coûté ce frottis? كم كانت تكلفة إجراء المسحة المهبلية آخر مرة؟	Coût (en dinars)	السعر (بالعملة المحلية)  _ _ _ _ _	912	
		Gratuit	مجانا		9995
		Ne se rappelle pas/ ne sait pas	لا تتذكر/ لا تعرف		9998
911	Pourquoi n'avez-vous pas fait de frottis durant les 12 derniers mois ? <b>INSISTEZ</b> : Quelle autre raison ? لماذا لم تذهبي لتلقي المسحة المهبلية خلال الـ 12 شهر الماضية؟ <b>تقصي</b> : هل من سبب آخر؟	Pas consciente de la nécessité	ليست على علم بالأهمية	A	
		N'a pas senti le besoin/ pas de problèmes ou symptômes	لم تشعر بالحاجة/ لا تشكو من مشاكل أو أعراض	B	
		Coût élevé	التكلفة مرتفعة	C	
		Service non disponible	الخدمة غير متوفرة	D	
		Elle ou époux très occupé	مشغولة/ الزوج مشغول	E	
		Gênée	محرجة	F	
		A peur	خائفة	G	
		Autre (préciser) : _____	أخرى (تحدد): _____	X	
912	Savez-vous que vous pouvez palper vos seins vous-même pour détecter une tumeur ou un gonflement assez tôt? هل تعلمين أنه من الممكن إجراء فحص ذاتي للثدي لاكتشاف أورام الثدي مبكراً؟	Oui	نعم	1	
		Non	لا	2	914
913	Palpez-vous vos seins vous-même régulièrement? هل تقومين بالفحص الذاتي للصدر بصورة منتظمة؟	Oui: régulièrement	نعم: بصورة منتظمة	1	
		Oui: de temps en temps	نعم: أحياناً	2	
		Non	لا	3	
914	Durant les 12 derniers mois, avez-vous fait un examen médical sur vos seins pour détecter une tumeur ou un gonflement assez tôt? خلال الـ 12 شهر الماضية، هل قمت بعمل فحص طبي للثدي لاكتشاف الأورام مبكراً؟	Oui	نعم	1	
		Non	لا	2	917
915	Où avez-vous effectué votre dernier examen médical sur vos seins? أين ذهبت لتلقي الفحص الطبي للثدي آخر مرة؟	Hôpital/ maternité	مستشفى/ مركز أمومة	1	
		Polyclinique/ centre de santé	مصحة متعددة الخدمات/ مركز صحي	2	
		Clinique privée	مصحة خاصة	3	
		Médecin privé	لدى طبيب خاص	4	
		Autre (préciser): _____	أخرى (تحدد): _____	6	
916	Combien vous a coûté ce dernier examen médical sur vos seins? كم كانت تكلفة إجراء الفحص الطبي للثدي آخر مرة؟	Coût (en dinars)	السعر (بالعملة المحلية)  _ _ _ _ _	918	
		Gratuit	مجانا		995
		Ne se rappelle pas/ ne sait pas	لا تتذكر/ لا تعرف		998
917	Pourquoi n'avez-vous pas fait d'examen médical sur vos seins durant les 12 derniers mois ? <b>INSISTEZ</b> : Quelle autre raison ? لماذا لم تذهبي لتلقي الفحص الطبي للثدي خلال الـ 12 شهر الماضية؟ <b>تقصي</b> : هل من سبب آخر؟	Pas consciente de la nécessité	ليست على علم بالأهمية	A	
		N'a pas senti le besoin/ pas de problèmes ou symptômes	لم تشعر بالحاجة/ لا تشكو من مشاكل أو أعراض	B	
		Coût élevé	التكلفة مرتفعة	C	
		Service non disponible	الخدمة غير متوفرة	D	
		Elle ou époux très occupé	مشغولة/ الزوج مشغول	E	
		Gênée	محرجة	F	
		A peur	خائفة	G	
		Autre (préciser) : _____	أخرى (تحدد): _____	X	

No.	QUESTIONS الأسئلة	CODIFICATION	فئات الترميز	PASSER A
<b>SUIVI GYNECOLOGIQUE</b>		متابعة الصحة الإيجابية		
918	Avez-vous déjà fait une mammographie? هل قمت بإجراء أشعة على الثديين؟	Oui	نعم	1
		Non	لا	2
919	A quelle date remonte votre dernière mammographie?	Il y a moins d'un an	منذ أقل من سنة	1
		Entre 1 et 2 ans	ما بين سنة وستينين	2
	Entre 2 et 5 ans	ما بين سنتين و 5 سنوات	3	
	Il y a plus de 5 ans	منذ أكثر من خمس سنوات	4	
920	Où avez-vous fait votre dernière mammographie?	Hôpital/ maternité	مستشفى/ مركز أمومة	1
		Polyclinique/ centre de santé	مصحة متعددة الخدمات/ مركز صحي	2
	أين ذهبت لتلقي الأشعة على الثديين آخر مرة؟	Clinique privée	مصحة خاصة	3
		Médecin privé	لدى طبيب خاص	4
		Centre spécial de radiographie	مركز خاص للأشعة	5
		Autre (préciser): _____	أخرى (تحدد): _____	6
921	Combien vous a coûté cette mammographie? كم كانت تكلفة إجراء الأشعة على الثديين آخر مرة؟	Coût (en dinars)	السعر (بالعملة المحلية)	_ _ _ _
		Gratuit	مجانا	95
	Ne se rappelle pas/ ne sait	لا تتذكر/ لا تعرف	98	
922	Pourquoi n'avez-vous pas fait de mammographie? <b>INSISTEZ:</b> Quelle autre raison?	L'échéance n'est pas encore	لم يحين	A
		Pas consciente de la	ليست على علم	B
		N'a pas senti le besoin/ pas de problèmes ou symptômes	لم تشعر بالحاجة/ لا تشكو من مشاكل أو أعراض	C
	لماذا لم تذهبي لتلقي الأشعة على الثديين؟ <b>نقسي:</b> هل من سبب آخر؟	Coût élevé	التكلفة مرتفعة	D
		Service non disponible	الخدمة غير متوفرة	E
		Elle ou époux très occupé	مشغولة/ الزوج مشغول	F
		Gênée	محرجة	G
		A peur	خائفة	H
		Autre (préciser): _____	أخرى (تحدد): _____	X

## قائمة المراجع

1. حسان أحمد قمحية، الطب الوقائي و الصحة العامة و الإحصاء الحيوي، ترجمة محمد معتز معصراني، دار المعاجم، دار الكتب العربية، دمشق، 1993.
2. محمد صبحي أبو صالح، الطرق الإحصائية، الطبعة العربية الأولى 2000، الفصل 11، الإحصاءات الحيوية.
3. رولان بريس، الديموغرافيا الإحصائية، ترجمة : د.حلا نوفل رزق الله.
5. علي رستم، ضبط جودة البيانات الخاصة بالمسوح والتعدادات، الإحصاءات السكانية والاجتماعية المكتب المركزي للإحصاء، سوريا.
6. المسح الجزائري حول صحة الأسرة لسنة 2002 (PAPFAM 2002)، التقرير الرئيسي.
7. SAADI, R, la qualité des données démographique en recensement de 1998, thèse de doctorat d'état en Démographie, Blida 2007, Algérie.