

« *Le Cours de Médecine* »

I.S.M

ALGER

**LES CANCERS
SECONDAIRES
DU FOIE**



PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES

Abou Nouas, Hydra, Alger

LES CANCERS SECONDAIRES DU FOIE

DEFINITION - GENERALITES

ils représentent la moitié au niveau du foie d'un cancer éloigné à distance.

ils sont très fréquents et pour certains auteurs on les observerait dans 10% des autopsies ; ainsi de la moitié des cancers digestifs s'accompagnent au cours de leur évolution d'une dissémination hépatique.

Leur diagnostic comporte toujours un pronostic très péjoratif, le plus souvent à brève échéance, et l'on doit s'efforcer de l'établir avec soin. Une telle démarche active trouve une justification à l'heure actuelle dans les perspectives et les espoirs thérapeutiques : une limite précocement décelée peut être accessible à un traitement efficace.

TABLE DES MATIERES

- Définition - Généralités 1

DONNEES ANATOMO-PATHOLOGIQUES

Données anatomo - pathologiques 1

IRREGULIER, DUR

Etude clinique ; (A) le cancer original est connu 3

- de nodules localisés, (B) le cancer original n'est pas connu
- de gros nodules multiples,
- ou d'infiltration micro-nodulaire.

ou ne peut être mis en évidence 4

parfois très insidieux. Pour ces aspects il faut compte des caractères cliniques du foie à l'examen. Ajoutons que ces formations sont souvent

- Examens complémentaires 6

1) le cancer original

- Le traitement 8

foie doit pour MARCHAND être de fréquence décroissante :

- le colon,
- le pancréas,
- le rectum,
- le métrax,
- le testicule,
- l'estomac,
- le pân-
- le foie.