

**J. BRIZON et J. CASTAING**

PROFESSEURS AGRÉGÉS



# LES FEUILLETS

# D'ANATOMIE

POUR LA PRÉPARATION DES CONCOURS HOSPITALIERS  
ET DES EXAMENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

**FASCICULE XI**

## OSTÉOLOGIE DE LA TÊTE

(I<sup>re</sup> PARTIE)

MAXILLAIRE SUPÉRIEUR  
PALATIN - UNGUIS  
VOMER - MALAIRE  
OS PROPRES DU NEZ  
CORNET INFÉRIEUR  
- MAXILLAIRE INFÉRIEUR -  
FOSSES NASALES OSSEUSES  
CAVITÉS ORBITAIRES  
FOSSE PTÉRYGO-MAXILLAIRE  
FOSSE TEMPORALE  
— OS HYOÏDE —


## OSTÉOLOGIE DU TRONC

— VERTEBRES —  
SACRUM - COTES  
— STERNUM —

B. 61-50  
fasc 11  
EX 1

**LIBRAIRIE MALOINE S. A.**

27, Rue de l'École-de-Médecine, Paris-VI





B.61-50 F.11 EX.1

Fasc. 11  
EX. 1

## MAXILLAIRE SUPÉRIEUR



Os pair et non symétrique, il s'unit à celui du côté opposé et forme avec lui la plus grande partie de la mâchoire supérieure.

Il est situé : — au-dessous de l'orbite.

— en dehors des fosses nasales,

— au-dessus de la cavité buccale.

et contribue à former les parois de ces cavités.

MISE EN PLACE : — en bas, le bord qui porte les dents,

— en dedans, la face qui présente un large orifice

— en avant, le bord qui présente une large échancrure.

FORME : très régulier, il a grossièrement l'aspect d'une pyramide triangulaire (1) ayant :

— trois faces : supérieure, antéro-externe, postéro-externe,

— une base : interne qui porte l'apophyse palatine,

— un sommet : externe.

A l'union des faces interne, supérieure et antéro-externe s'implante la branche montante.

Très léger, il est creusé d'une cavité : le sinus maxillaire.

### I — FACE ANTERO-EXTERNE (ou jugale)

Grossièrement quadrilatère, concave dans son ensemble. elle regarde en avant, en dehors et un peu en bas.

Elle présente :

• Le long de son bord inférieur, des bourrelets verticaux qui répondent à la racine des dents ;

le plus saillant : *la bosse canine*, répond à la racine de la canine.

• Au centre : *la fosse canine*,

étendue et profonde, elle répond aux 2 prémolaires ;

insertions : — à sa partie supérieure, le muscle canin,

— à sa partie inférieure, le muscle buccinateur.

• Au-dessus de la fosse canine : *le trou sous-orbitaire*.

Situé : — de 5 à 10 mm au-dessous du rebord orbitaire inférieur,

— sur la verticale abaissée de l'échancrure sus-orbitaire.

(1) Rouvière décrit au maxillaire une face interne et une face externe qui porte l'apophyse pyramidale ou malaire.  
Poirier-Hovelacque décrivent le segment inférieur de l'os sous le nom d'arcade alvéolaire